

تالفي<sup>TM</sup>  
(TALVEY® - Talquetamab)  
بطاقة للمعالجة/ة

يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة بحوزتك في جميع الأوقات.  
أبرز هذه البطاقة لجميع أفراد الطاقم الطبي  
المشاركين في رعايتك، وفي حال ذهابك إلى المستشفى

قد يسبب تالفي أعراضاً جانبية مثل متلازمة إطلاق السيروتوكينات (CRS) والسمية العصبية، بما في ذلك متلازمة السمية العصبية المرتبطة بالخلايا المناعية المؤثرة (ICANS)<sup>1</sup>.

إسم المتعالج/ة:

معلومات هامة حول الأمان للمتعالجين

توجه فوراً للمساعدة الطبية إذا قاسيت أيّاً من الأعراض التالية:

متلازمة إطلاق السيروتوكينات (CRS)	السمية العصبية، بما في ذلك ICANS
<ul style="list-style-type: none"><li>• سخونة</li><li>• انخفاض ضغط الدم</li><li>• قشعريرة</li><li>• صعوبة في التنفس</li><li>• إنهاك</li><li>• صداع</li><li>• نظم قلب سريع</li><li>• ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد في الدم</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• الشعور بالإرتباك</li><li>• الشعور بضعف في اليقظة أو ميل للنوم</li><li>• الشعور بالتوهان</li><li>• تغير، بقاء أو صعوبة في التفكير</li><li>• ضعف في الوعي</li><li>• صعوبة في النطق، في فهم الكلام والكتابة</li><li>• ضعف في العضلات، حركات بطيئة، صعوبة في المشي</li><li>• إختلاجات</li><li>• ضعف في الذاكرة</li></ul>

**تذكير هام:** إبق قريباً من المكان الذي تلقيت فيه علاج بـ تالفي لمتابعة يومية، وذلك لمدة لا تقل عن يومين بعد تلقي كل واحد من المقادير الدوائية خلال الإعطاء التدريجي. إذا قاسيت من أي عرض **كان** من تلك المذكورة في هذه البطاقة، إتصل بطبيبك/ طبيبتك أو توجه لتلقي مساعدة طبية طارئة فوراً! هذه ليست كافة الأعراض الجانبية المحتملة لـ تالفي. أخبر طبيبك/ طبيبتك إذا وجد لديك أي عرض جانبي يزعجك أو لا يزول.

## الطبيب/ة المعالج/ة

إسم الطبيب/ة المعالج/ة: رقم هاتف الطبيب/ة المعالج/ة:

إسم المستشفى وعنوانه: رقم الهاتف:

### معلومات يملأها الطاقم الطبي

الرجاء سلم هذه البطاقة للطاقم الطبي الخاص بك لملء المعلومات ومن ثم يعيدوا لك البطاقة.

تواريخ حقن تالفي (جدول المواعيد للإعطاء التدريجي):

الجرعة 1 للإعطاء التدريجي

الجرعة 2 للإعطاء التدريجي

الجرعة 3 للإعطاء التدريجي

الجرعة 4 للإعطاء التدريجي\*

### مرحلة العلاج †

\*الجرعة كل أسبوعين فقط.

† تعطى الجرعة العلاجية مرة في الأسبوع بجرعة دوائية قدرها 0.4 ملغ/كغ إبتداء من الجرعة الثالثة وصاعدا، أو مرة كل أسبوعين بجرعة دوائية قدرها 0.8 ملغ/كغ إبتداء من الجرعة الرابعة وصاعدا.

### معلومات هامة حول الأمان لأفراد الطاقم الطبي

CRS والسمية العصبية، بما في ذلك ICANS قد تحدث لدى متعالجين يتلقون تالفي ويمكن أن تكون مميتة أو تشكل خطرا على الحياة. كانت معظم الحالات التي لوحظت بعد إعطاء تالفي من الدرجة الطفيفة/المتوسطة (الدرجة 1 و 2)<sup>1</sup>.

قم بتقييم المتعالج لتشخيص وجود علامات وأعراض لـ CRS و- ICANS. إذا بلغ المتعالج الخاص بك عن أي علامات أو أعراض مذكورة في هذه البطاقة، يرجى التواصل فورا مع الطبيب/ة المعالج/ة للحصول على المزيد من المعلومات. للحصول على كامل التفاصيل يجب قراءة النشرة للطبيب بتمعن على موقع وزارة الصحة الإسرائيلي:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>.

### التبليغ عن أعراض جانبية

صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص من قبل وزارة الصحة بتاريخ 01/12/2024. لمعلومات إضافية يجب قراءة نشرة المستهلك بتمعن.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية عبر الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

بالإضافة لذلك، يمكن التبليغ عن أعراض جانبية بشكل مباشر لجونسون وجونسون إسرائيل، عبر هاتف رقم: 09-9591111.

<sup>1</sup>: Talvey-2mg\_ml\_40mg\_ml\_solution for injection\_PI\_09\_2024.