עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אריפיפרזול סנדוז® 5
אריפיפרזול סנדוז® 10
אריפיפרזול סנדוז® 15
אריפיפרזול סנדוז® 30

טבליות

הרכב:

אריפיפרזול סנדוז 5: כל טבליה מכילה:
אריפיפרזול 5 מ"ג aripiprazole 5 mg

אריפיפרזול סנדוז 10: כל טבליה מכילה:
אריפיפרזול 10 מ"ג aripiprazole 10 mg

אריפיפרזול סנדוז 15: כל טבליה מכילה:
אריפיפרזול 15 מ"ג aripiprazole 15 mg

אריפיפרזול סנדוז 30: כל טבליה מכילה:
אריפיפרזול 30 מ"ג aripiprazole 30 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה בפרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

מטופלים קשישים עם פסיכוזה הקשורה בדמנציה שמטופלים בתרופות אנטי-פסיכוטיות נמצאים בסיכון גבוה למוות. אריפיפרזול סנדוז אינה מיועדת לטיפול בדמנציה הקשורה לפסיכוזה.
נוגדי דיכאון מעלים את הסיכון למחשבות אובדניות בילדים, במתבגרים ובמבוגרים צעירים עד גיל 25.
עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה (ראה בפרק 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

1. למה מיועדת התרופה?

אריפיפרזול סנדוז 5, 10, 15, 30 מיועדות:
- לטיפול בסכיזופרניה.
- לטיפול במצבי מניה בדרגת חומרה בינונית עד קשה, במסגרת מחלה בי-פולרית סוג 1 ולמניעה של התקפי מניה חדשים במטופלים שעיקר מחלתם התקפי מניה ועברו התקפי מניה קודמים שהגיבו בעבר לטיפול באריפיפרזול.

בנוסף, אריפיפרזול סנדוז 5, 10, 15 מיועדות:
- לטיפול משולב בדיכאון קליני מג'ורי (major depressive disorder [MDD]) במטופלים בהם התגובה לטיפול בנוגדי דיכאון הייתה חלקית.
- לטיפול באי-שקט הקשור להפרעה האוטיסטית בילדים (בגילים 17-6 שנים).

קבוצה תרפויטית: אנטי-פסיכוטיים אטיפיים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באריפיפרזול סנדוז, ספר לרופא אם:
- הינך בהיריון או מתכננת להרות, מניקה או מתכננת להניק.
- הינך סובל מרמת סוכר גבוהה בדם (המאופיינת בתסמינים כגון צימאון מוגבר, השתנה מרובה, עלייה בתיאבון, וחולשה) או היסטוריה משפחתית של סוכרת.
- הינך סובל מהתקפי אפילפסיה (פרכוסים).
- הינך סובל מתנועות שרירים בלתי נשלטות ובלתי סדירות.
- הינך סובל ממחלת קרדיו-וסקולרית (לב וכלי דם), יש לך היסטוריה משפחתית של מחלות קרדיו-וסקולריות.
- היה לך שבץ מוחי או "מיני" שבץ מוחי.
- סבלת בעבר מהתמכרות לסמים.
- חלו לאחרונה עלייה במשקל, קשיי בליעה או תופעות אלרגיות, תנועות בלתי רצוניות, שינויות המפריעה לפעולות היום-יומיות.
- הינך חולה קשיש הסובל מדמנציה (אובדן זיכרון ויכולות סכליות אחרות); עליך או על המטפל שלך לספר לרופא אם היה לך שבץ מוחי או "מיני" שבץ מוחי.
- הינך סובל או סבלת בעבר מדיכאון.
- הינך סובל מהפרעה בי-פולרית.
- יש לך רמת שומנים גבוהה בדם.
- הינך סובל מלחץ דם נמוך או גבוה.
- יש לך היסטוריה של נפילות או שאתה סובל ממחלות או נוטל תרופות שיכולות לגרום לנפילות.
- סבלת מלויקופניה או ניטרופניה כתוצאה מנטילת תרופות. ייתכן שהרופא ירצה לערוך לך בדיקות דם מקיפות.
- הינך עושה פעילות גופנית מאומצת, נחשף לחום גבוה, סובל מהתייבשות או שאתה נוטל באופן קבוע תרופות בעלות פעילות אנטיכולינרגית.
- יש לספר לרופא מייד אם יש לך מחשבות אובדניות או מחשבות לפגיעה עצמית (ראה אזהרה בראש העלון ובהמשך סעיף זה ב"אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

אין להשתמש בתכשיר במטרה שונה מזו שלשמה נרשם.

ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 6.
נוגדי דיכאון מעלים את הסיכון למחשבות אובדניות בילדים, במתבגרים ובמבוגרים צעירים. יש לעקוב מקרוב אחר שינויים התנהגותיים, החמרה או עלייה במחשבות ובהתנהגויות אובדניות.

בדיקות ומעקב
בתקופת הטיפול באריפיפרזול סנדוז תיתכן ירידה בלחץ הדם, ועל כן יש להיות תחת מעקב רפואי, ולבצע בדיקות לחץ דם סדירות. כמו כן, ייתכן שתופנה על ידי הרופא לבדיקות דם לשם מעקב.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם – אריפיפרזול סנדוז עלולה להגביר את השפעתן של תרופות אלו.

התרופות הבאות עלולות להפחית את ההשפעה של אריפיפרזול סנדוז:
- תרופות לטיפול בפטרת – איטראקונאזול (itraconazole).
- אנטיביוטיקה – קלריתרומיצין (clarithromycin).
- תרופה להפרעות בקצב הלב – כינידין (quinidine).
- תרופות נוגדות דיכאון (ממשפחת ה-SSRIs) – פלואוקסטין (fluoxetine), פארוקסטין (paroxetine).

התרופות הבאות עלולות להגביר את ההשפעה של אריפיפרזול סנדוז:
- תרופה לאפילפסיה – קארבאמאזפין (carbamazepine).
- אנטיביוטיקה לטיפול בשחפת – ריפאמפיצין (rifampicin).
- תרופות להשראת שינה – בנזודיאזפינים, לדוגמה לוראזפאם (lorazepam).

שימוש בתרופה ומזון
ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
אין לשתות יין ומשקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול עם התרופה.

היריון, הנקה ופוריות

היריון
אל תשתמש בתרופה כאשר הינך מתכננת היריון או בהיריון, אלא אם כן התייעצת עם הרופא ודנת עימו בסיכון לעומת התועלת בלקיחת תרופה זו. שימוש בתרופה זו עלול להשפיע על מצבו הכללי של תינוקך.
עלייך לדווח מייד לרופא אם הינך בהיריון, חושבת שנכנסת להיריון או אם הינך מתכננת להיכנס להיריון.
אל תפסיקי את הטיפול על דעת עצמך אלא התייעצי עם הרופא.
אם הינך בטרימסטר השלישי להריונך ונטלת את התרופה עלייך לדעת כי התופעות הבאות עלולות להופיע בתינוק מייד עם היוולדו: רעד, קשיון/רפיון שרירים, ישנוניות, עצבנות, קשיי נשימה וקשיי האכלה.
אם תינוקך סובל מאחת מתופעות אלו – פני לרופא מייד.

שימוש באריפיפרזול סנדוז בהנקה
יש להתייעץ עם הרופא לגבי התועלת מול תופעות הלוואי ליילוד בנטילת אריפיפרזול בהנקה. התייעצי עם הרופא מהי הדרך הטובה ביותר להזין את תינוקך כאשר את נוטלת אריפיפרזול סנדוז.

נהיגה ושימוש במכונות
השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות ועל כן אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות או לבצע פעילות המחייבת ערנות עד שהשפעת התרופה עליך ידועה לך.
באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופנים או ממשחקים בקרבת הכביש.

אזהרות נוספות
הימנע מהתחממות יתר או מהתייבשות. הימנע מפעילות גופנית מאומצת מדי. במזג אוויר חם, הישאר במקום קריר אם ניתן. הימנע מחשיפה לשמש.
אל תתלבש יתר על המידה ובבגדים עבים. עליך להרבות בשתיית מים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
טבליות אריפיפרזול סנדוז מכילות לקטוז.
אם נאמר לך על ידי הרופא כי יש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא לפני נטילת תכשיר רפואי זה (ראה גם פרק 6 "מידע נוסף").

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים:
סכיזופרניה ומחלה בי-פולרית: המינון המקובל למבוגרים הוא 15 מ"ג פעם ביום. אולם, הרופא עשוי לרשום לך מינון נמוך יותר או גבוה יותר, עד למקסימום של 30 מ"ג פעם ביום.
למתבגרים מגיל 15 ומעלה, בתחילת הטיפול אריפיפרזול סנדוז עשוי להינתן במינונים נמוכים יותר, עם עלייה הדרגתית עד למינון המקובל של 10 מ"ג פעם ביום. אולם, הרופא עשוי לרשום לך מינון נמוך יותר או גבוה יותר, עד למקסימום של 30 מ"ג פעם ביום.
טיפול משלים בדיכאון קליני: המינון ההתחלתי המקובל הינו 2.5 **(ניתן להשתמש בתכשיר אחר המכיל אריפיפרזול להשגת מינון זה)** עד 5 מ"ג ליום. במידת הצורך, הרופא עשוי להעלות את המינון בהדרגה.
טיפול באי-שקט הקשור להפרעה האוטיסטית בילדים: המינון ההתחלתי המקובל הוא 2.5 מ"ג ליום **(ניתן להשתמש בתכשיר אחר המכיל אריפיפרזול להשגת מינון זה)**. הרופא יעלה את המינון בהדרגה ל-5 עד 15 מ"ג ליום, בהתאם לתגובה האישית לתרופה.

אם הינך חש שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדי היוועץ ברופא או ברוקח.

אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לבלוע את התרופה עם מים. אין לכתוש/לחצות/ללעוס את הטבליה.
השתדל ליטול את התרופה בזמנים קבועים כל יום.

אם נטלת בטעות מינון גבוה מדי של אריפיפרזול סנדוז
תופעות הלוואי שדווחו בעת נטילת מנת יתר של אריפיפרזול כוללות הקאות, ישנוניות ורעד.
תופעות לוואי נוספות שדווחו כללו ריכוז חומצה גבוה בדם (אצידוזיס); תוקפנות; עלייה בריכוז האנזים אספרטאט אמינו טרנספראז (AST) בדם המעידה על נזק לשריר הלב או לכבד; פרפור פרוזדורים; דופק איטי (ברדיקרדיה); תרדמת, בלבול; פרכוסים; עלייה בריכוז האנזים קראטין פוספוקינאז (CPK) המעידה על נזק לשריר כולל שריר הלב; ירידה בהכרה; לחץ דם גבוה או נמוך. רמת אשלגן נמוכה בדם (היפוקלמיה), הארכת מקטע QT, הארכת קומפלקס QRS, דלקת ריאות עקב שאיפה לא רצונית של מזון לקנה הנשימה, דום נשימה, פרכוסים חוזרים ללא חזרה למצב של הכרה ביניהם (סטטוס אפילפטיקוס).
אם נטלת מנת יתר או אם היגר חווה את אחד מהתסמינים שתוארו, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
אין לליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באריפיפרזול סנדוז עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

אם אתה חווה אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות, הפסק ליטול אריפיפרזול סנדוז וספר לרופא מייד:
- דיכאון חדש או החמרה; מחשבות אובדניות; ניסיון התאבדות; חרדה חדשה או החמרה בחרדה; חוסר מנוחה או עצבנות; הרגשת פאניקה; קשיי שינה; רגזנות; כעס; תוקפנות; התנהגות אימפולסיבית מסוכנת; פעלתנות ודיבור יתר (מניה); שינויים בהתנהגות.
- אירוע מוחי, כולל שבץ.
- תסמונת נוירולפטית ממאירה (neuroleptic malignant syndrome – NMS), שתסמיניה הם חום גבוה מעל 41°C, קשיון שרירים, שינוי במצב המנטלי, אי יציבות פיזיולוגית (דופק לא רגיל, עלייה בלחץ דם, דופק מהיר או קצב לב לא סדיר). סימנים נוספים: עלייה בקראטין פוספוקינאז (creatine phosphokinase – CPK), אנזים שרמתו בדם עולה ביחס ישיר לנזק בשריר, כולל בשריר הלב, מיואגלובין בשתן (myoglobinuria) העלול להעיד על הרס שרירים (רבדומיוליזיס), אי ספיקת כליות חריפה.
- עלייה בסוכר בדם (היפרגליקמיה), סוכרת. התסמינים הבאים מעידים על רמת סוכר גבוהה בדם: הרגשת צימאון, צורך להטיל שתן בתכיפות רבה יותר מהרגיל, תחושת רעב חזקה, הרגשה של חולשה ועייפות, כאב בטן, בלבול, הבל פה פירותי.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):
- חולשה; תשישות; חוסר אנרגיה • ירידה במשקל; אובדן תיאבון • ירידה ברמות פרולקטין בדם • עוויתות או תנועות בלתי רצוניות; צורך להיות בתנועה כל הזמן • הקאות; בחילות; תחושת אי-נוחות בקיבה; עצירות • סחרחורות, כאבי ראש; קשיי שינה, חרדה ותחושת אי-שקט; טשטוש ראייה • מחלות בדרכי הנשימה העליונות.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):
- דופק איטי, דופק מהיר (פלפיטציות) • בצקת בגפיים, התנפחות של הידיים, הקרסוליים או הרגליים • כאבים בחזה • נפילות • עלייה באנזימי כבד בבדיקות דם • עלייה ברמות הסוכר (גלוקוז) בדם • עלייה בריכוז האנזים לקטאט דהידרוגנאז; עלייה ברמות האנזים גמא-גלוטאמיל טראנספפטידאז (GGT) • חולשת שרירים; התכווצות שרירים; פרקינסוניזם; איבוד זיכרון; קשיון שרירים; איטיות בתנועה; אובדן חלקי או מלא של תנועת השריר; נוקשות שרירים; רעד; ירידה בתנועתיות; משבר עיני-סיבובי (oculogyric crisis) • תוקפנות; איבוד החשק המיני; הזיות; אין אונות • גודש באף; קוצר נשימה • פריחה בעור; הזעת יתר; גרד; נשירת שיער; רגישות לאור • ירידה חדה בלחץ דם במעבר פתאומי ממצב שכיבה או ישיבה לעמידה (orthostatic hypotension) שיכולה לגרום לסחרחורת ולהתעלפות • ירידה או עלייה בלחץ הדם.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):
- תרומבוציטופניה (ירידה ברמת הטסיות בדם) • רפרוף עליות (atrial flutter); דום נשימתי; חסם עלייתי-חדרי; פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation); תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס); זרימת דם לא מספקת לשריר הלב (איסכמיה של שריר הלב); התקף לב; כשל לבבי • ראייה כפולה • דיפלוקס קיבתי ושטי • בצקת בפנים; סרפדת • דלקת כבד; צהבת • רגישות יתר של המערכת החיסונית • מכת חום (heat stroke) • עלייה ברמות פרולקטין, אוראה, בילירובין או קריאטינין בדם; הארכת מקטע QT; עלייה ברמת המונולובין מסוכר (A1C) • רמת אשלגן נמוכה בדם (היפוקלמיה); רמת נתרן נמוכה בדם (היפונתרמיה) • פירוק תאי שריר (רבדומיוליזיס); ירידה בכושר התנועה (אקינזיה); ספאזם בשריר הנמשך שבריר שניה וגורם לתנועה בלתי רצונית חדה, קצרה ותפתאומית מאוד (מיוקלונוס); פגיעה בקואורדינציה (תיאום עצב שריר); הפרעות דיבור; פרכוסים • עלייה בחשק המיני; אי-יכולת להגיע לאורגזמה • טיקים; מחשבות אובדניות; חוסר תגובה לסביבה (קטטוניה); הליכה מתוך שינה • אצירת שתן; השתנה לילית • הגדלת שדיים בגברים; אי-סדירות בווסת; היעדר או הפסקה של הווסת, כאבים בשדיים; זקפה ממושכת.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):
- עלייה ברמת השומנים בדם (דיסליפידמיה); עלייה במשקל • חוסר שליטה בדחפים כאשר נוטלים אריפיפרזול, בייחוד הימור כפייתי • שינויים ברמה של תאי דם מסוימים (לויקופניה – מספר נמוך של תאי דם לבנים, ניטרופניה – מספר נמוך של נויטרופילים) • פרכוסים • פגיעה בכושר השיפוט, ביכולת המנטלית או בכישורים המוטוריים; תשישות וחוסר יכולת לתקשר • קושי בוויסות טמפרטורת הגוף או התחממות יתר • קושי בבליעה; שאיפה לא רצונית של מזון לדרכי הנשימה עם סיכון לדלקת ריאות.
במטופלים קשישים עם דמנציה דווחו יותר מקרי מוות בזמן הטיפול בתרופה.
בנוסף דווח על מקרים של שבץ או "מיני" שבץ.

תופעות לוואי נוספות בילדים ובמתבגרים
רוב תופעות הלוואי שנצפו בילדים בגילי 18-6, נצפו גם במבוגרים.
תופעות לוואי שכיחות – עלייה ברמת האינסולין בדם; הרטבה (בעיקר לילית); נמנום; כאבי ראש; הקאות; עייפות; עלייה או ירידה בתיאבון; ריור יתר ועלייה בהפרשת רוק; נדודי שינה; בחילה; גודש באף; הצטננות; עלייה במשקל; עוויתות ותנועות לא רצוניות; אי-שקט; רעד; נוקשות שרירים.
תופעות לוואי לא שכיחות – יובש בפה, התכווצות בלתי רצונית של הלשון (ספאזם של הלשון); קיבעון עיני שיכול להתרחש במשך דקות או שעות, בו העיניים מקובעות לצדדים או כלפי מעלה; דיבור בשינה; שיעור יתר.
אם הופיעה תופעת לוואי, או אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון: אין לאחסן מעל ל-30°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

אריפיפרזול סנדוז 5:
lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; indigo carmine (E132) aluminium lake.
כל טבליה של **אריפיפרזול סנדוז 5** מכילה 71.02 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

אריפיפרזול סנדוז 10:
lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172).
כל טבליה של **אריפיפרזול סנדוז 10** מכילה 65.97 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

אריפיפרזול סנדוז 15:
lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide yellow (E172).
כל טבליה של **אריפיפרזול סנדוז 15** מכילה 97.75 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

אריפיפרזול סנדוז 30:
lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172).
כל טבליה של **אריפיפרזול סנדוז 30** מכילה 196.50 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אריפיפרזול סנדוז ארוזה בתוך מגשיות (בליסטרים) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה יש 30 טבליות.
טבליות **אריפיפרזול סנדוז 5** הן עגולות וצבען כחול, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "444".
טבליות **אריפיפרזול סנדוז 10** הן עגולות וצבען ורוד, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "446".
טבליות **אריפיפרזול סנדוז 15** הן עגולות וצבען צהוב, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "447".
טבליות **אריפיפרזול סנדוז 30** הן עגולות וצבען ורוד, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "449".

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ, ת.ד. 9015, תל אביב, ישראל.
נערך בנובמבר 2023.
מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות המלכתי של משרד הבריאות:
אריפיפרזול סנדוז 5: 162-95-35898-00/01
אריפיפרזול סנדוז 10: 162-96-35899-00/01
אריפיפרזול סנדוז 15: 162-97-35911-00/01
אריפיפרזול סנדוז 30: 162-99-35971-00/01

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.