

فيزيوم

أقراص، 10 ملغ

المادة الفعالة:

كل قرص يحتوي على:

كلوبازام 10 ملغ

Clobazam 10 mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

والفقرة 6 - "معلومات إضافية"

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موزجة عن الدواء. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء للعلاج من أجل، لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لالتك.

مقدمة النشرة للمستهلك لا بنزوديبازيبينات

- هذا الدواء ينتمي إلى فصيلة البنزوديبازيبينات، التي تتميز بصفات خاصة تُلزم إخطاح الحذر الشديد عند استعمالها. إذا كنت تتناولها.
- هناك أهمية كبيرة لإجراء متابعة طبية حثيثة عند تناول هذا الدواء.
- عند تناول هذا الدواء إحرص على مراجعة الطبيب بعد 2-4 أسابيع، نظراً لأن العلاج مخصص لفترات قصيرة فقط.
- الإستعمال المطول للدواء قد يقلل من تأثيره.
- هذا الإستعمال قد يسبب ظاهرة شديدة من التعلق بالدواء، حيث يصعب على المريض فيها التوقف عن تناول الدواء.
- يتراق التوقف المفيع مرافق العلاج بأعراض إنسحابية مثل: توتر، عصبية، إرتباك، رجفان، آرق، الألام في البطن، تقيؤات، غثيان، تعرق، تشنجات.
- الإستعمال المتواصل بالدواء يمكن أن يسبب أحياناً تغيرات في أنماط السلوك وأفكار مزعجة.
- من الموصى به خاصة لدى المسنين الإحتراس عند المشي، نظراً لأن الدواء يخل باليقظة كذلك يخل أحياناً بتسبيق حركات الجسم وبذلك هناك خطورة لحدوث تخرق أو سقوطات.

إن تناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة الأفيونات، أدوية أخرى مثبطة للجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول، قد يؤدي إلى الشعور بميل شديد للنوم، مصوبفات في التنفس (تثبيط تنفسي)، سبات وموت.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل الدواء لعلاج حالات القلق لدى الكبار.

الفصيلة العلاجية، تنتمي المادة الفعالة إلى فصيلة أدوية تسمى بنزوديبازيبينات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألبرجي) للمادة الفعالة، لأدوية أخرى من فصيلة البنزوديبازيبينات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- علامات لرد فعل تحسسي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنتفاخ اللغتين، تورم الوجه، الحنجرة أو اللسان.
- كنت في فترة الحمل أو تخططين للحمل (أنظري فيما يلي تحت "الحمل، الإرضاع والخصوبة" لمعلومات إضافية)
- كنت مرضعة
- وجدت لديك في الماضي مشاكل تعلق بأدوية أو بالكحول
- كنت تعاني من مرض يسبب ضعف عضلي (يُسمى الوهن العضلي الوبيل - myasthenia gravis)
- لديك مشاكل في الكبد
- لديك مشاكل في التنفس
- كنت تتوقف عن التنفس لفترات قصيرة خلال النوم (يُسمى "لازمة إنتقاط التنفس خلال النوم")

لا تتناول الدواء إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، إذا لم تكن وإتقاً، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول فريزيوم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- **قبل العلاج ب فريزيوم، إحك لطبيبك إذا:**
- وجدت لديك مشاكل في السيطرة على حركاتك (تُسمى "spinal or cerebellar ataxia").
- كنت تعاني من إكتئاب، مخاوف غير منطقية وأفكار قسرية.
- كنت تعاني من أفكار باطلة (الإعتقاد بأشياء غير حقيقية) أو هلوسة (تشعر بأشياء غير موجودة).
- وجدت لديك مشاكل في الكلى.
- تطور لديك في الماضي تعلق بدواء آخر أو بالكحول، لا يجوز إستهلاك الكحول خلال العلاج ب فريزيوم جراء تزايد الخطورة لحدوث أعراض جانبية.
- تجاوزت عمرك 65 سنة، ذلك جراء تزايد الحساسية لحدوث أعراض جانبية لدى المسنين مثل نعاس، دوام وضعف عضلي. هناك أيضاً خطورة زائدة لحدوث سقوطات التي قد تؤدي إلى إصابة خطيرة.
- وجدت لديك صعوبة في هضم الأدوية، لدى بعض المتعالجين، قد لا يجري الكبد إستقلاب (تفكيك) كاف للأدوية، لدى هؤلاء المتعالجين قد يبقى الدواء في الجسم لفترة زمنية أطول. قد يؤدي هذا الأمر إلى أعراض جانبية. إذا كان من المعروف أن لديك خلل في إستقلاب أدوية معينة، الرجاء إحدت مع طبيبك.
- كنت تستعمل ممرضات طبية أو غير طبية تحتوي على كيتيديول، لأن ذلك قد يفاقم الأعراض الجانبية ل كلوبازام.

إن الدواء، خاصة إذا تم تناوله مع أدوية أخرى بما في ذلك أدوية لمعالجة الصرع، قد يؤدي لأعراض جانبية جلدية شديدة وتشكل خطراً على الحياة. إذا حدثت هذه الأعراض، ابلغ بالتوجه إلى الطبيب فوراً.

نعاس، صعوبات في التنفس، سبات ووفاة قد تحدث إذا تم تناول فريزيوم سوية مع أفيونات، بالإمكان إستعمال فريزيوم وأفيونات بشكل متزامن فقط عندما تكون الحذيرات العلاجية الأخرى غير مناسبة، الرجاء إحك لطبيبك عن كافة الأدوية الأفيونية

التي تستعملها، وإحرص على التقيّد بتعليمات الطبيب بخصوص المقدار الدوائي. أظهرت أبحاث معينة تزايد الخطورة لحدوث أفكار إنتحارية، بما حاولت للإنتحار والتناحر لدى متعالجين يتناولون أدوية معينة للتهوية للنوم، مع هذا الدواء. مع ذلك، لم يثبت فيما إذا كان هذا الأمر ناجماً عن الدواء أو فيما إذا قد تكون هناك أسباب أخرى. إذا وجدت لديك أفكار إنتحارية، إتصل بطبيبك بأسرع ما يمكن لتلقي إستشارة طبية إضافية (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

إذا لم تكن وإتقاً فيما إذا كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول فريزيوم.

الأطفال والمرافقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال.

الفحوص والمراقبة

إذا إتقصت الحاجة لهذه العلاج بدواء يحتوي المادة الفعالة ستيريبينول، بالإضافة ل فريزيوم، فهناك ضرورة لإجراء فحوص دم قبل بدء العلاج وخلاله. هناك حاجة لمراقبة طبية حثيثة في الأسابيع الثمانية الأولى للعلاج من أجل تشخيص ظهور أعراض جلدية شديدة بشكل فوري.

التفاعلات بين الفعالات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، مع شأنك أن تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك، لأن فريزيوم قد يؤثر على طريقة عمل أدوية معينة أخرى. كذلك، فإن أدوية معينة قد تؤثر على طريقة عمل فريزيوم.

إحك لطبيبك بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية الصرع (مثل فينيتوين، كاربامازيبين، ستيريبينول أو حمض فاليريونيك).
- أدوية الإكتئاب (مثل مثبطات موناامين أو كسيدات (MAOIs) أو مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة مثل ترازودون، أو مثبطات إنتقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين (SSRIs) مثل فلوفوكسامين أو باروكستين).
- أدوية أمراض نفسية خطيرة تسمى "مضادات الهذيان" (مثل كلوربيرومازين، الهالوبيريول، كلوزابين وبيموزيد).
- مسكنات الألم (مثل أدوية تحتوي على كوديين، ديهيدروكوديين أو مورفين).
- أدوية النوم (مثل زولبيدم).
- أدوية مهدئة (مثل ديازيبام، تيمازيبام أو لورازيبام).
- أدوية لإرخاء العضلات (مثل باكليفين).
- مضادات الهوسامين التي تسبب لك الميل إلى النوم (مثل كلورفينامين، بروميتازين أو ديفنهيدرامين).
- الليتوم - المستعمل لمرض نفسي يُسمى "الهوس الإكتئابي" (تغيرات في المزاج التي تتراوح ما بين حالة من فرط الإفعال أو عواطف مبالغ فيها وإكتئاب).

سيميتيدين - يستعمل لعلاج الفرحات والحرقان.

أومييزول - يستعمل لعلاج إضطرابات المعدة.

تيكوبيريدين - دواء يبطئ تكسد الصفائح الدموية الذي يستعمل لمنع تشكل الخثرات الدموية.

فلوكوزالوم - يستعمل لعلاج حالات الفطر.

ديكستروميثورفان - يستعمل للتخفيف من السعال الجاف والمزعج.

نيبيغولوم - يستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع.

منتجات تحتوي على كيتيديول (منتجات طبية أو غير طبية)

إن الإستعمال بشكل متزامن ل فريزيوم وأفيونات يزيد من الخطورة لحدوث نعاس، صعوبات في التنفس، سبات ووفاة. تقيّد تعليمات الطبيب بخصوص المقدار الدوائي.

إذا لم تكن وإتقاً فيما إذا كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

مواد التخدير

إذا كنت مقبلاً على تلقي مادة للتخدير، إحك لطبيبك أو لطبيب التخدير بأنك تتناول فريزيوم. لأنه من الجائز أن يحتاج طبيبك إلى تغيير كمية المادة المخدرة أو مرخي العضلات الذي يجب إعطاؤه لك.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز شرب الكحول خلال فترة تناول فريزيوم. ذلك لأن هلاك زيادة في الخطورة لحدوث ميل للنوم وأعراض جانبية أخرى.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يوصى بإستعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل ولدى نساء في سن الخصوبة الوائى لا يستعملن وسائل منع حمل.

إذا إكتشفت أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك فوراً من أجل التقييم من جديد الحالة للعلاج. لا تتوقفي عن تناول فريزيوم بدون التحدث مع طبيبك.

لم تبين كمية كبيرة من المعطيات أدلة لتفوهات مرتبطة بإستعمال البنزوديبازيبينات.

مع ذلك، أظهرت أبحاث معينة إحدت احتمال خطورة متزايدة لحدوث إنتسحاق في الحنك والشفة لدى حديثي الولادة مقارنة بالفتاة السكانية العامة.

إن الحنك والشفة المستقوقين (المُسَمَّان أحياناً "شفة الأرنب") عبارة عن تشوه خلقي ناتج عن إلتقام غير كامل للحنك والشفة العلوية.

إنخفاض في حركات الجنين وتغيرات في نظم قلب الجنين من شأنها أن تحدث بعد تناول كلوبازام خلال الثلث الثاني و/أو الثالث من الحمل.

إذا تم تناول فريزيوم في نهاية الحمل أو خلال الولادة، فمن الجائز أن يعاني رضيعك من ميل للنوم، ضعف عضلي (نقص التوتر العضلي أو إرتخاء في العضلات)، إنخفاض في درجة حرارة الجسم (hypothermia)، صعوبات في الإطعام (مشاكل في الرضاعة التي تؤدي إلى إرتفاع قليل في الوزن) ومشاكل في التنفس (تثبيط للتنفس، أحياناً خطير).

إذا تم تناول الدواء بشكل دائم في المراحل المتأخرة من الحمل، فمن الجائز أن يعاني رضيعك من أعراض شبيهة مثل نعاس أو إرتخاف. في هذه الحالة، على المولود أن يخضع لإشراف حثيث خلال فترة ما بعد الولادة.

لا يجوز تناول فريزيوم إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. ذلك لأنه من شأنه أن ينتقل إلى حليب الأم.

السياقة وإستعمال الماكينات

قد تشعرب ميل للنوم أو أن تعاني من مشاكل في التركيز أو في الذاكرة بعد تناول هذا الدواء. قد تعاني أيضاً من إدرواجية الرؤية أو قد تشعرب بشكل أبطأ للأشياء.

إذا حدث ذلك، فلا يجوز السياقة أو إستعمال معدات العمل أو الماكينات.

قد يؤثر الدواء على قدرتك على السياقة لأنه قد يسبب لك ميل للنوم أو دار.

لا تقم بالسياقة خلال إستعمال هذا الدواء إلى أن تعلم كيفية تأثيره عليك.

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان أمناً أن تقود خلال فترة تناول الدواء.
معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوي فريزيوم على لكتوز، إذا قبل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، تحدث مع طبيبك قبل تناول الدواء.
(3) كيفية إستعمال الدواء؟
يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
عليك تناول الدواء لطالما يصف لك الطبيب.
إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أضعف من اللازم، فلا تغير المقدار الدوائي من تلقاء نفسك، إستشر الطبيب.
يُعطى فريزيوم عادة لفترة 2-4 أسابيع وبعد ذلك يقرر الطبيب بخصوص إستمرارية العلاج.
المقدار الدوائي الإعتيادي للكبار: 20-30 ملغ في اليوم بمقدارين واثني مقسمين أو كمقدار دوائي واحد في الليل.
من الجائز أن يرفع الطبيب المقدار الدوائي حتى 60 ملغ في اليوم، ومن الجائز أن يخفض الطبيب المقدار الدوائي.
المقدار الدوائي الإعتيادي للمسنين: 20-10 ملغ في اليوم.
هذا الدواء غير مخصص للأطفال.
المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو في الكلى سيتناولون مقداراً دوائياً منخفضاً من فريزيوم، حسب تعليمات الطبيب.
بعد فترة لا تتجاوز 4 أسابيع من بدء العلاج يحدد الطبيب مواصلة العلاج.
لا يجوز المضغ يجب بلع الدواء بشكله الكامل مع نصف كأس ماء على الأقل أو مفتت ومخلوط مع قفاح مهروس،
يسمح بضمير القرض إلى نصفين من أجل الحصول على مقدار دوائي قدره 5 ملغ، إذا توجب تناول المستحضر عدة مرات في اليوم، فيجب تناول المقدار الدوائي المتبقي في المساء.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر:
إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجّه مباشرة إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك، لا تقود، لأنك يمكن أن تشعر بالتعاس.

إذا نسيت تناول الدواء:
إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المحدد، فتناول قرصاً حال تذكر ذلك، لكن إذا كان قريباً موعد تناول القرص القادم، فقم بتفويت المقدار الدوائي هذا، لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً كتعويض عن القرص المنسي.
يجب المواظبة على العلاج حسب دوية الإستشارة الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بعد تناول القرص القادم، يتم التوقف عن العلاج بشكل تدريجي، على حالتك الصحية، يتم التوقف عن العلاج بالدواء بشكل تدريجي.

إذا توقفت عن تناول الدواء:
يمكن أن يؤدي التوقف عن العلاج بالدواء إلى قلة الهدوء، قلق، إرتباك، إكتئاب وحتى لفقدان الشهية للطعام والأرق، إحك لطبيبك إذا حدث ذلك.
لا تتوقف عن تناول الدواء إلا إذا أوصاك طبيبك القيام بذلك، يتم التوقف عن العلاج بشكل تدريجي، راجع الطبيب قبل التوقف عن العلاج.
لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب فحص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية
كما بكل دواء، فإن إستعمال فريزيوم قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتحدث من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز ألا تعاني أياً منها.
قد تشعر بأنك مريض بعد تناول الأقراص، أو تلاحظ أعراضاً غير إعتيادية أو غير متوقعة، إحك لطبيبك إذا حدث ذلك.
يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض الجانبية التالية:
أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين):
الشعور بعصبية أو بقلة راحة.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل):
خلل في الذاكرة خلال العلاج - فريزيوم (فقدان الذاكرة) أو سلوك شاذ.
كوابيس ليلية.
الشعور بالقلق.
الإعتقاد بأشياء غير حقيقية (أفكار باطلة).
زيادة احتمال التزلزل أو السقوطات، خاصة لدى المتعاطلين المسنين.
أعراض جانبية شائعة غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعطيات المتوفرة):
مشاكل في النوم التي تتفاقم بعد تناول الدواء.

الشعور بأشياء غير موجودة (هلوسة).
إنخفاض الإدراك لمحيطك، خاصة لدى المسنين.
شعور إنتحاري.
حوصلات أو نزف في الجلد المحيط للفتحتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية، بالإضافة لذلك، أعراض شبيهة بالإنفلونزا وسخونة، قد تكون هذه "ملازمة ستيفنس جونسون".
طفح حويصلي خطير حيث قد يظهر فيه تقشر لطبقات الجلد الذي يترك مناطق واسعة على كامل سطح الجسم مكشوفة الجلد، كذلك، شعور عام غير جيد، سخونة، تشعيرية وآلم عضلية، يُسمى هذا "إنحلال البشرة الخفري السمي" (Toxic epidermal necrolysis).
إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه، فمن الجائز أن يقرر طبيبك بأن هناك حاجة للتوقف عن العلاج، هذه الأعراض الجانبية شائعة أكثر لدى المسنين.

يجب مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية التالية أو إستمرت لأكثر من عدة أيام، أو إذا لاحظت عرض جانبي لم يذكر في النشرة، أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):
● صعوبة البقاء يقظاً أو متنبهاً.
أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين):
● الشعور بميل للنوم أو دوام.
● الشعور بهيجان أو عدوانية.
● إكتئاب.
● صداع.
● مدى قصير للإصغاء.
● صعوبة في النطق.
● إرتجاج في الأصابع.
● مشاكل في المشي أو مشاكل أخرى في الحركة.
● إنخفاض في تأثير فريزيوم مقارنة بالتأثير الإعتيادي (خاصة في الإستعمال طويل الأمد).
● جفاف في الفم، إمساك.
● فقدان الشهية للطعام، غثيان.
أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل):
● فقدان الرغبة الجنسية.
● صعوبات في الذاكرة، إرتباك.
● إزدواجية الرؤية.
● طفح جلدي.
● زيادة في الوزن.

أعراض جانبية شائعة غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعطيات المتوفرة):
● تطور تعلق - فريزيوم (تعلق جسدي أو نفسي) (خاصة بالإستعمال طويل الأمد).
● الشعور بعدم التواصل مع الواقع وعدم القدرة على التفكير أو الحكم بوضوح (ذهان).
● الشعور بالغضب.
● تغيرات في طريقة المشي.
● مشاكل في التنفس.
● حساسية لضوء الشمس.
● طفح حاك، تدرن (شرى).
● تقلصات عضلية أو ضعف عضلي.
● رد فعل أبطأ من المعتاد للأشياء.
● حركات سريعة وخارجة عن السيطرة للعينين.
● مشاكل في التعلم.
● درجة حرارة منخفضة بشكل شاذ للجسم.
● إحتماس البول.

الأعراض الجانبية شائعة أكثر في بداية العلاج، تستمر عادة لفترة قصيرة؛ بإرفاقها، تخالف في الفم، إمساك، فقدان الشهية للطعام، غثيان، إرتجاج في الأصابع، إذا كنت تتناول الدواء لفترة مطولة، يزداد احتمال ظهور الأعراض الجانبية التالية: قلق، إرتباك، إكتئاب، فقدان الشهية للطعام وصعوبات في النوم.
بعد التوقف عن العلاج، من الجائز حصول حالات فردية لظاهرة تشبه الفطام، خاصة بمقايير دوائية عالية أو بعد علاج مطول (في حالة إقراره من قبل الطبيب).
إذا كنت تشعر بأعراض إنسحابية كذلك التي فصلت في المقدمة أو أي عرض آخر، يجب إستشارة الطبيب.
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.
بالإمكان إستعمال دواء لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو أي طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>
(5) كيفية تخزين الدواء؟
تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم، لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة، يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.
لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو إلى القمامة المنزلية، أسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال، تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية
يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:
Lactose monohydrate, maize starch, talc, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما محتوى العلبة
الأقراص مستديرة وببضاض، مع خط للسطر والختم "B" في جانب واحد من الخط و"GI" في الجانب الثاني من الخط، مخنوم في القرص الثاني من القرص شعاع، يتوفر فريزيوم ضمن علبة لويحة ذات 10، 20 أو 30 قرصاً، من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العلبة.
صاحب التسجيل وعنوانه:
إم. بي. أي فارما م.ض، ص. ب. 5061 كد.ما.
تم تجريرها في كانون الأول 2024.
رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
125-90-24542
من أجل سهولة وتوحيث القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.