

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **ריוטריל**

**2.5 מ"ג/מ"ל**

טיפות

### **חומר פעיל**

1 מ"ל ריוטריל מכיל:

קלונאזפאם 2.5 מ"ג (clonazepam 2.5 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 6 - "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו שייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים, שלה תכונות מיוחדות המחייבות זהירות רבה בשימוש בה. יש חשיבות רבה במעקב רפואי צמוד עם נטילת תרופה זו.

כאשר אתה נוטל תרופה זו הקפד לפנות לרופא לאחר 2 עד 4 שבועות, כיוון שהטיפול נועד לתקופות קצרות בלבד. שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לכך שהשפעת התרופה תפחת. שימוש ממושך עלול לגרום לתופעה קשה של תלות, אשר תקשה על החולה להפסיק ליטול את התרופה. הפסקת טיפול בלתי מבוקרת עלולה להיות מלווה בתופעות גמילה, כגון מתח, עצבנות, בלבול, רעד, נדודי שינה, כאבי בטן, הקאות, בחילות, זיעה, עוויתות. לעיתים, שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לשינויים בדפוסי התנהגות ומחשבות טורדניות. במיוחד אצל קשישים מומלץ להישמר בעת ההליכה, כיוון שהתרופה פוגמת בערנות ולעיתים בתיאום תנועות הגוף, ועל-כן יש חשש למעידות או נפילות.

נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת האופיואידים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית (כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול באפילפסיה (מחלת הנפילה) או בהתקפי חרדה.

### **קבוצה תרפויטית:**

ריוטריל שייך לקבוצת תרופות הנקראות בנזודיאזפינים.

### **2. לפני השימוש בתרופה**

#### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל קלונאזפאם או לכל בנזודיאזפין אחר או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 – "מידע נוסף"). תסמינים לתגובה אלרגית יכולים להיות קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה, נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בחלקים אחרים בגוף, פריחה, גרד או סרפדת על העור.
- יש לך אי ספיקת כבד חמורה מאחר שבנזודיאזפינים עלולים להאיץ אנצפולופתיה כבדית.
- פיתחת התמכרות/תלות בסמים ממכרים, כולל אלכוהול.
- יש לך מחלת ריאות כרונית חמורה.
- יש לך מחלת כבד חמורה.

## אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

התרופה עלולה להיות ממכרת. הסיכונים להתמכרות גדולים יותר עבור מטופלים במינונים גבוהים או בטיפול ארוך טווח, או מטופלים אשר יש להם היסטוריה של אלכוהול או שימוש לרעה בסמים. יש לקחת ריווטריל כטיפות בלבד. ראה פרק 3 – "כיצד תשתמש בתרופה?" למידע נוסף. אם אינך בטוח האם אתה צריך להשתמש בריווטריל, פנה לרופא.

## לפני הטיפול בריווטריל, ספר לרופא אם

- את בהיריון או מתכננת להרות
- את מניקה או מתכננת להניק
- יש לך בעיות בריאותיות אחרות, כולל:
  - מחלת כבד, כליה או ריאה
  - לחץ דם גבוה או נמוך
  - מיאסתניה גראביס (חולשת שרירים חמורה)
  - דום נשימה (מצב שבו יש לך הפסקות זמניות בנשימה במהלך שינה)
  - גלאוקומה (מצב שבו יש לך לחץ גבוה בעין)
  - דיכאון, פסיכוזה או סכיזופרניה ו/או לך דיכאון, או מחשבות אובדניות
  - פורפיריה (הפרעה נדירה בפיגמנט בדם)
  - היסטוריה של שימוש לרעה באלכוהול או סמים
  - אם אתה שותה אלכוהול

## אזהרות נוספות

- ספר לרופא, לרופא השיניים ולרוקח המטפלים בך כי אתה נוטל ריווטריל.
- ספר לרופא אם מסיבה כלשהי לא נטלת את התכשיר בהתאם להנחיותיו. זאת מאחר שהרופא עלול לחשוב שהתכשיר אינו יעיל ועלול לשנות את טיפולך שלא לצורך.
- ספר לרופא אם אתה חש שריווטריל אינו עוזר למצבך הרפואי.
- יש להקפיד על מעקב רפואי רציף.
- יש להתייחס ברצינות לכל אמירה המרמזת על התאבדות או אלימות. ספר מייד לרופא אם יש לך מחשבה אובדנית כלשהי או שינויים נפשיים/מצבי רוח אחרים כמו חוסר מנוחה, תוקפנות, זעם, הזיות או כל תופעת לוואי התנהגותית או התנהגות לא רגילה.
- אין להשתמש בריווטריל לטיפול במצבים רפואיים אחרים ללא הנחיית הרופא.
- זהירות נדרשת בקשישים, במטופלים שאינם חשים בטוב, במטופלים לאחר שתיית אלכוהול או במטופלים שנוטלים תרופות אחרות.
- חלק מהמשמשים עשויים להרגיש תופעות לוואי כגון נמנום, בלבול, סחרחורת או חוסר יציבות אשר עלולים להגדיל את הסיכון לנפילות.

## ילדים ומתבגרים

הבטיחות והיעילות של ריווטריל בטיפול בהתקפי חרדה בילדים מתחת לגיל 18 איננה ידועה.

## בדיקות ומעקב

במשך תקופת הטיפול בריווטריל, ייתכן שתופנה על-ידי הרופא לבדיקות דם ובדיקות אחרות מעת לעת על מנת לבדוק את התקדמותך ולזהות תופעות לוואי.

## תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- טבליות לשינה, תרופות לשינה או תרופות הרגעה
- תרופות לדיכאון
- תרופות אחרות לאפילפסיה
- תרופות לאלרגיות או צינון כגון אנטי-היסטמינים
- משככי כאבים
- מרפי שרירים
- חומרים מאלחשים
- סימטידין – תרופה המשמשת לטיפול בכיבים
- דיסולפיראם – תרופה המשמשת לטיפול בשימוש לרעה באלכוהול

תרופות אלה עשויות להיות מושפעות על-ידי **ריוטריל** או עלולות להשפיע על האופן שבו **ריוטריל** פועל. הרופא או הרוקח יכולים לספר לך מה לעשות את אתה נוטל כל אחת מתרופות אלה. יש להם בנוסף רשימה מלאה יותר של תרופות אשר יש להיזהר או להימנע מהן כאשר לוקחים **ריוטריל**.

**נטילת תרופות שמדכאות את מערכת העצבים המרכזית (כולל סמים לא חוקיים)/תרופות מרגיעות**  
אין ליטול תרופות המדכאות את מערכת עצבים המרכזית, כגון תרופות הרגעה ותרופות מרדימות, בעת השימוש ב**ריוטריל**. תרופות אלו עלולות להגביר את ההשפעות של **ריוטריל**, מה שעלול להתבטא בתופעות לוואי חמורות לרבות ישנוניות חמורה, קשיי נשימה, תרדמת ומוות.

### **שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

אל תשתה אלכוהול כאשר אתה נוטל **ריוטריל**. אלכוהול עלול להגביר את ההשפעות של **ריוטריל** ולהוביל לתופעות לוואי חמורות, שעלולות להסתיים בתרדמת או מוות.

### **היריון והנקה**

אם את בהיריון, מתכננת להרות או מיניקה או מתכננת להניק יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

#### היריון

אם יש צורך לקחת **ריוטריל** כאשר את בהיריון, הרופא ידון בסיכונים ובתועלת עבורך ועבור העובר. אימהות שנוטלות יותר מתרופה אחת לטיפול באפילפסיה עלולות להיות בסיכון מוגבר למומים עובריים בהשוואה לאימהות שנוטלות תרופה אחת בלבד לאפילפסיה. נטילת **ריוטריל** בהיריון עלולה לגרום לתסמיני גמילה בתינוק כמו למשל חום גוף נמוך, גפיים שמוטים, בעיות האכלה וקשיי נשימה.

#### הנקה

אם את מיניקה או מתכננת להניק: **ריוטריל** עלול לעבור לחלב אם ועלול לגרום לנמנום ו/או בעיות האכלה. **ריוטריל** אינו מומלץ לשימוש בהנקה.

### **נהיגה ושימוש במכונות**

אין לנהוג או להפעיל מכונות עד אשר תדע כיצד התכשיר משפיע עליך. **ריוטריל** עלול לגרום לנמנום או סחרחורת בחלק מהמטופלים ולכן עשוי להשפיע על הערנות. ודא כי אתה יודע כיצד התכשיר משפיע עליך לפני שאתה נוהג ברכב או מפעיל מכונות או עושה כל פעילות אחרת אשר עלולה להיות מסוכנת אם אתה מנומנם, מסוחרר או לא ערני. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. ניתן לקחת **ריוטריל** עם או ללא אוכל.

#### **מינון מקובל באפילפסיה**

המינון של **ריוטריל** צריך להיות מותאם בנפרד לכל מטופל בהתאם לתגובה הקלינית של המטופל, הסבילות של התרופה וגיל המטופל.

מנה אחת של **ריוטריל** לבליעה מתחילה להשפיע בתוך 30-60 דקות ונשארת יעילה במשך 6-8 שעות בילדים ו-12-8 שעות במבוגרים.

כדי להימנע מתופעות לוואי בתחילת הטיפול, חיוני להתחיל את הטיפול ב**ריוטריל** במינון נמוך ולהעלות את המינון היומי באופן הדרגתי עד להגעה למינון האחזקה אשר מתאים לכל מטופל בנפרד.

פעוטות וילדים עד גיל 10 (או עד משקל של 30 ק"ג): המינון ההתחלתי הוא 0.01-0.03 מ"ג לכל ק"ג משקל גוף ליום, הניתן ב-2-3 מנות מחולקות. המינון היומי המרבי בילדים הוא 0.2 מ"ג לכל ק"ג משקל גוף ואין לעבור אותו. ילדים בגיל 10 עד 16: המינון ההתחלתי הוא 1-1.5 מ"ג ליום הניתן ב-2-3 מנות מחולקות. המינון יעלה באופן הדרגתי עד להגעה למינון האחזקה האישי (בדרך כלל 3-6 מ"ג ליום).

מבוגרים: אין לעבור את המינון ההתחלתי למבוגרים שהוא 1.5 מ"ג ליום המחולק ל-3 מנות. בדרך כלל מינון אחזקה של 3-6 מ"ג ליום מספיק. המינון המרבי למבוגרים הוא 20 מ"ג ליום ואין לעבור אותו.

יש לחלק את המינון היומי ל-3 מנות שוות. אם המנות לא מחולקות באופן שווה, יש לקחת את המנה הגדולה ביותר לפני השינה. רמת מינון האחזקה מושגת בצורה הטובה ביותר לאחר טיפול של 1-3 שבועות. לאחר שמגיעים לרמת מינון האחזקה, ניתן לקחת את הכמות היומית במנה אחת בערב.

### **מינון מקובל בהתקפי חרדה**

המינון ההתחלתי עבור מבוגרים עם חרדה הוא 0.25 מ"ג פעמיים ביום (0.5 מ"ג ליום).

מינון האחזקה הרגיל למבוגרים הוא 1 מ"ג פעמיים ביום (2 מ"ג ליום). מינון מרבי של 2 מ"ג פעמיים ביום (4 מ"ג ליום) עשוי להירשם על ידי הרופא במקרים יוצאי דופן.

לאחר שמגיעים למינון יציב, מטופלים יכולים להחליף למנה אחת ביום, הניתנת בדרך כלל לפני השינה.

הפסקת טיפול צריכה להיעשות בהדרגה.

### **אין לעבור על המנה המומלצת.**

### **אופן השימוש:**

#### **מדוד את מנת הריוטריל שנרשמה כטיפות בלבד.**

אין לטפטף ישירות מן הבקבוק לפה.

לאחר כל מתן, ודא כי המזלף מאובטח במקומו בתוך צוואר הבקבוק. יש לתת את הטיפות בכפית.

לאחר כל פתיחה של הבקבוק יש לוודא כי המזלף מאובטח במקומו בתוך צוואר הבקבוק.

ניתן למהול את התכשיר ריוטריל במים, תה או מיץ פירות.

יש להמשיך לקחת ריוטריל עד אשר הרופא אומר לך להפסיק. אין ליטול את התכשיר למשך זמן ארוך יותר ממה שנרשם לך על ידי הרופא.

אם אינך בטוח מה לעשות, שאל את הרופא או הרוקח.

### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם אתה חושב שאתה או כל אדם אחר השתמש במינון גבוה מדי של ריוטריל או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,

ספר על כך מייד לרופא או פנה לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

עשה זאת אפילו אם אין סימנים של אי-נוחות או הרעלה. אתה עשוי להזדקק לטיפול רפואי דחוף.

אם נטלת יותר מדי ריוטריל אתה עלול לחוש מנומנם, עייף, מבולבל, מסוחרר, לסבול מקשיי נשימה, חולשה או מחוסר הכרה.

### **אם שכחת ליטול את התרופה**

אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה בזמן הקבוע. אם לא, קח את

המנה ששכחת מייד כשנזכרת ולאחר מכן המשך לקחת כרגיל.

אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה

ללא התייעצות עם הרופא.

הורדת המינון או הפסקת הטיפול חייבת להיעשות בהתאם להנחיית הרופא ובאופן הדרגתי. הפסקה פתאומית של

הטיפול בריוטריל, עלולה לגרום להופעת תופעות בלתי רצויות. הרופא יסביר לך כיצד עליך להפחית בהדרגה את

המינון של ריוטריל עד אשר תוכל להפסיק את השימוש לגמרי.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ב**ריוטריל** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. אתה עלול להזדקק לטיפול רפואי אם תחוה חלק מתופעות הלוואי.

ספר לרופא המטפל או לרוקח בהקדם האפשרי אם אתה חש ברע במהלך הטיפול ב**ריוטריל**.

#### **תופעות לוואי חמורות**

**יש לפנות מייד לרופא או לפנות לחדר מיון של בית חולים הקרוב לביתך אם אתה מרגיש אחד מהבאים:**

- קשיים בנשימה
- חרדה או התרגשות פתאומית
- הזיות או מחשבות שווא
- הפרעות שינה חמורות
- תסמיני גמילה חמורים לאחר הפסקת הטיפול ב**ריוטריל** (כולל הפרעות פסיכולוגיות כמו הזיות, תחושה של התנתקות מהגוף, בלבול, דליריום, פסיכוזות)
- תופעות לוואי אלה נדירות.

#### **תופעות לוואי פחות חמורות**

**ספר לרופא אם אתה מרגיש אחת מתופעות הלוואי הבאות:**

- נמנום, עייפות
- סחרחורת, חוסר יציבות
- חולשת שרירים
- רעד
- בעיות זיכרון, חוסר תשומת לב, בלבול, חוסר ריכוז
- כאב ראש, הרגשת חמרמורת (הנגאובר) בבוקר
- דיבור לא ברור (בליעת מילים)
- חלומות לא נעימים
- דפיקות לב
- הקאות

#### **תופעות לוואי נוספות**

- ישנוניות
- סחרחורת
- קואורדינציה לא תקינה
- אטקסיה
- פגם בדיבור
- דיכאון
- הפרעות בזיכרון
- עצבנות
- ירידה ביכולת האינטלקטואלית
- אי-יציבות רגשית
- ירידה בדחף המיני (ליבידו)
- בלבול
- זיהום בדרכי נשימה עליונות
- סינוסיטיס
- דלקת אף
- שיעול
- דלקת לוע
- דלקת סמפונות
- עצירות
- ירידה בתיאבון
- כאב בטן
- עייפות
- תגובה אלרגית
- כאבי שרירים
- שפעת
- תכיפות בהטלת שתן

- זיהום בדרכי השתן
- ראייה מטושטשת
- נשים: כאבי וסת, דלקת בנרתיק
- גברים: עיכוב בפליטת זרע, אין אונות
- הגוף בכללותו: עלייה במשקל, תאונה, ירידה במשקל, פציעה, בצקת, חום, צמרמורת, שריטות, קרסול בצקתי, רגל בצקתית, בצקת סביב העיניים, תחושת חולי (מלזיה), כאב, דלקת רקמה תת-עורית (צלוליטיס), דלקת מקומית
- הפרעות לב: כאב בחזה, תת-לחץ דם בעמידה
- הפרעות מערכת העצבים המרכזית והפריפריית: מיגרנה, נימול, שכרות, הרגשה של אי-שליטה במתן שתן, שיתוק חלקי, רעד, עור צורב, נפילות, מלאות ראש, צרידות, היפראקטיביות, איבוד תחושה, לשון עבה, עוויתות הפרעות מערכת העיכול: אי-נוחות בטנית, דלקת במערכת העיכול, קלקול קיבה, כאב שיניים, נפיחנות, צרבת, רוק מוגבר, הפרעות בשיניים, תנועות מעיים (יציאות) תכופות, כאב באגן, קשיי עיכול, טחורים
- הפרעות שמיעה ואוזניים: ורטיגו, דלקת אוזניים, כאבי אוזניים, מחלת ים
- הפרעות קצב לב: דפיקות לב
- הפרעות מטבוליות ותזונה: צמא, שיגדון
- הפרעות מערכת שריר-שלד: כאב גב, שבר טראומטי, נקע, כאב ברגל, כאב בעורף, עוויתות בשרירים, עוויתות ברגל, כאב בקרסול, כאב בכתף, דלקת גיד, כאב במפרק, היפרטוניה, כאב בגב תחתון (לומבאגו), כאב בכפות הרגליים, כאב בלסת, כאב בברך, ברך נפוחה
- הפרעות מערכת הדם: דימום עורי
- הפרעות פסיכיאטריות: נדודי שינה, ביטול עכבות, חרדה, תחושת ניתוק מהגוף, חלומות מוגזמים, הגברת תיאבון, עלייה בדחף המיני (ליבידו), ירידה בתגובות, תוקפנות, אדישות, הפרעה בקשב, התרגשות, זעם, רעב, חריג, אשליות, סיוטים, הפרעה בשינה, מחשבות אובדניות, פיהוקים
- הפרעות מערכת רבייה נשית: כאב בשדיים, אי-סדירות בווסת
- הפרעות מערכת רבייה גברית: ירידה בפליטת זרע
- הפרעות במנגנוני עמידות: זיהום פטרייתי, זיהום נגיפי, זיהום סטרפטוקוק, זיהום הרפס סימפלקס, מונונוקלאזיס, קנדידיאזיס
- הפרעות מערכת הנשימה: התעטשות יתר, התקף אסתמה, קוצר נשימה, דימום מהאף, דלקת ריאות, דלקת צדר (פלאוריטיס)
- הפרעות עור ונספחים: התפרצות אקנה, התקרחות, יובש עור, דלקת עור ממגע (קונטקט דרמטיטיס), הסמקה, גרד, תגובה מגלתית, כוויות בעור, הפרעות בעור
- הפרעות חושים: איבוד טעם
- הפרעות מערכת השתן: כאב במתן שתן, דלקת שלפוחית השתן, השתנת יתר, אי-שליטה במתן שתן, תפקוד לקוי של השלפוחית, אצירת שתן, דימום במערכת השתן, שינוי צבע השתן
- הפרעות כלי דם: דלקת ורידים פקקתית ברגל (תרומבופלביטיס)
- הפרעות ראייה: גירוי בעין, הפרעות בראייה, ראייה כפולה, עוויתות בעין, שעורה, פגם בשדה הראייה, יובש עין

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.**

### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

### **תנאי אחסון:**

- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C. יש לאחסן את הבקבוק כשהוא ניצב ישר.
- ניתן להשתמש בתרופה עד 120 ימים מיום פתיחתה.
- בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

- השלך באופן מתאים כל תרופה שלא נעשה בה שימוש. אין להשליך את התרופה לפח האשפה הביתי או למי הביוב. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין לך בהן יותר צורך. צעדים אלו יעזרו להגן על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

peach flavour, saccharin sodium, brilliant blue FCF, acetic acid glacial, propylene glycol.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** התרופה **ריוטריל** משווקת כנוזל צלול בצבע כחול המיועד לבליעה. כל אריזה מכילה בקבוק זכוכית אחד הכולל טפטפת ובו 10 מ"ל של **ריוטריל**.

**שם בעל הרישום וכתובתו:** צמל ביו-פארמה בע"מ, רח' המגשימים 20, פתח-תקוה

**שם היצרן וכתובתו:**

Cheplapharm Arzneimittel GMBH Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

**נערך בפברואר 2025.**

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 061-31-21476-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

RIVO\_PIL\_TZ022025