

يُستَوَق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

فوريكونازول-تريما 200 ملغ

أقراص مطلية

يحتوي كل قرص مطلي على فوريكونازول 200 ملغ (voriconazole 200 mg) قائمة المواد غير الفعالة والمُثيرة للحساسية في المستحضر: أنظر الفصل 2 بند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موزجة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصفه لك لا تعطيه للآخرين. لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو كان يبدو لك تشابه بين حالتك وحالتهم وصحتهم.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

فوريكونازول-تريما هو مستحضر مضاد للفطريات واسع الطيف مخصص لعلاج:

• داء الرشاشيات الفزوي (عدوى ناجمة عن فطريات من صنف المُرشاشية - *Aspergillus*)
• حالات العدوى بالفينيتان (candida) في الجهاز الهضمي (candidemia) للمرضى الذين ليس لديهم قُلة العنولات

• حالات العدوى الفزوية بالفينيتان المقاومة للفوركونازول (دواء مضاد للفطريات آخر)، بما في ذلك *C. krusei*.

• حالات عدوى خفيفة ناجمة عن فطريات من صنف *Scedosporium* و- *Fusarium*.

فوريكونازول-تريما مخصص للمرضى لديهم حالات عدوى فطرية خطيرة، لا بل ربما تشكل خطرا على الحياة.

فوريكونازول-تريما مخصص لمنع حالات عدوى فطرية غزوية لدى من لديهم زرع نخاع العظم والذين في الاختيار مرتفع.

الفصيلة الألبية:

مضاد للفطريات من فصيلة التريازولات. يعمل عن طريق قتل أو وقف نمو الفطريات المختلفة التي تسبب حالات العدوى.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسا (أزجيا) للمادة الفعالة أو لأيّ واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء الفصيلة في الفصل 6.
- يُمنَع تناول هذا الدواء عن تريفتانيد (الحساسية)، أستيميزول (الحساسية)، نيسابيريد (المشاكل في المعدة)، بيوميزيد (المشاكل النفسية)، كينيدين (لمشاكل في نظم القلب)، إيفابرادين (العلاج قصور القلب المزمن)، ريفابوتين (علاج السل)، ريفاميسين (العلاج السل)، كاربامازيبين (العلاج الاختلاجات)، فينوباريتال (العلاج الاختلاجات والأرق الشديد)، مشتقات الأروغ (إرتروامين، ثنائي ميذولورغانين؛ علاج الشقيقة)، سيروليموس (لدى المرضى الذين خضعوا لزراعة أعضاء، إيفانفيرين بجرعة مقدارها 400 ملغ وما فوق مرة واحدة يوميا (HIV)، ريتونايفير في جرعات تعطي مرتين في اليوم، بمقدار 400 ملغ وما فوق في كل مرة (علاج HIV)، نبتة هيبيريكوم (St. John's wort)، ثازوكسيول (علاج الإسهال الناتج خاصة عن استعمال مسكنات الألم الأفيونية (مثل المورفين، أوكسيكودون، فنتانيل، ترامادول، كودابين))، تولفانين (انقص صوديوم الدم (hyponatremia) أو الإبطاء الانخفاض في وظائف الكلى لدى المتعالمين الذين يعانون من مرض الكلى المتعددة الكيتمات)، لوراسيدون (العلاج (الكتابة)، فينتوكلاكس (علاج متعالمين لديهم ابيضاض الدم الملغوي المزمن CLL).

قبل العلاج بد فوريكونازول-تريما، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من تفاعلات حسنسي لمستحضرات من فصيلة الأرولات.
- كنت تعاني من اعتلال عضلة القلب (cardiomyopathy)، نظم قلب غير منظم أو بطيء أو شاذ أو في محيط كهربائية القلب (ECG) الملقب بـ متلازمة QTc الطويلة.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض كبد. سوف يراقب الطبيب وظائف الكبد من خلال إجراء فحوصات دم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

- يجب تجنب أي ضوء شمس والتعرض للشمس أثناء استعمال الدواء. من المهم تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس واستعمال كريم واقي مع عامل حماية عالي (SPF)، حيث قد تكون هناك زيادة في حساسية الجلد الأشعة الشمس من نوع UV. قد يزداد هذا بسبب أدوية أخرى تزيد من الحساسية للضوء، مثل ميتوتركسات. ينطبق هذا التحذير أيضا على الأطفال.
- أثناء استعمال الدواء، أخبر الطبيب على الفور إذا كنت تطور حرق شمسي أو طفح جلدي شديد أو بثور في الجلد أو ألم في العظام. إذا ظهر أي من الأعراض الجانية، فمن المرجح أن يوجهك

- الطبيب على طبيب أمراض جلدية. هناك ضئيل لتطور سرطان جلد عند استعمال فوريكونازول-تريما على المدى الطويل.

- إذا كنت تطور علامات فشل الكبد العظيمة، حالة طبية لا تنتج فيها العدد الكظرية كميات كافية من بعض هرمونات الستيرويد مثل الكورتيزول، الذي قد يسبب أعراضا مثل التعب المزمن أو المستمر، ضعف العضلات، فقدان الشهية، فقدان الوزن، الآم البطن، يرجى منك إخبار الطبيب.
- إذا كنت تطور أعراض "متلازمة كوشينغ" التي ينتج فيها الجسم قلصا من هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل زيادة الوزن، تسرع دهنى بين الكتفين، استدارة الكعب، اسمرار الجلد في البطن، في العنقذين، في الثديين، والتراخي، جلد رقيق، الميل إلى الكدمات بسهولة، ارتفاع السكر في الدم، فرط الشعرانية، فرط التعرق، يرجى منك إخبار الطبيب.
- سيقوم الطبيب بمراقبة وظائف الكبد والكلى عن طريق إجراء فحوصات دم أثناء العلاج بد فوريكونازول-تريما.

قبل بدء العلاج وخلالها يجب إجراء مراقبة لاضطرابات مستوى الشوارد الكهربائية مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم، المغنيسيوم والكالسيوم.

الأطفال والمرافقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والرضع دون عمر ست سنوات (يمكن للأطفال فوق عمر ست سنوات استعمال الدواء فقط إذا كانوا قادرين على بلع الأقراص).

الفحوصات والمتابعة

نظرا لأن فوريكونازول-تريما يؤثر على الكبد والكلى، صوف يقوم الطبيب بمراقبة عمل الكبد والكلى عن طريق إجراء فحوصات دم. يرجى منك إخبار الطبيب إذا كنت تشعر بالألم في البطن أو إذا كان هناك تغيير في قوام البراز.

ردود الفعل بل الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرا أدوية أخرى. بما في ذلك أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تتناول:

أدوية التي يجب تجنب استخدامها أو بتوليفة مع فوريكونازول-تريما إن أمكن ويجب ملامعة الجرعة إذا تمّ إعطاهاها سوية:

- فينيتون (العلاج السرع). إذا كنت تتناول هذا الدواء ف يجب رصد مستوى الفينيتونين في الدم.
- ريوتنافير (علاج HIV) بجرعة منخفضة بمقدار 100 ملغ مرتين في اليوم. جرعات معينة من ريتونايفير لا يمكن تناولها مع فوريكونازول-تريما، انظر بند "لا يجوز استعمال الدواء إذا"، تحت هذا الفصل.
- جلاسيديجب (علاج السرطان) – إذا طلب منك استعمال الدوائين، سيقوم الطبيب بمراقبة نظم القلب في أوقات متقاربة أكثر.

أدوية بتوليفة مع فوريكونازول-تريما قد يطلب منك ملامعة الجرعة والمتابعة بأن الأدوية وأو فوريكونازول-تريما ما تزال آثار الفعالة المرغوبة.

- وارفارين ومضادات تخثر أخرى (مثل بنفروكومون، أسينوكرمول)
- سيكلوسبرين، تاكروليموس (لمتعالمين خضعوا لزراعة عضو)
- أدوية من نوع سولفونيل أوربا (مثل تولبوتמיד، غليبيزيد وجليبيريد) (علاج السكري)
- ستاتينات (مثل أورتوستاتين، فيمباساستاتين، لوماستاتين) (انخفاض مستويات الكولسترول)
- نورديزيبين (مثل ميذولام، إيزرازولام وتريازولام) (اللارق الشديد والتشنج)
- أوميفرازول (علاج قرحة المعدة)
- حروب منع الحمل (تحتفل أحرصا جانبية مثل غثيان واضطرابات في الدورة الشهرية)
- مشتقات فينكا (مثل فينكسرستين، فينيلاستين) (علاج السرطان)
- مُثبّطات عمل الميتوكوندريوز (مثل أكسييتين، بوسوتينيب، كيزوتننيس، سونتينيب، كويميتنيب، ذير افينيب، نازتننيب، نلوتننيس، سونتينيب، إبروتننيب، ريبوتسكليب (علاج السرطان)

- تريبتونين (العلاج ابيضاض الدم)
- ايندينافير ومثبّطات إنزيم HIV بروتياز أخرى (لعلاج HIV)
- أدوية من فصيلة NNR1 للعلاج HIV (مثل ديلافيرين، فينفيارين، إيفانفيرز) (يمنع تناول جرعات بعباد معينة من إيفانفيرز سوية مع فوريكونازول-تريما، انظر بند "لا يجوز استعمال الدواء إذا" تحت هذا الفصل)

- ميثانول (علاج الإدمان)
- الأفيونات قصيرة الأمد (مثل الفينيتانيل، فنتانيل، سوفيتانيل، مسكنات الألم بإجراءات جراحية) أوكسيكودون وهيدروكودون (تسكين الألم متعلقة حتى شديد)
- أدوية مضادة للالتهاب غير ستررويدية (مثل إيبوبروفين وديكولفيك) (علاج الألم والالتهاب)
- فلوكونازول (علاج حالات عدوى فطرية)
- أفروليموس (علاج سرطان متقدم في الكلية ولدى متعالمين اجتازوا زراعة أعضاء)
- إرتروموفير (العلاج مرض ناجم عن الفيروس المضخم الخلايا CMV) بعد زرع نخاع العظم)
- إيثاكتافور (علاج التليف الكيسي (CF))
- فولوكسالسيلين (مضاد حيوي يُستخدم لعلاج الحلاوى البكتيرية)

قائمة الأدوية التي يمنع تناولها بالتزامن مع فوريكونازول-تريما، الرجاء انظر بند "لا يجوز استعمال الدواء إذا" تحت هذا الفصل.

المحل والإرضاع

يجب استعمال الدواء إذا كنت حاملا، إلا إذا تلقيت أمرا صريحا من الطبيب بذلك. يجب على النساء بين الخصوية استعمال وسائل منع حمل ناجمة أثناء استعمال الدواء. إذا أصبحت حاملا أثناء تناول فوريكونازول-تريما توجهي إلى الطبيب فوراً.

إذا كنت حاملا أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل، استشريري الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

القيادة واستعمال الماكينات

قد يتسبب فوريكونازول-تريما بتوشش الرؤية أو التمسح من الضوء. إذا كنت تتأثر من ذلك فلا يجوز القيادة أو تشغيل الماكينات الخطيرة، إما بالنسبة للأطفال، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجات الهوائية أو من الألعاب بمقرعة الشارع وما شابه.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي الأقراص على لاكتوز ولهذا إذا قِبل لك من قِبل طبيب إن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول الدواء.

يحتوي الدواء على أقل من 1 مليون (23 ملغ) صوديوم للقرص الواحد، بمعنى أنه يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائما وفقا لتعليمات الطبيب.

يجب عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لو تكن واثقا بشأن الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيجدان من قبل الطبيب فقط. سوف يتم تحديد الجرعة اعتمادا على وزنك وصفك الهدي.

بالاعتماد على استجابتك للعلاج، من المرجح أن يرفع أو يخفض الطبيب الجرعة اليومية. إذا كان لديك مرض كبدِي، فمن المرجح أن يخفض الطبيب الجرعة.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب إعطاء الدواء اللطف فقط إذا كان الطفل قادرا على بلع الأقراص (ويكّل الأحوال ليس قبل 6 جيل 6 سنوات).

إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان فوريكونازول-تريما لمنع حالات العدوى الفطرية، فمن الجائز أن يقوم الطبيب بوقف العلاج إذا كنت أو طفلك تطوران أعراضا مرافقة للعلاج.

يجب تناول القرص على الأقل ساعة قبل أو ساعة بعد وجبة الطعام. يجب بلع القرص بكامله مع قليل من الماء.

في حال عدم وجود شطر، يمنع شطر القرص. لا تتوفر معلومات حول السحق/ المضغ.

إذا **تناولت** عن طريق الخطأ، إذا قام طفك بإبتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، فتوجه فوراً إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفك بإبتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، فتوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك. من الجائز أن تشعر بزيادة الحساسية للشمس نتيجة لتناول مفرط.

إذا نسيبت تناول الدواء

من المهم تناول الدواء كل يوم في وقت محدد.

إذا نسيبت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد، ولكن **يُمنَع** أي حال من الأحوال تناول جرعة مصفاة لتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج كما راسمي به من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنَع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

استمر في تناول الدواء حتى يأمرك الطبيب بالتوقف. إذا توقفت عن تناول الدواء مبكرا، فقد تستمر العدوى أو تعود. لدى المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو مع حالات عدوى صعبة فمن الجائز أن تكون هناك حاجة إلى علاج طويل الأمد لمنع تكرار العدوى.

يُمنَع تناول الأدوية في تلك الحالة تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، قد يسبب استعمال فوريكونازول-تريما أعراضا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتحدث عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها. أعراض جانبية خطيرة – **يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب**

- طفح
- يرقان، تغير في نتائج فحص وظائف الكبد بفحص الدم
- تهاب البنكرياس (pancreatitis)

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جدا (من المرجح أن تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- ضعف بالرؤية (تغيرات) في الرؤية بما في ذلك عدم وضوح الرؤية، تغيرات في الألوان، زيادة

الحساسية للضوء، عمى ألوان، ضعف البصير، رؤية هائلة، عمى ليلي، ثقل بصري، رؤية شرار، رؤية أزرّة، انخفاض حدة البصر، بهر (الجهر من شدة الضوء)، تضيق مجال الرؤية، بقع/نقاط في مجال الرؤية

- سخونة عالية
- طفح
- غثيان، تقيؤ، إسهال
- صداع
- تورم في الأطراف
- أوجاع في البطن
- صعوبة في التنفس
- زيادة في إزيمات الكبد

أعراض جانبية شائعة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللثة، تشنجات، ضعف
- التهاب الحلق، وبعض حالات الدم الحمراء وآل والبياض، بصورة خطيرة (مصحوب أحياناً بسخونة)، انخفاض مستوى الصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم، انخفاض مستوى
- انخفاض مستوى السكر في الدم، انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، انخفاض مستوى الصوديوم في الدم
- قلق، عدم راحة، اكتئاب، ارتباك، صعوبة النوم، هلوسة
- اختلاجات، رجفان أو حركات العضلات لا إرادية، إحساس بالوخز أو احساس جلدية غير عادية، زيادة في تورّية العضلات، غثاس، دوخة
- نزيف في العين
- مشاكل في نظم القلب بما في ذلك نبض سريع/بطي جداً، إغماء
- انخفاض ضغط الدم، التهاب وريدي (phlebitis)
- صعوبات خطيرة في التنفس، ألم في الصدر، تورم في الوجه (القم، الشفتين وحول العينين)، احتباس السوائل في الرئتين

- إمساك، عسر الهضم، التهاب الشفتين
- بقران، التهاب الكبد (hepatitis) وتلف الكبد
- حالات طفح جلدية التي يمكن أن تسبب قشوراً خيطياً وبقعاً في الجلد التي تتميز بمنطقة حمراء ومسطحة في الجلد مغطاة ببتوات صغيرة متصلة، احمرار في الجلد
- تساقط الشعر
- آلام الظهر
- فشل كلوي، دم في البول، تغيرات في فحوصات وظائف الكلى
- حروق الشمس أو ردة فعل جلدية خطيرة نتيجة التعرض للضوء أو للشمس
- سرطان الجلد

أعراض جانبية غير شائعة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):

- أعراض شبيهة بالفلونزا، تهيج والتهاب في الجهاز الهضمي، التهاب الجهاز الهضمي الذي يسبب الإسهال، التهاب الجهاز المناعي
- التهاب النسيج الرقيق الموجود في الجدار الداخلي للبلطن والذي يغطي جوف البطن
- تضخم الغدد الليمفاوية (مؤلّم في بعض الأحيان)، فشل نخاع العظم، زيادة في مستوى الخلايا الليمفاوية في الدم
- تراجع في الأداء الوظيفي للغدة الكظرية، قصور الغدة الكظرية
- آداء وظائفي غير سليم للدماع، أعراض قصيرة بمرض البرنكسون، ضرر عصبي الذي يسبب التنميل، الألم أو الوخز أو الإحساس بالحرق في الأطراف
- مشكلة في التوازن أو التنسيق
- تورم في الصمغ
- رؤية مزدوجة، حالات خطيرة في العين والتي تشمل ألماً والتهاب في العينين والحفصين، حركية غير عادية للعين، وتلف العصب البصري مما يسبب اضطراباً بصرياً، تورم القرص البصري

- انخفاض الحساسية للشمس
- تغير في حساسية التذوق
- اضطرابات في السمع، رنين في الأذنين، الدوار (الشعور بالدوران)
- التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والإناتي عشر، تورم والتهاب اللسان
- تضخم الكبد، فشل الكبد، حصى أو مرض في كيس المرارة
- التهاب المفاصل، التهاب وريدي المصحوب بتشكّل خثر دموية (تجلط الدم)
- التهاب الكلى، بروثين في البول، تضنر الكلى
- نظم قلب سريع جداً أو توقيت ضربات، مصحوب أحياناً بنفضات كهربائية غير منتظمة

- تغيرات في مخطط كهربية القلب (ECG)
- زيادة في مستوى الكوليسترول في الدم، زيادة في مستوى اليوريا في الدم
- ردود فعل تحسسية للجلد (خطيرة في بعض الأحيان) بما في ذلك حالات في الجلد تشكل خطراً على الحياة والتي تسبب ظهور بثور مؤلمة، جروح/ثآليل في الجلد والأسجة المخاطية، وخاصة في الفم، التهاب جلد، شرى، جلد أحمر ومتهيّج، بقع حمراء أو أرجوانية في الجلد

بسبب انخفاض تعداد الصفائح الدموية، أكزيما

- رد فعل تحسسي أو استجابة مناعية غير طبيعية
- التهاب النسيج المحيط بالعظم

أعراض جانبية نادرة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):

- فرط نشاط الغدة الدرقية
- تدهور في أداء وظائف الدماغ (مضاعفات خطيرة لمرض كبدي)
- تضنر خطير في العصب البصري، تمكّر القرنية، حركات لا إرادية للعينين
- ظهور بثور نتيجة الحساسية/التعرض للضوء
- اضطراب بهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم جزءاً من الجهاز العصبي المحيطي
- مشاكل في نظم القلب أو التوصيل الكهربائي (يشكل خطراً على الحياة في بعض الأحيان)
- رد فعل تحسسي بشكل خطراً على الحياة
- اضطراب في جهاز تنفّر الدم
- تشنّج ردود الفعل التحسسية في الجلد (أحياناً خطيرة) تورماً سريعاً (وذمة) في الجلد، بقع حمراء أو مؤلمة حول السجك، حمّز مع قشور، حكة في الجلد والأسجة المخاطية، وهي حالة جلدية تشكّل خطراً على الحياة تنتسب في انفصال أجزاء كبيرة من البشرة (الطبقة الخارجية من الجلد) من الطبقات السفلى من الجلد.
- بقع جلدية صغيرة، جافة وحرقشفية، أحياناً مسيكة مع "قرون".

أعراض جانبية التي شيوها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد شيوها بعد):

- نمش وبقع صغيرة
- أعراض جانبية التي شيوها غير معروف (أعراض جانبية لم يتم تحديد شيوها بعد)، ولكنها ذات اعتبار ويجب التبليغ عنها إلى الطبيب المعالج على الفور:
- مناطق حمراء وكدمات في الجلد أو كدمات في الجلد على شكل يشبه الحلقة التي قد تكون عارض لمرض مناعة ذاتية يسمى ذئبة حمامية جلدية.
- هناك تقارير عن تطوّر سرطان الجلد في مرضى قد تناولوا فوريكوثا ول-تريما لفترة طويلة من الزمن.
- لقد تمّ ملاحظة تطوّر شمس أو رد فعل جلدي خطير، نتيجة التعرض للضوء أو للشمس، بتواتر أعلى لدى الأطفال. إذا كنت أنت/طفلك تظنون اضطرابات جلدية، فمن الجائز أن يوجهك الطبيب المعالج إلى طبيب الأمراض الجلدية، الذي سوف يعدّ التشاور ما إذا كان من المهم حضورك أنت/طفلك للمتابعة على أساس منتظم. ولقد تمّ أيضاً ملاحظة زيادة في إزيمات الكبد بتواتر أعلى لدى الأطفال.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يُمكن تبليغ أو الإبلاغ عن أعراض جانبية عن الصحة عن أعراض جانبية نتيجة علاج دونائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يتحوّل إلى إسمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

كذلك، يُمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية للبريد الإلكتروني: Safety@trima.co.il

5. كيفية تخزين الدواء

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلّق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين في مكان جاف، بدرجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, povidone, pregelatinized starch, magnesium stearate, HPMC, titanium dioxide, polyethylene glycol.

كيف يبدو الدواء وماذا العبوة:

تحتوي كل عبوة على 14 أو 28 قرصاً مطلياً، مطاولة ومحتبة من كلا الجهتين، لونها أبيض. المنتج وصاحب التسجيل: تريما منتجات طبية إسرائيلية معبوت م.ص، معبوت 4023000، إسرائيل.

تم تحريرها في حزيران 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 151.41.33937.00 لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. هذا عدّ فالواء معدّ لإبناء كل الجنسين.