עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

וריקונזולד-תרימה 200 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה וריקונזול 200 מ"ג (voriconazole 200 mg) רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגיים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

וריקונזול-תרימה הוא תכשיר אנטי פטריתי רחב טווח המיועד לטיפול ב:
- אספרגילוזיס פולשני (זיהום הנגרם על ידי פטריות מהסוג אספרגילוס)
- זיהומים של קנדידה במערכת הדם (קנדידמיה) בחולים שאינם נויטרופניים
- זיהומים פולשניים של קנדידה שעמידים לפלוקונזול (תרופה אנטי פטריתית אחרת), כולל *C. krusei*
- זיהומים פטריתיים חמורים הנגרמים על ידי פטריות מסוגים *Scedosporium* ו- *Fusarium*

וריקונזול-תרימה מיועד לחולים עם זיהומים פטריתיים חמורים, אולי אף מסכני חיים. וריקונזול-תרימה מיועד למניעת זיהומים פטריתיים פולשניים אצל מושתלי מח עצם הנמצאים בסיכון גבוה.

קבוצה תרפויטית:
אנטי פטריתי מקבוצת הטריאזולים. הוא פועל באמצעות הריגה או עצירת הצמיחה של פטריות שונות הגורמות לזיהומים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המפורטים בפרק 6.
- אין ליטול תרופה זו עם טרפנדין (לאלרגיה), אסטמיזול (לאלרגיה), ציסאפריד (לבעיות בקיבה), פימוזיד (לבעיות נפשיות), קינידין (לבעיות בקצב הלב), ריפמפצין (לטיפול בשחפת), קרבמזפין (לטיפול בפרכוסים), פנוברביטל (לטיפול בפרכוסים ובנדודי שינה חמורים), נגזרות של ארגוט (ארגוטמין, דיהידרוארגוטמין; לטיפול במיגרנות), סירולימוס (בחולים שעברו השתלה), אפאוירנז במינון 400 מ"ג ויותר פעם ביום (לטיפול ב-HIV), ריטונאביר במינונים הניתנים פעמיים ביום, של 400 מ"ג ויותר בכל פעם (לטיפול ב-HIV), צמח הסיפריסיון (St. John's wort), נאלוקסגול (לטיפול בעצירות הנגרמת בעיקר משימוש במשככי כאבים מסוג אופיואידים (למשל מורפין), אוקסיקודון, פנטניל, טרמדול, קודאין)), טולבפנון (לטיפול בהיפונתרמיה (רמות נמוכות של נתרן בדם) או להאט את הירידה בתפקוד הכליות במטופלים עם מחלת כליות פוליציסטית), לורסיזין (לטיפול בדיכאון), ונטולקלס (לטיפול במטופלים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית - CLL).

לפני הטיפול בוריקונזולד-תרימה, ספר לרופא אם:
- אתה סובל או סבלת בעבר מתגובה אלרגית לתכשירים מקבוצת האזולים.
- אתה סובל ממחלה של שריר הלב (קרדיומיופתיה), קצב לב לא סדיר או איטי או חריגה באלקטרוקרדיוגרם (אק"ג) המכונה 'תסמונת QTc מוארכ'.
- אתה סובל או סבלת בעבר ממחלת כבד. הרופא ינטר את תפקודי הכבד על ידי ביצוע בדיקות דם.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
- יש להימנע מכל אור שמש וחשיפה לשמש בזמן השימוש בתרופה. חשוב לכסות אזורי עור חשופים לשמש ולהשתמש בקרם הגנה עם מקדם הגנה (SPF) גבוה, מכיוון שעלולה להיות עלייה ברגישות העור לקרני ה-UV של השמש. זו עלולה להתגבר עוד יותר על ידי תרופות אחרות המעלות את הרגישות לאור, כגון מתוטרקסאט. אזהרה זו מתייחסת גם ליילדים.
- בזמן השימוש בתרופה, ספר מייד לרופא אם אתה מפתח כוויית שמש, פריחה חמורה או שלפוחיות בעור, כאבים בעצמות. אם הופיעה אחת מהתופעות העוויתיות, הרופא עשוי להפנות אותך לרופא עור. ישנו סיכוי קטן להתפתחות סרטן העור בשימוש ארוך טווח עם וריקונזולד-תרימה.
- אם אתה מפתח סימנים של 'כשל יותרת הכליה', מצב רפואי שבו בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות כמויות מספיקות של הורמונים סטרואידיים מסוימים כגון קורטיזול, העלול לגרום לתסמינים כגון עייפות כרונית או מתמשכת, חולשת שרירים, אובדן תיאבון, ירידה במשקל, כאבי בטן, אנא ספר לרופא.
- אם אתה מפתח תסמינים של 'תסמונת קושינג' שבה הגוף מייצר עודף של ההורמון קורטיזול אשר עלול להוביל לתסמינים כגון עלייה במשקל, רקמה שומנית בין הכתפיים, פנים מעוגלות, התכהות העור בבטן, בירכיים, בשדיים ובזרועות, עור דק, נטייה לחבורות בקלות, סוכר גבוה בדם, שיעור יתר, הזעת יתר, אנא ספר לרופא.
- הרופא ינטר תפקודי כבד וכליות על ידי ביצוע בדיקות דם במהלך הטיפול בוריקונזולד-תרימה.
- לפני התחלת הטיפול ובמהלכו יש לבצע ניטור להפרעות ברמות אלקטרוליטים כגון רמות נמוכות של אשלגן, מגנזיום וסידן.

ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל שש (ילדים מעל גיל שש יכולים להשתמש בתרופה רק אם הם מסוגלים לבלוע טבליות).

בדיקות ומעקב
היות שוריקונזולד-תרימה משפיע על הכבד והכליות, הרופא ינטר את תפקוד הכבד והכליות על ידי ביצוע בדיקות דם. אנא ספר לרופא אם אתה בכאבי בטן או אם יש שינוי במרקם הצואה.

תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח: תרופות שיש להימנע מלתת בשילוב עם וריקונזולד-תרימה במידת האפשר ונדרשת התאמת מינון אם ניתנות יחד:
- פניטואין (לטיפול באפילפסיה). אם אתה נוטל תרופה זו יש לנטר את רמת הפניטואין בדם.
- ריטונאביר (לטיפול ב-HIV) במינון נמוך של 100 מ"ג פעמיים ביום. מינונים מסוימים של ריטונאביר לא ניתן ליטול עם וריקונזולד-תרימה, ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם", תחת פרק זה.
- גלסגדיב (לטיפול בסרטן) - אם אתה נדרש להשתמש בשתי התרופות, הרופא ינטר את קצב הלב לעיתים קרובות יותר.

תרופות שבשילוב עם וריקונזולד-תרימה ייתכן שיידרשו התאמת מינון ומעקב לכך שהתרופות ו/או וריקונזולד-תרימה עדיין בעלות האפקט הרצוי:
- וארפרין וונוגד קרישה אחרים (כגון פנפרוקומון, אסנוקומרול)
- ציקלוספורין, טקרולימוס (למטופלים שעברו השתלה)
- תרופות מסוג סולפונילאוראה (כגון טולבוטמיד, גליפיזיד וגליבוריד) (לטיפול בסוכרת)
- סטטינים (כגון אטורבסטטין, סימבסטטין, לובסטטין) (להורדת רמות כולסטרול)
- בנזודיאזפינים (כגון מידזולאם, אלפרזולאם וטריאזולאם) (לנדאי שינה חמורים ולהרגעה)
- אומפרזול (לטיפול בכיב קיבה)
- גלולות למניעת היריון (ייתכנו תופעות לוואי כגון בחילה והפרעות במחזור החודשי)
- נגזרות וינקה (כגון וינקריסטין, וינבלסטין) (לטיפול בסרטן)
- מעכבי טירוזין קינאז (כגון אקסיטיניב, בוסוטיניב, קבוזנטיניב, סריטיניב, קובימטיניב, דברפניב, דזטיניב, נילוטיניב, סוניטיניב, איברוטיניב, ריבוציקליב) (לטיפול בסרטן)
- טרטינאין (לטיפול בלוקמיה)
- אינדינאביר ומעכבי האנזים HIV פרוטאז אחרים (לטיפול ב-HIV)
- תרופות ממשפחת NNRTI לטיפול ב-HIV (כגון דלאוירדין, נוויראפין, אפאווירנז) (מינונים מסוימים של אפאווירנז לא ניתן ליטול עם וריקונזולד-תרימה, ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם" תחת פרק זה)
- מתדון (לטיפול בהתמכרות)
- אופיאטים קצרי טווח (כגון אלפנטניל, פנטניל, סופנטניל) (משככי כאבים בהליכים כירורגיים)
- אוקסיקודון והידרוקודון (לשיכוך כאבים בינוניים עד חזקים)
- תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (כגון איבופרופן ודיקלופנק) (לטיפול בכאב ובדלקת)
- פלוקונזול (לטיפול בזיהומים פטריתיים)
- אוורולימוס (לטיפול בסרטן מתקדם בכליה ובמטופלים שעברו השתלה)
- לטרמוביר (למניעה של מחלה הנגרמת על ידי ציטומגלו-וירוס (CMV) לאחר השתלת מח עצם)
- איבקפטון (לטיפול בסיסטיק פיברוזיס (CF))
- פולוקלוקסצילין (אנטיביוטיקה המשמשת לטיפול בזיהומים חיידקיים)

אין לטבול את הטבלייה לפחות שעה לפני או שעה אחרי ארוחה. יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה עם מעט מים.
בהיעדר קו חציה, אסור לחצות את הטבלייה. אין מידע לגבי כתישה/לעיסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. ייתכן שתחוש רגישות מוגברת לאור כתוצאה מנטילת יתר.

אם שכחת ליטול את התרופה
חשוב ליטול את התרופה בכל יום בשעה קבועה.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל, אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להמשיך לקחת את התרופה עד שהרופא ינחה אותך להפסיק. אם אתה מפסיק את נטילת התרופה מוקדם, הזיהום עלול להישאר או לחזור. במטופלים עם מערכת חיסון מוחלשת או עם זיהומים קשים ייתכן שיידרש טיפול ארוך טווח כדי למנוע את חזרת הזיהום.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוריקונזולד-תרימה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות – יש להפסיק ליטול את התרופה ולפנות מייד לרופא
- פריחה
- צהבת; שינוי בתוצאות בדיקת תפקודי כבד בבדיקת דם
- דלקת בלבלב (פנקריאטיטיס)

לרשימת תרופות שאין ליטול בו זמנית עם וריקונזולד-תרימה, אנא ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם" תחת פרק זה.

היריון והנקה
אין להשתמש בתרופה אם את בהיריון, אלא אם קיבלת הוראה מפורשת מהרופא. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן השימוש בתרופה. אם נכנסת להיריון בזמן נטילת וריקונזולד-תרימה פני לרופא מייד.
אם את בהיריון או מיניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, היוועצי ברופא לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות
וריקונזולד-תרימה עלול לגרום לטשטוש בראייה או לרגישות לאור. אם אתה מושפע מכך, אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
הטבליות מכילות לקטוז ולכן אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת התרופה.
התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן לטבלייה, כלומר נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון ייקבע כתלות במשקלך ובסוג הזיהום.
כתלות בתגובתך לטיפול, הרופא עשוי להעלות או להוריד את המינון היומי.
אם יש לך מחלת כבד, הרופא עשוי להפחית את המינון.

אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לתת לילד את התרופה רק אם הילד מסוגל לבלוע טבליות (ובכל מקרה לא לפני גיל 6 שנים).

אם את או ילדך נוטלים וריקונזולד-תרימה למניעת זיהומים פטריתיים, ייתכן שהרופא יפסיק את הטיפול אם אתה או ילדך מפתחים תופעות לוואי נלוות לטיפול.

יש ליטול את הטבלייה לפחות שעה לפני או שעה אחרי ארוחה. יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה עם מעט מים.
בהיעדר קו חציה, אסור לחצות את הטבלייה. אין מידע לגבי כתישה/לעיסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. ייתכן שתחוש רגישות מוגברת לאור כתוצאה מנטילת יתר.

אם שכחת ליטול את התרופה
חשוב ליטול את התרופה בכל יום בשעה קבועה.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל, אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להמשיך לקחת את התרופה עד שהרופא ינחה אותך להפסיק. אם אתה מפסיק את נטילת התרופה מוקדם, הזיהום עלול להישאר או לחזור. במטופלים עם מערכת חיסון מוחלשת או עם זיהומים קשים ייתכן שיידרש טיפול ארוך טווח כדי למנוע את חזרת הזיהום.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוריקונזולד-תרימה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות – יש להפסיק ליטול את התרופה ולפנות מייד לרופא
- פריחה
- צהבת; שינוי בתוצאות בדיקת תפקודי כבד בבדיקת דם
- דלקת בלבלב (פנקריאטיטיס)

תופעות לוואי נוספות
תופעות לוואי שכיחות מאוד (עשויות להופיע ביותר מ-1 מתוך 10 אנשים):
- ליקוי בראייה (שינויים בראייה כולל ראייה מטושטשת, שינויים בצבעים, רגישות מוגברת לאור, עיוורון צבעים, ליקוי בעין, ראיית הילה, עיוורון לילה, תנודתיות בראייה, ראיית ניצוצות, ראיית אאורה, ירידה בחדות הראייה, סינוור, צמצום שדה הראייה, כתמים/נקודות בשדה הראייה)
- חום גבוה
- פריחה
- בחילה, הקאה, שלשול
- כאב ראש
- נפיחות בגפיים
- כאבי בטן
- קשיי נשימה
- עלייה באנזימי כבד

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 10 אנשים):
- סינוסיטיס, דלקת בחניכיים, צמרמורת, חולשה
- רמה נמוכה, כולל חמורה, של חלק מתאי הדם האדומים ו/או הלבנים (לעיתים מלווה בחום), רמה נמוכה של טסיות העוזרות בקרישת הדם
- רמה נמוכה של סוכר בדם, רמה נמוכה של אשלגן בדם, רמה נמוכה של נתרן בדם
- חרדה, חוסר מנוחה, דיכאון, בלבול, קשיי שינה, הזיות
- פרכוסים, רעד או תנועות שרירים לא רצוניות, תחושת עקצוץ או תחושות עוויות לא רגילות, עלייה בטונוס (מתח) שרירים, ישנוניות, סחרחורת
- דימום בעין
- בעיות בקצב הלב כולל דופק מהיר/איטי מאוד, עילפון
- לחץ דם נמוך, דלקת ורידים (פלביטיס)
- קשיי נשימה חמורים, כאב בחזה, נפיחות בפנים (פה, שפתיים ומסביב לעיניים), אצירת נוזלים בריאות
- עצירות, קשיי עיכול, דלקת בשפתיים
- צהבת, דלקת בכבד (הפטיטיס) ופגיעה בכבד
- פריחות בעור העלולות לגרום לקילוף חמור ולשלפוחיות בעור המתאפיינות באזור אדום ושטוח בעור המכוסה בבליטות קטנות מחוברות, אדמומיות בעור
- גרד
- נשירת שיער
- כאב גב
- אי ספיקת כליות, דם בשתן, שינויים בבדיקות תפקוד הכליות
- כוויה שמש או תגובה עורית חמורה כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש
- סרטן עור

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 100 אנשים):
- תסמונים דמויי שפעת, צירוי ודלקת במערכת העיכול, דלקת במערכת העיכול הגורמת לשלשול, דלקת במערכת הלימפה
- דלקת ברקמה הדקה הנמצאת בדופן הפנימית של הבטן ומכסה את חלל הבטן
- בלוטות לימפה מוגדלות (לעיתים כואבות), כשל מח העצם, עלייה ברמת האאוזינופילים בדם
- ירידה בתפקוד בלוטת יותרת הכליה, תת-פעילות של בלוטת התריס
- תפקוד מוחי לא תקין, תסמינים דמויי פרקינסון, פגיעה עצבית הגורמת לחוסר תחושה, כאב, עקצוץ או תחושת בערה בגפיים
- בעיה בשיווי משקל או בקואורדינציה
- נפיחות במוח
- ראייה כפולה, מצבים חמורים בעין הכוללים כאב ודלקת בעיניים ובעפעפיים, תנועתיות לא רגילה של העין, נזק לעצב הראייה הגורם להפרעה בראייה, נפיחות בדיסק האופטי
- ירידה ברגישות למגע
- שינוי בחוש הטעם
- הפרעות בשמיעה, צלצולים באוזניים, ורטיגו (תחושת סחרור)
- דלקת באיברים פנימיים מסוימים – לבלב ותריסריון, נפיחות ודלקת בלשון
- הגדלת הכבד, אי-ספיקת כבד, אבנים או מחלה ביכיס המרה
- דלקת מפרקים, דלקת ורידים המלווה ביצירת קריש דם (פקקת)
- דלקת בכליה, חלבון בשתן, נזק לכליה
- קצב לב מאוד מהיר או החסרת פעימות, לעיתים מלווה באימפולסים חשמליים לא קבועים
- שינויים באלקטרוקרדיוגרם (אק"ג)
- עלייה ברמת הכולסטרול בדם, עלייה ברמת האוראה בדם
- תגובות אלרגיות בעור (לעיתים חמורות) כולל מצבים מסכני חיים בעור הגורמים להופעת שלפוחיות כואבות, פצעים/יבלות בעור וברקמות ריריות, במיוחד בפה, דלקת בעור, חרלת, עור אדמומי ומגורה, כתמים אדומים או סגולים בעור עקב ירידה בספירת טסיות הדם, אקזמה
- תגובה אלרגית או תגובה חריגה של מערכת החיסון
- דלקת של הרקמה המקיפה את העצם

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 1,000 אנשים):
- פעילות יתר של בלוטת התריס
- הידרדרות בתפקוד המוחי (סיבוך חמור של מחלת כבד)
- נזק חמור לעצב הראייה, עיכרות בקרנית, תנועות עיניים לא רצוניות
- הופעת שלפוחיות כתוצאה מרגישות/חשיפה לאור
- הפרעה שבה מערכת החיסון של הגוף תוקפת חלק ממערכת העצבים ההיקפית
- בעיות בקצב או בהולכה של הלב (לעיתים מסכנות חיים)
- תגובה אלרגית מסכנת חיים
- הפרעה במערכת הקרישה בדם
- תגובות אלרגיות בעור (לעיתים חמורות) כולל התנפחות מהירה (בצקת) בעור, כתמים מגרדים או כואבים של עור עבה, אדמומי עם קשקשים, גרד בעור וברקמות ריריות, מצב עורי מסכן חיים אשר גורם לחלקים נרחבים של האפידרמיס (השכבה החיצונית של העור) להיפרד משכבות העור התחתונות
- כתמי עור קטנים, יבשים וקשקשים, לעיתים מעובים עם "קרניים".

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):
- נמשים וכתמי פיגמנטציה

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה), אך הן משמעותיות ויש לדווח עליהן מייד לרופא המטפל:
אזורים אדומים ומתקלפים בעור או חבורות בעור בצורה דמוית טבעת העלולים להיות תסמין למחלה אוטואימונית הנקראת זאבת אדמנתית עורית.
קיימים דיווחים על ההתפתחות סרטן העור במטופלים אשר נטלו וריקונזולד-תרימה למשך תקופה ארוכה.
כוויית שמש או תגובה עורית חמורה, כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש, נצפתה בשכיחות גבוהה יותר אצל ילדים. אם אתה/ילדך מפתח הפרעות בעור, ייתכן שתופנה על ידי הרופא המטפל לרופא עור, אשר לאחר ייעוץ יחליט אם חשוב שאתה/ילדך תגיעו למעקב על בסיס קבוע. עלייה באמזימי כבד גם גן נצפתה בשכיחות גבוהה יותר אצל ילדים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il
בנוסף ניתן לדווח על תופעות לוואי לדוא"ל: Safety@trima.co.il

5. איך לאחסן את התרופה

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או דינוקות על מנת למנוע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון: יש לאחסן במקום יבש, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, povidone, pregelatinized starch, magnesium stearate, HPMC, titanium dioxide, polyethylene glycol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
כל אריזה מכילה 14 או 28 טבליות מצופות, מוארכות וקמורות משני צידיהן, שצבען לבן.

היצרן ובעל הרישיון: תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.
נערך ביוני 2024.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
151.41.33937.00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.