

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

أوجمنتين معلق 400 ملغ/5 ملل

مسحوق لتحضير معلق للشرب

يحتوي كل 5 ملل معلق على:

400 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

57 ملغ حمض كلافلونيك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

يحتوي كل 1 ملل معلق على:

80 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

11.4 ملغ حمض كلافلونيك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء من أجلك/من أجل طفلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل أوجمنتين لدى الكبار، الأطفال والرضع لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- تلوثات في الطرق التنفسية
- تلوثات في المسالك البولية
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة، بما في ذلك التلوثات في الأسنان
- تلوثات في العظام والمفاصل
- التهاب اللوزتين المتكرر.

لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص متعاليين دون عمر شهرين.

أوجمنتين عبارة عن مضاد حيوي الذي يعمل بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على دوائين إثنين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلافلونيك. ينتمي أموكسيسيلين لفصيلة الأدوية المسماة "بينيسيلينات" التي يمكن أن يتوقف عملها أحياناً (تصبح غير فعالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض كلافلونيك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الفصيلة العلاجية:

أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة البنيسيلينات.

حمض كلافلونيك: مثبطات الإنزيم بيتا-لاكتاماز.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت أو كان طفلك حساساً (ألرجي) لـ أموكسيسيلين، لحمض كلافلونيك، لـ بينيسيلين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصل في الفقرة 6).
- كان لديك أو لدى طفلك ذات مرة رد فعل تحسسي خطير لأي مضاد حيوي آخر. ذلك قد يشمل طفح في الجلد أو إنتفاخ الوجه أو الحنجرة.

• كانت لديك أو لدى طفلك ذات مرة مشاكل في الكبد أو يرقان (إصفرار الجلد) عند تناول مضاد حيوي.
← لا تتناول أوچمنتين أو لا تعطي لطفلك أوچمنتين إذا إنطبق عليك أو على طفلك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول/إعطاء أوچمنتين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل تناول أوچمنتين أو إعطاء أوچمنتين لطفلك، أخبر الطبيب إذا:

- وُجد لديك أو لدى طفلك مرض القيلة
 - كنت أو كان طفلك تتلقى/يتلقى علاجاً جراًء مشاكل في الكبد أو في الكلية
 - كنت لا تتبول، أو كان طفلك لا يتبول بشكل سليم.
- إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ينطبق عليك أو على طفلك واحد مما ذكر، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول/إعطاء أوچمنتين.

في حالات معينة، من الجائز أن يفحص الطبيب نوع الجرثومة المسببة للتلوث لديك. وفقاً للنتائج، من الجائز أن يعطى لك أو لطفلك أوچمنتين من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

قد يؤدي أوچمنتين إلى تفاقم حالات معينة موجودة، أو يسبب أعراضاً جانبية خطيرة. هذه تشمل ردود فعل تحسسية، إختلاجات (تشنجات) والتهاب الأمعاء الغليظة. عليك الإنتباه لأعراض معينة خلال فترة تناولك أو تناول طفلك لـ أوچمنتين، لتقليل خطورة حدوث أية مشاكل. أنظر 'حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها' في الفقرة 4.

فحوص الدم والبول

أعلم الطبيب بأنك/أن طفلك تتناول/يتناول أوچمنتين، وذلك إذا كنت أو كان طفلك تجتاز/يجتاز فحوص الدم (مثل فحوص تقييم حالة خلايا الدم الحمراء أو فحوص لوظائف الكبد) أو فحوص البول (لفحص نسب الجلوكوز). ذلك لأن أوچمنتين يمكن أن يؤثر على نتائج فحوص من هذا النوع.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول/كان طفلك يتناول أو إذا تناولت/تناول مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

- إذا كنت تتناول/كان طفلك يتناول ألوپورينول (يستعمل لعلاج النقرس) مع أوچمنتين، فهناك إحتمال أكبر بأن يحدث لديك/لدى طفلك رد فعل تحسسي جلدي.
- إذا كنت تتناول/كان طفلك يتناول پروبيبيسيد (يستعمل لعلاج النقرس)، فمن الجائز أن يقرر الطبيب ملاءمة الجرعة الدوائية من أوچمنتين.
- إذا تم تناول أدوية مثبطة لتخثر الدم (مثل وارفارين أو أسينوكومارول) مع أوچمنتين، فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.
- يمكن أن يؤثر أوچمنتين على طريقة عمل ميتوتريكسات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).
- قد يؤثر أوچمنتين على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل، الإرضاع

إذا كنت أنت/كانت طفلاتك مقبلة على تناول هذا الدواء في فترة الحمل أو الإرضاع، تعتقدن بأنه من الجائز أنك/هي حامل أو إذا كنت أنت/هي تخططين/تخطط للحمل، استشيرى الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات

يمكن أن يسبب أوچمنتين أعراضاً جانبية حيث أن هذه الأعراض قد تجعلك غير مؤهل للسياقة. لا تقم بالسياقة أو تشغيل الماكينات إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي أوچمنتين على أسپارتام، كحول بنزيلي ومالتوديكسترين.

- يحتوي هذا الدواء على 2.5 ملغ أسبارتام (E951) في كل 1 ملل. أسبارتام هو مصدر لـ فينيل ألانين. هذا الأمر قد يضر بالمتعالمين الذين يعانون من "بيلة الفينيل كيتون"، إضطراب جيني نادر حيث يتراكم فيه فينيل ألانين لأن الجسم غير قادر على طرحه كما ينبغي.
- يحتوي أوجمنتين على آثار كحول بنزيلي. قد يؤدي الكحول البنزيلي إلى حدوث ردود فعل تحسسية.
- يحتوي أوجمنتين على مالتوديكتارين (جلوكوز). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لدى طفلك/لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إتصل بالطبيب قبل إعطاء/تناول هذا الدواء.

3. كيفية استعمال الدواء؟

- يجب دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.
- الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:
الكبار والأطفال الذين يزنون 40 كغ أو أكثر
- لا يوصى عادة بهذا المعلق لكبار وأطفال يزنون 40 كغ وما فوق. توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي لتلقي إستشارة.

الأطفال الذين يزنون أقل من 40 كغ

- يتم حساب كافة الجرعات الدوائية وفقاً لوزن الجسم بالكيلوغرامات.
- سوف يوصيك طبيبكم كم من أوجمنتين عليك إعطاء رضيعك أو طفلك.
- من الجائز أن يتم تزويدك بملعقة كبيرة أو محقنة قياس بلاستيكية. بالإمكان إيجاد تعليمات استعمال محقنة القياس في نهاية هذه النشرة. عليك استعمالهما لإعطاء الجرعة الدوائية الصحيحة لرضيعك أو لطفلك.
- لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص متعالمين دون عمر شهرين.

متعالمون لديهم مشاكل في الكلى والكبد

- إذا وُجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكلى فمن الجائز أن يتم خفض الجرعة الدوائية. فمن الجائز أن يختار الطبيب عيار آخر أو دواء آخر.
- إذا وُجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكبد فمن الجائز أن يحتاج الأمر إجراء فحوص دم بتواتر أكبر وذلك لفحص وظائف الكبد.
- لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

- تعليمات الفتح: لنزع الغطاء، يجب الضغط نحو الأسفل والتدوير نحو اليسار (عكس إتجاه عقارب الساعة) في نفس الوقت.
- تعليمات الإغلاق: يجب إغلاق القنينة جيداً بواسطة الغطاء، بتدويره نحو اليمين (مع إتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق التام.

كيفية إعطاء/تناول أوجمنتين

- دائماً خض القنينة جيداً قبل كل جرعة دوائية.
- أعطي/تناول في بداية وجبة الطعام أو قبلها بقليل.
- يجب توزيع الجرعات الدوائية بشكل متساوي خلال اليوم، بفواصل زمني قدره 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول/إعطاء طفلك جرعتي دواء خلال ساعة واحدة.
- لا تعطي طفلك/لا تتناول أوجمنتين لمدة تزيد عن أسبوعين. إذا ما زال طفلك يشعر/ما زلت تشعر بسوء، فعليه/عليك معاودة مراجعة الطبيب.

إذا أعطيت/تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

- إذا أعطيت طفلك/تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أوجمنتين، فإن العلامات قد تشمل إنزعاج في البطن (غثيان، تقيؤ أو إسهال) أو إختلاجات. توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن. خذ عبوة الدواء لتريها للطبيب.
- إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت إعطاء/تناول الدواء

- إذا نسيت إعطاء طفلك جرعة دوائية أو نسيت تناول جرعة دوائية، أعطيها/تناولها لحظة تذكرك بذلك.

- لا تعطي طفلك/لا تتناول الجرعة الدوائية التالية أبكر مما ينبغي، بل إنتظر 4 ساعات تقريباً قبل إعطاء/تناول الجرعة الدوائية التالية. لا تعطي/لا تتناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت/توقف طفلك عن تناول الدواء

واصل إعطاء طفلك/تناول أوچمنتين إلى إنتهاء العلاج، حتى ولو شعر هو/ شعرت أنت بشكل أفضل. كل واحدة من الجرعات الدوائية هي مهمة من أجل طفلك/من أجلك للمساعدة على محاربة التلوث. إذا بقيت بعض الجراثيم على قيد الحياة، فبإمكانها التسبب بعودة التلوث.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أوچمنتين قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أنت/يعاني طفلك أياً منها. الأعراض الجانبية المذكورة لاحقاً من شأنها أن تحدث مع هذا الدواء.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

ردود فعل تحسسية:

- طفح جلدي
- إلتهاب الأوعية الدموية (vasculitis) الذي من شأنه أن يبدو كبقع حمراء أو بنفسجية بارزة على الجلد، لكنه يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى من الجسم
- سخونة، ألم في المفاصل، إنتفاخ غدد في الرقبة، الإبط أو في منفرج الرجلين
- إنتفاخ، أحياناً في الوجه أو الحنجرة (وذمة وعائية)، الذي يؤدي لصعوبات في التنفس
- إنهيار
- آلام في الصدر مرتبطة ببرد فعل تحسسي من شأنها أن تكون أعراضاً لإحتشاء عضلة القلب الذي يتم تنشيطه جراء الحساسية (متلازمة كونس - Kounis syndrome).
- ← توجه فوراً إلى الطبيب إذا قاسيت/قاسى طفلك من إحدى تلك الأعراض. توقف عن إعطاء/تناول أوچمنتين.

إلتهاب الأمعاء الغليظة

يؤدي إلتهاب الأمعاء الغليظة إلى إسهال مائي الذي يترافق عادة بدم ومخاط، وإلى ألم في البطن و/أو سخونة.

متلازمة الإلتهاب المعوي القولوني (إلتهاب في الأمعاء) الناجمة عن الأدوية (DIES)

بُذغ عن DIES خاصة لدى أطفال تلقوا أموكسيسيلين/حمض كلافلانينك. يعتبر ذلك نوع معين لرد فعل تحسسي والذي يترافق بعرض رئيسي من التقيؤات المتكررة (4-1 ساعات بعد إعطاء الدواء). أعراض إضافية يمكن أن تشمل ألم في البطن، إرهاق (ميل للنوم)، إسهال وإنخفاض ضغط الدم.

إلتهاب حاد في البنكرياس (acute pancreatitis)

إذا وُجدت لديك آلام شديدة ومستمرة في منطقة البطن فإن ذلك قد يكون علامة لإلتهاب حاد في البنكرياس. ← توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن لتلقي إستشارة وذلك إذا قاسيت/قاسى طفلك من تلك الأعراض.

أعراض جانبية وفق شيوعتها:

أعراض جانبية شائعة

- قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:
- فطر (المبيضات - تلوث فطري في المهبل، الفم أو ثنايا الجلد)
- غثيان، خاصة عند تناول جرعة دوائية مرتفعة
- ← إذا ظهر غثيان، تناول/أعطي أوچمنتين قبل الطعام
- تقيؤ

• إسهال (لدى الأطفال).

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- طفح في الجلد، حكة
 - طفح بارز وحاك (شرى)
 - مشاكل هضمية
 - دوام
 - صداع.
- أعراض جانبية غير شائعة التي قد تظهر في فحوص الدم:
- ارتفاع في إنزيمات الكبد.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- طفح في الجلد، الذي من شأنه أن يشمل حويصلات (التي تبدو مثل بقع داكنة في المركز محاطة بمنطقة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الأطراف - حمى متعددة الأشكال (*erythema multiforme*)
 - ← إذا لاحظت إحدى تلك الأعراض توجه إلى الطبيب عاجلاً.
- أعراض جانبية نادرة التي قد تظهر في فحوص الدم:
- عدد منخفض من الخلايا التي تشارك في تخثر الدم
 - عدد منخفض من خلايا الدم البيضاء.

أعراض جانبية شيوها غير معروف (لا يمكن معرفة الشيوها من المعطيات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية (أنظر أعلاه)
- إتهاب الأمعاء الغليظة (أنظر أعلاه)
- متلازمة الإتهاب المعوي القولوني (إتهاب في الأمعاء) الناجمة عن الأدوية (DIES) (أنظر أعلاه)
- إتهاب حاد في البنكرياس (*acute pancreatitis*) (أنظر أعلاه)
- إتهاب الغشاء المحيط بالدماغ والحبل الشوكي (إتهاب السحايا العقيم)
- **ردود فعل جلدية خطيرة:**
- طفح منتشر مع حويصلات وتقرح للجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس - جونسون)، وعرض أكثر خطورة، الذي يؤدي إلى تقشر واسع للجلد (أكثر من 30% من مساحة سطح الجسم - انحلال البشرة النخري السمي)
- طفح أحمر منتشر في الجلد يترافق بحويصلات صغيرة تحتوي على قيح (*bullous exfoliative dermatitis*)
- طفح أحمر حشفي يترافق بنتوءات تحت الجلد وحويصلات (*exanthematous pustulosis*)
- أعراض تشبه الإنفلونزا مع طفح، سخونة، إنتفاخ في الغدد ونتائج شاذة في فحوص الدم (يشمل ارتفاع في كمية خلايا الدم البيضاء [*eosinophilia*] وإنزيمات الكبد) (رد فعل للدواء الذي يشمل كثرة الحمضات وأعراض جهازية [*DRESS*])
- طفح جلدي أحمر عادة ما يظهر في كلا جانبي المؤخرة، أعلى الفخذين من الداخل، تحت الإبطين، العنق (الطفح الجلدي المتناظر المرتبط بالأدوية [*SDRIFE*]).
- ← **توجه فوراً إلى الطبيب** إذا قاسيت/قاسى طفلك من إحدى تلك الأعراض.
- إتهاب الكبد (*hepatitis*)
- يرقان، الذي ينجم عن ارتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تُنتج في الكبد) الذي قد يؤدي إلى إصفرار الجلد وإصفرار بياض عينك/عين طفلك
- إتهاب أنابيب الكلية
- إطالة زمن تخثر الدم
- فرط نشاط (*hyperactivity*)
- إختلاجات (لدى الأشخاص الذين يتناولون جرعات دوائية مرتفعة من أومنتين أو لديهم مشاكل في الكلية)
- لسان أسود يبدو مليء بالشعر
- بقع على الأسنان (لدى الأطفال)، عادة يمكن إزالتها بالتنقيش.
- طفح جلدي يتسم بحويصلات تتواجد حول قشرة جرح مندمل مركزي أو شبيهة بعقد اللؤلؤ (داء IgA الخطي).

- أعراض جانبية التي قد تظهر في فحوص الدم أو البول:
- إنخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء
- عدد منخفض من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الإنحلالي)
- بلورات في البول التي تؤدي إلى تضرر شديد في الكلى.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما يعاني طفلك/تعاني أنت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟


- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **مسحوق جاف**
- خزّن في الوعاء الأصلي للحماية من الرطوبة.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- **معلق سائل**
- خزّن في البراد (ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية). لا يجوز التجميد.
- بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.
- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:
- Silicon dioxide (anhydrous), hydroxypropylmethylcellulose dried (hypromellose), colloidal anhydrous silica, golden syrup dry flavour*, raspberry dry flavour*, orange dry flavour 1* (includes benzyl alcohol), xanthan gum, aspartame (E951), orange dry flavour 2*, succinic acid. (*also includes maltodextrin)
- أنظر أيضاً 'معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء' في الفقرة 2.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
- عبوة قنينة يصعب على الأطفال فتحها.
- أوجمنتين معلق 400 ملغ/5 ملل (بطعم الفواكه) مسحوق لتحضير معلق فموي، هو مسحوق أبيض حتى أوف- وايت متوفر ضمن قنينة زجاجية شفافة. بعد التحضير تحتوي القنينة على 35 ملل، 70 ملل، أو 140 ملل خليط سائل لونه أبيض حتى بُني فاتح يسمى معلق.
- قد لا يتمّ تسويق جميع أحجام العبوات.
- صاحب الإمتياز: جلاكسو سميثكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: جلاكسو سميثكلين تريدينج سيرفيسيس ليميتد، دبلن، إيرلندا.
- تم تحريرها في كانون الأول 2024.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 112-75-29288
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات التحضير:

إنزع غطاء القنينة. تأكد من أن ختم الورق المعدني كاملاً قبل الإستعمال. أعد غطاء القنينة.
1. خض القنينة لتحرير المسحوق.



2. إنزع غطاء القنينة.



3. قشّر ختم الورق المعدني للخلف من أجل إزالته.



4. أضف حجم ماء (كما هو مذكور أدناه). أعد غطاء القنينة، إقلب وخض جيداً.

لتحضير معلق ضمن عبوة ذات 35 ملل، يجب إضافة 31 ملل ماء.

لتحضير معلق ضمن عبوة ذات 70 ملل، يجب إضافة 62 ملل ماء.

لتحضير معلق ضمن عبوة 140 ملل، يجب إضافة 124 ملل ماء.

5. خزّن في البراد وخض جيداً قبل كل إستعمال.

بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

تعليمات إستعمال محقنة القياس

يتم التزويد بمحقنة من أجل إعطاء أوجمنتين


المحقنة مخصصة للإستعمال مع أوجمنتين فقط ولا يجوز إستعمالها من أجل إعطاء أية أدوية أخرى، لأن التدريجات خاصة بهذا المنتج. تُزود المحقنة مع منسق الذي يتيح لها الإلتصاق بالقنينة.

يشار للجرعة الدوائية على محقنة القياس الفموية بالميليلترات (ml). عليك تناول/إعطاء طفلك الجرعة الدوائية الموصى بها من قبل الطبيب.


تأكد من نظافة المحقنة والمنسق قبل الإستعمال، إغسل بواسطة مياه نظيفة إذا تطلب الأمر.

1. خض قنينة المعلق جيداً قبل كل جرعة دوائية.


2. إنزع المنسق عن المحقنة. أمسك القنينة بشدة وأدخل المنسق في عنق القنينة (من أجل إبقائه في مكانه).




3. أدخل المحقنة داخل المنسق تأكد من أنها مؤمنة.




4. إقلب القنينة بينما تمسك المحقنة في مكانها وإسحب الجرعة الدوائية المطلوبة كما حُدّد من قِبَل الطبيب.



5. ضع القنينة بشكل مستقيم وقم بإخراج المحقنة.



6. من أجل تناول/إعطاء الجرعة الدوائية، ضع طرف المحقنة بحذر داخل الفم وإدفع ببطء مكبس المحقنة نحو الأسفل (كرر المراحل 3، 4، 5 و- 6، إذا تطلب أكثر من محقنة واحدة لإعطاء الجرعة الدوائية).



7. إغسل المحقنة جيداً بماء نظيف. دع المحقنة تجف تماماً قبل الإستعمال التالي.



8. أعد غطاء القنينة.



9. خزّن في البراد وخض جيداً قبل كل إستعمال.
بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
© 2024 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.