

<div></div>	<div>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986</div>
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד	
פנידין 18 מ"ג	פנידין 27 מ"ג
טבליות בשחרור ממושך	טבליות בשחרור ממושך
חומר פעיל	חומר פעיל
כל טבלייה מכילה:	כל טבלייה מכילה:
18 מ"ג מתילפנינט הידרוכלוריד	27 מ"ג מתילפנינט הידרוכלוריד
18 mg methylphenidate hydrochloride	27 mg methylphenidate hydrochloride
פנידין 36 מ"ג	פנידין 54 מ"ג
טבליות בשחרור ממושך	טבליות בשחרור ממושך
חומר פעיל	חומר פעיל
כל טבלייה מכילה:	כל טבלייה מכילה:
36 מ"ג מתילפנינט הידרוכלוריד	54 מ"ג מתילפנינט הידרוכלוריד
36 mg methylphenidate hydrochloride	54 mg methylphenidate hydrochloride

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

אזהרה: שימוש לרעה, שימוש שלא בהתאם לעלון והתמכרות. לתכשיר פנידין יש סיכון גבוה לשימוש לרעה ושימוש שלא בהתאם לעלון, שעלול להוביל להתפתחות של שימוש לרעה בחומרים, כולל התמכרות. שימוש לרעה ושימוש שלא בהתאם לעלון, בתרופות המעוררות את מערכת העצבים המרכזית, כולל פנידין, עלולים להוביל למנת יתר ולמוות (ראה סעיף "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר"). סיכון זה עולה כשנטלים מנות גבוהות יותר או כשנטלים באופן שאינו מאושר, כגון הסנפה או הזרקה.
--

1. למה מיועדת התרופה?

פנידין מיועדת לטיפול בהפרעת קשב וריכוז עם הירפראקטיביות (ADHD) בילדים מעל גיל 6, במתבגרים ובמבוגרים עד גיל 65.

פנידין יכולה לשפר את הקשב, את הריכוז, ולהקטין אימפולסיביות והירפראקטיביות באנשים עם ADHD.

פנידין אמורה להינתן כחלק מתוכנית טיפולית ל-ADHD שיכולה לכלול ייעוץ או טיפולים אחרים.

קבוצה תרפויטית: מעורר מערכת העצבים המרכזית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם אתה או ילדך:

- רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (מתילפנינט הידרוכלוריד) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 - "מידע נוסף").
- סובל מטיקים או מתסמונת טרט (Tourette's Syndrome) או שקיימת היסטוריה משפחתית של תסמונת טרט. טיקים הם תנועות או קולות חזרתיים בלתי נשלטים.
- נוטל כעת או נטלת במהלך 14 יום לפני התחלת הטיפול בפנידין, תכשיר לטיפול בדיכאון ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידז MAOI (monoamine oxidase inhibitor).
- אין להשתמש בפנידין בילדים מתחת לגיל 6 היות שהתרופה לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני התחלת הטיפול בפנידין, ספר לרופא אם אתה או ילדך סובל או סבלת או שקיימת היסטוריה משפחתית של אחד מהמצבים הבאים:

- התמכרות/תלות או שימוש לרעה באלכוהול, תרופות מרשם או סמי רחוב.
- בעיות בלב, מחלת לב, מום בלב או לחץ דם גבוה.
- קיימת היסטוריה משפחתית של מוות פתאומי.
- בעיות נפשיות כגון פסיכוזה, מאניה, הפרעה דו-קוטבית (ביפולרית) או דיכאון, או שקיימת היסטוריה משפחתית של אובדנות, הפרעה דו-קוטבית או דיכאון.
- תנועות או קולות חזרתיים בלתי נשלטים (טיקים) או תסמונת טרט, או שיש היסטוריה משפחתית של טיקים או תסמונת טרט.
- פרוסים או תוצאות לא תקינות של סקירה מוחית (EEG).
- בעיות סירקולציה (זרמת דם) באצבעות הידיים והרגליים.
- בעיות במערכת העיכול - חסימה או היצרות במעיים.
- בעיות בעיניים, כולל עיני וגלאוקומה, או בעיות בראייה מקרוב (רוחק ראייה).

הבעיות הבאות דווחו בשימוש במתילפנינט הידרוכלוריד ותרופות מעוררות אחרות:

שימוש לרעה, שימוש מכוון שלא בהתאם לעלון והתמכרות

לתכשיר פנידין יש סיכון גבוה לשימוש לרעה שעלול להוביל לבעיות בנטילת התרופה, כולל התמכרות. שימוש לרעה בפנידין, בתרופות אחרות שמכילות מתילפנינט ובתרופות המכילות אמפטמין, עלול להוביל למנת יתר ומוות. הסיכון למנת יתר ומוות עולה כשנטלים מנות גבוהות יותר של פנידין או כשנטלים באופן שאינו מאושר, כגון הסנפה או הזרקה.

- הרופא צריך לבדוק את הסיכון עבורך ועבור ילדך לשימוש לרעה, שימוש שלא בהתאם לעלון והתמכרות לפני התחלת הטיפול בפנידין. ולנטר את הטיפול שלך או של ילדך.
- פנידין עלולה לגרום לתלות גופנית לאחר שימוש ממושך, גם אם נלקחת על פי הנחיית הרופא.
- אין לתת פנידין לאף אחד אחר. ראה פרק 1 "למה מיועדת התרופה" למידע נוסף.
- יש לשמור את התרופה במקום בטוח ולהשליך כל תרופה שנותרה. ראה פרק 5 "איך לאחסן את התרופה?".
- יש לספר לרופא אם אתה או ילדך סבלת משימוש לרעה או תלות באלכוהול, תרופות מרשם או סמי רחוב.

בעיות הקשורות ללב

- מוות פתאומי בחולים הסובלים מבעיות לב או מום בלב.
- שבץ והתקפי לב במבוגרים.
- עלייה בלחץ דם ודופק.

בדרך כלל, אין להשתמש בפנידין בילדים, במתבגרים או במבוגרים הסובלים ממום בלב

פנה מייד לרופא או אחרד מיון של בית החולים הקרוב, אם אתה או ילדך מפתחים תסמינים של בעיות לב כגון מום בחזה, קוצר נשימה או עילפון במהלך השימוש בפנידין.

עלייה בלחץ דם ודופק

תרופות מעוררות עלולות לגרום לעלייה בלחץ הדם והדופק.

הרופא יעקוב אחרי מדדי לחץ דם ודופק אם אתה נוטל תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ודופק מואץ.

בעיות נפשיות (פסיכיאטריות)

- תרופות מעוררות עלולות לגרום או להחמיר בעיות הנהגות או הפרעות חשיבה במטופלים עם בעיה נפשית קיימת.

- הופעה או החמרה של הפרעה ביפולארית (דו-קוטבית).
- תופעות פסיכטריות חדשות (כגון שמיעת קולות או ראייה של דברים שלא קיימים) או הופעה של תסמינים מאניים חדשים.
- ספר לרופא על בעיות נפשיות שאתה או ילדך סובל מהן, או היסטוריה משפחתית של התאבדות, מחלה ביפולארית או דיכאון.
- יש לפנות מייד לרופא אם אתה או ילדך חווים הופעה חדשה או החמרה של תסמינים נדבשים או בעיות במהלך השימוש בפנידין, בייחוד שמיעה של קולות וראייה של דברים לא אמיתיים, אמונה בדברים לא אמיתיים, או הופעת תסמינים חדשים של מאניה.**

ילדים ומתבגרים

אין להשתמש בפנידין בילדים מתחת לגיל 6 היות שהתרופה לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב

הרופא יבדוק אותך או את ילדך לבעיות לב לפני תחילת הטיפול בפנידין.

הרופא יבצע ניטור בדיקות דם, לחץ הדם וקצב הלב, לך או לילדך, באופן קבוע במהלך הטיפול עם פנידין.

יש לנטר לעיתים קרובות את הגובה והמשקל של ילדים הנוטלים פנידין.

ייתכן שהטיפול בפנידין יופסק אם תימצא בעיה במהלך ניטורים אלה.

אינטראקציות/הגובות בין תרופתיות

אם אתה או ילדך לוקח, או אם לקח/ת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

פנידין בשילוב עם תרופות מסוימות עלולה לגרום לתופעות לואי חמורות. לעיתים קיים צורך להתאים את המינונים של תרופות אלו בתקופת הנטיילה של פנידין. הרופא יחליט אם ניתן ליטול פנידין עם תרופות אחרות.

במיודע יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה או ילדך לוקח את אחד מהבאים:

- תרופות ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידז (MAOI). אין ליטול פנידין אם אתה או ילדך נוטל כעת או נטלת במהלך 14 יום לפני התחלת הטיפול בפנידין, תכשירים לטיפול בדיכאון ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידז (MAOI) (ראה גם פרק 2 סעיף "אין להשתמש בתרופה").
- תרופות לטיפול בלחץ דם.
- תרופות משמשיפעות על כיווץ כלי דם (כגון תרופות לטיפול בינון או אלרגיה המכילות נוגדי גודש).

- תרופות נוגדות קרישה מקבוצת הקומרינים (כגון וארפיון).
- תרופות לטיפול בפרוסים (כגון פנוברביטל, פניטואין, פרימדון).
- תרופות לטיפול בדיכאון (כגון נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי ספיגת סרוטונין).
- תרופה לטיפול במחלת נפש – ריספרידון.

יש להכיר את התרופות שאתה או ילדך נוטל. יש לשמור רשימת תרופות שלך או של ילדך כדי להציג לרופא ולרוקח כשמקבלים תרופה חדשה.

אין להתחיל בנטילת תרופות חדשות במהלך הטיפול בפנידין מבלי לשוחח קודם עם הרופא.

אם אתה עומד לעבור ניתוח

יש להודיע לרופא אם אתה עומד לעבור ניתוח. זאת משום שאסור ליטול מתילפנינט ביום הניתוח עם סוג מסוים של תרופת הרדמה. קיים סיכון לעליית לחץ דם בזמן ניתוח.

שימוש בתרופה ומזון

יש לבלוע את הטבלייה עם מים או נוזל אחר.

הטבלייה יכולה להילקח עם או ללא מזון.

הרינו והנהגה

איה את בהיריון, מניקה או מתכננת להרות, יש לדווח לרופא אשר יחליט האם את יכולה ליטול פנידין.

היריון

לא ידוע אם פנידין עלולה לפגוע בעובר.

הנהגה

לא ידוע אם פנידין עוברת לחלב אם. יש להתייעץ עם הרופא לגבי התזונה המיטבית עבור התינוק בעת הטיפול בפנידין.

נהיגה ושימוש במכוונת

חומרים ממריצים עלולים לפגום ביכולת או ביכולת ילדך להפעיל מכוונת מסוכונת או לנהוג ברכב.

יש לפעול בהרירות, ולבצע פעולות אלו רק כאשר אתה או ילדך בטוח שהתרופה אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונת מסוכונת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פנידין מכילה סוכרוז. היוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה אם אתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים.

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליומל (23 מ"ג) נתרן לטבלייה, כלומר היא למעשה נחשבת ל"נטולת נתרן".

3. כיצד שתתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

פנידין היא טבליה בשחרור ממושך. היא משחררת את התרופה לגוף לאורך היום. פנידין 18 מ"ג - יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה, אין ללעוס, אין לחצות או לכתוש את הטבליה.

פנידין 27 מ"ג, 36 מ"ג, 54 מ"ג - ניתן לחצות את הטבלייה. אין ללעוס או לכתוש את הטבליה.

יש לבלוע את הטבלייה עם מים או נוזל אחר.

הטבלייה יכולה להילקח עם או ללא מזון.

יש ליטול את הטבליה פעם ביום, בבוקר.

ייתכן שהרופא יפסיק את הטיפול בפנידין מדי פעם לזמן מה, על מנת לבדוק את תסמיני הפרעת הקשב והריכוז עם הירפאקטיביות (ADHD).

- אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עלולות להופיע תופעות לואי כתוצאה ממינון יתר: השפעות על הלב ולחץ הדם: שינויים והפרעות בקצב הלב, יתר לחץ דם או תת-לחץ דם.
- השפעות על מערכת העצבים המרכזית: אי-שקט ועלייה בתנועות בלתי נשלטות, תחושת לבולב, הזיות (ראייה, תחושה ושמיעה של דברים לא מציאותיים). תסמונת סרוטונין, פרוסיום, שבץ ותרדמת.
- חום גבוה מסכן חיים ותמש שריר (רבדומיליזיס).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, אין ליטול מנה נפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יש להתייעץ עם הרופא טרם הפסקת השימוש בתרופה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לואוי

כמו בכל תרופה, רשימת שימוש בפנידין עלול לגרום לתופעות לואוי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

התכשיר פנידין עלול לגרום לתופעות לואוי חמורות. יש לפנות מייד לרופא במקרים הבאים:

- שימוש לרעה, שימוש מכוון שלא בהתאם לעלון והתמכרות.** (ראה פרק 2 "לפני השימוש בתרופה").
- סימנים של אלרגיה** כגון פריחה, גרד או חרלת על העור, נפיחות של הפנים, השתניים, הלשון או חלקים אחרים בגוף, קוצר נשימה, צפצופים או קושי בנשימה.
- תסמינים של בעיות לב** כגון כאב בחזה, קוצר נשימה או עילפון. תופעות הלואוי הבאות דווחו בשימוש במתילפנינט או ממריצים אחרים: מוות פתאומי בחולים הסובלים מבעיות לב או מום בלב, שבץ והתקפי לב במבוגרים, עלייה בלחץ דם ודופק.
- עלייה בלחץ דם ודופק**. תרופות מעוררות עלולות לגרום לעלייה בלחץ הדם והדופק.
- הרופא יעקוב אחרי מדדי לחץ דם ודופק אם אתה נוטל תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ודופק מואץ.

- בעיות נפשיות (פסיכיאטריות)**. הופעה חדשה או החמרה של תסמינים נפשיים או בעיות נפשיות במהלך השימוש בפנידין. בייחוד ראייה ושמיעה של דברים לא אמיתיים, אמונה בדברים לא אמיתיים או חשודים. בעיות הנתנהגותיות או מחשבתיות, דיכאון, הפרעה דו-קוטבית. (ראה פרק 2 "לפני השימוש בתרופה").
- פרוסיום**. אם אתה או ילדך מפתח פרוסיום, הרופא ינחה להפסיק את הטיפול.
- זקפה נואבת ומומושכת (פריאפיזם)**. קרו מקרים של פריאפיזם שדרש ניתוח בקרב מטופלים במתילפנידאט. **אם אתה או ילדך מפתח פריאפיזם, יש לפנות מייד לעזרה רפואית.**

- בעיות ברירמת דם באצבעות הידיים והרגליים** (peripheral vasculopathy) כולל תופעת ריינו (Raynaud’s phenomenon). התסמינים עלולים לכלול:
 - חוסר תחושה, תחושת קרירות או כאב באצבעות הידיים או הרגליים.
 - שינוי בצבע עור מחיוור לכחול ולאדום באצבעות הידיים או הרגליים.
- פנה לרופא אם אתה או ילדך סובל מאובדן תחושה, כאב, שינוי בצבע עור, או רגישות למטפרטורה באצבעות הידיים או הרגליים.
- יש לפנות מייד לרופא אם לך או לילדך מתפתחים סימנים של פצעים לא מוסברים באצבעות הידיים או הרגליים בעת הטיפול בפנידין.**
- האטה בגדילה (גובה ומשקל) בילדים**. יש לבצע בדיקות תכופות של גובה ומשקל בילדים בזמן הטיפול בפנידין. ייתכן שיהיה צורך בהפסקת טיפול אם ילדך אינו גדל או עולה במשקל כצפוי.
- יתכן חסימה במעיים**. פנידין אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים עם בעיות חמורות במעיים (היצרות חמורה של מעיים).
- בעיות בעיניים (עלייה בלחץ תוך עיני וגלאוקומה)**. יש לפנות מייד לרופא, אם אתה או ילדך מפתח שינויים בראייה או כאבים, נפיחות או אודם בעיניים.
- שינויים בראייה או טשטוש ראייה**.
- הופעה או החמרה של טיקים או החמרה של תסמונת טרט**. יש להודיע מייד לרופא, אם אתה או ילדך סובל מהופעה או החמרה של טיקים או החמרה של תסמונת טרט בזמן הטיפול בפנידין.

תופעות לואוי נוספות

תופעות לואוי שכיחות מאוד:

- קרבב ילדים:**
- כאב בבטן עליונה
- קרבב מבוגרים:**
- ירידה בתיאבון
- כאב ראש
- יובש בפה
- בחילה
- נדודי שינה
- חרדה
- סחרחורת
- ירידה במשקל
- עצבנות
- הזעה מוגברת

תופעות לואוי שכיחות שנצפו במחקרים קליניים:

בילדים ובמתבגרים: כאבים בבטן העליונה, הקאה, חום, דלקת ריריות האף והלוע עם זלת מוגלתית (בזופרינגיטיס), סחרחורת, נדודי שינה, שיעול, כאב בפה ובלוע.

במבוגרים: דופק מהיר, דפיקות לב, ורטיגו (תחושת סחרור), טשטוש ראייה, יובש בפה, בחילה, קשיי עיכול, הקאה, עצירות, נרגנות, זיהום בדרכי הנשימה העליונות, ירידה במשקל, ירידה בתיאבון, אנוורקסיה (הפרעת אכילה), מתח בשרירים, כאב ראש, סחרחורת, רעד, עקצוץ (פרסתזיה), טשטוש (סדציה), כאב ראש של מתח, נדודי שינה, חרדה, נדודי שינה ראשוניים, מצב רוח דיכאוני ודיכאון, עצבנות, חוסר שקט, תוקפנות, חריקת שיניים, ירידה בחשק מיני, אי יציבות רגשית, תחושת לבולב, מתח, כאבים בפה ובלוע, הזעת יתר.

תופעות לואוי נוספות שדווחו במחקרים קליניים:

ספירת כדוריות לבנות נמוכה (לויקופניה), יובש בעיניים, ליקויי אקומוציה (מיקוד ראייה), גלי חום, אי-נוחות או כאב בבטן, שלשול, חולשה, עייפות, הרגשת מתח/עצבנות, תחושת צמא, דלקת בסינוסים, עלייה ברמת האנזים אלנין אמינוטרנספראז, עלייה בקצב לבול ובלחץ דם, רשרוש בלב, התכווצות שרירים, לאות (lethargy), שינוניות במצב פסיכי-מוטורית מוגברת, כעס, דריכות יתר, שינויים במצב הרוח, תנודות תכופות במצב הרוח, התקף פאניקה, הפרעת שינה, נטייה לבכי, טיקים, אין אונות, קוצר נשימה, פריחה בעור, פריחה מקולרית, יתר לחץ דם.

תופעות לואוי נוספות שדווחו לאחר תחילת שיווק התכשיר:

פנציטופניה (מספר נמוך מדי של כל תאי הדם - אדומים, לבנים וטסיות), ירידה בטסיות (תרומבוציטופניה), תרומבוציטופניה פרופורה (דימום המאפיין ספירת טסיות נמוכה מאוד).

תעוקת חזה, דופק איטי, הפרעות בקצב הלב.

ראייה כפולה, עלייה בלחץ תוך-עיני, אישונים מורחבים, בעיות ראייה.

כאבים בחזה, אי-נוחות בחזה, ירידה בהשפעת התרופה או בתגובה לתרופה, חום גבוה. פגיעה בתאי כבד, אי-ספיקת כבד חריפה. תגובת רגישות יתר (אלרגיה) כגון אנגיזאדמה, תגובה אנפילקטית, התנפחות של האוזן, שלפוחיות על פני העור, קילופי עור, חרלת (מחלת עור), גרד, גירוי בעור ו/או זיהום בעור, פריחה.

עלייה ברמת האנזים אלקליין פוספטאז בדם, עלייה ברמת בילירובין בדם, עלייה ברמת אנזימי הכבד בדם, ספירת כדוריות לבנות וטסיות לא תקינה.

כאבי מפרקים, כאבי שרירים, עוויתות שרירים, תמש שריר (רבדומיליזיס).

פרוס, דיסקינזיה (תנועות חוזרות בלתי רצוניות), תסמונת סרוטונין (בשילוב עם נטילת תרופות מסוימות), טיקים מוטוריים ומילוליים.

הרגשת חוסר התמצאות (דיסאוריינציה), הזיות (חזותיות או קוליות), מאניה, דיבור מופרז, שינויים בדחף המיני, זקפה מתמשכת וכואבת (פריאפיזם), נשירת שיער במקומות שונים בגוף (אלופציה), אדמומיות בעור (אריתמה), כיווץ כלי הדם בקצות אצבעות הידיים והרגליים, בדרך כלל בעקבות חשיפה לקור (תסמונת ריינו).

אם הופיעה תופעת לואוי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לואוי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לואוי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואוי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לואוי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>
ליתן גם לדווח על תופעות לואוי לדוא"ל: safety@trima.co.il.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

יש לאחסן את התרופה במקום בטוח, כגון חדר נעול.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל-25°C. יש לסגור היטב את הקבוק.

אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.