

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ויגהמוקס
טיפות עיניים, תמיסה.

הרכב: מוקסיפלוקסצין (כהידרוכלוריד) 0.5%
Moxifloxacin (as Hydrochloride) 0.5%
המרכיבים הבלתי פעילים מופיעים בסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בדלקות בלחמית העין הנגרמות על ידי חיידקים הרגישים לתרופה.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים דור רביעי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה לך רגישות למוקסיפלוקסצין (Moxifloxacin) או לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אנטיביוטיות אחרות מסוג הקווינולונים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- **אם הנך חש תגובת אלרגיה לויגהמוקס.** תגובות אלרגיה אינן נפוצות ותגובות אלרגיה חמורות הינן נדירות. אם הנך חש תגובת אלרגיה כלשהי או תופעת לוואי כלשהי, אנא ראה סעיף 4.
- **אם הנך מרכיב עדשות מגע,** הפסק את השימוש בעדשות המגע אם מופיעים סימנים או סימפטומים של זיהום בעין. הרכב משקפיים במקום. אין להרכיב את עדשות המגע לפני שסימני הזיהום חלפו ולפני שהפסקת את השימוש בויגהמוקס.
- נפוחות וקרע בגיד מופיעים באנשים שנוטלים פלואורוקווינולונים דרך הפה או על ידי הזרקה תוך ורידית, במיוחד במטופלים מבוגרים ובאלה שמטופלים במקביל בקורטיקוסטרואידים. הפסק את השימוש בויגהמוקס אם אתה מפתח כאב או נפוחות בגידים (דלקת בגיד).
- אפשר להשתמש בויגהמוקס עבור ילדים, מטופלים מבוגרים ומטופלים עם הפרעות בתפקוד הכליות או הכבד. בדומה לכל אנטיביוטיקה, שימוש ממושך בויגהמוקס עלול להוביל לזיהומים אחרים.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

אם הנך בהריון, מתכננת הריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכונית

הנך עלול לחוש שטטוש בראייה לזמן קצר אחרי השימוש בתרופה. אין לנהוג או להפעיל מכונית עד שתופעה זו חולפת.

טיפול בילדים ובתינוקות

התכשיר ויגהמוקס בטוח ויעיל לשימוש בילדים ותינוקות. אין מספיק מידע על השימוש בויגהמוקס בילודים, לכן עבורם השימוש אינו מומלץ.

3. כיצד תשתמש בתרופה?


תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא: טיפה אחת בעין המטופלת, 3 פעמים ביום למשך 4 ימים. אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

- בכדי להימנע מזיהום, אין לתת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמור על הבקבוק סגור היטב.
- יתכן ובקבוק הטיפות אינו מלא; הדבר נועד לאפשר שליטה טובה יותר על קצב הטפטוף.
- אין לסחוט את הבקבוק, לחיצה עדינה על בסיס הבקבוק מספיקה להוצאת הטיפה.
- כיצד להשתמש בטיפות: שימוש במראה יכול להקל על השימוש בתרופה. ראשית, רחץ את ידיך. הטה את הראש לאחור. בעזרת האצבע המורה, משוך כלפי מטה את העפעף התחתון, ליצירת מעין "כיס" (איור 1). יש לטפטף את התרופה אל תוך ה"כיס" שנוצר (איור 2). עצום עינייך בעדינות. אין למצמץ. השאר בעיניים עצומות למשך 1 עד 2 דקות.
- בנוסף להוראות שניתנו לעיל - מיד לאחר טפטוף הטיפה אל העין, לחץ באמצעות האצבע האמצעית על הפינה הפנימית של העין (איור 3). יש להמשיך בלחץ 1 עד 2 דקות לאחר הטפטוף אל העין. פעולה זו עוזרת להימנע מספיגת התרופה אל תוך הגוף ובכך עוזרת למנוע תופעות לוואי.
- לאחר השימוש בתרופה, שטוף היטב את ידיך בכדי לנקותן משאריות של תרופה.
- בכדי להימנע מהפצת זיהום, אין להשתמש באותו בקבוק של תרופה ליותר מאדם אחד.



- אם לא הצלחת לטפטף אל תוך העין – נסה שוב.
- אם עליך לשים טיפה בעין השנייה, יש לטטוף ידיים כדי למנוע מעבר זיהומים מעין אחת לשנייה ולאחר מכן לחזור על ההוראות לעיל גם בעין השנייה.
- סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.
- במידה ואתה משתמש ביותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יש להמתין לפחות 5-10 דקות בין נטילת ויגהמוקס וטיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות לעיניים רק לאחר סיום נטילת טיפות עיניים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, עליך לטטוף את העין במים פושרים.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. יש ליטול מנה מיד כשנזכרת. עם זאת, אם הנך קרוב לזמן נטילת המנה הבאה, יש לדלג על המנה שנשכחה ולשוב למשטר המינון התקין עם הנטילה הבאה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בויגהמוקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם הנך סובל מתגובת אלרגיה רצינית או מאחת מהתופעות הבאות:
נפיחות בידים, ברגליים, בקרסוליים, בפנים, בשפתיים, בפה או בגרון שעלולה לגרום לקושי בבליעה או בנשימה, פריחה או סרפדת (פריחת עור מעקצצת), שלפוחיות, פצעים וכיבים.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100:

תופעות בעיניים: כאב בעין, גירוי בעין.

תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000:

תופעות בעיניים: עין יבשה, עין מגרדת, אדמומיות בעין, דלקת או הצטלקות בפני שטח העין, קריעה של כלי דם בעין, תחושה לא רגילה בעין, הפרעה בעפעף, גירוד, אדמומיות או נפיחות.
תופעות כלליות: כאב ראש וטעם רע בפה.

תופעות לוואי נדירות - תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000:

תופעות בעיניים: הפרעה בקרנית, ראייה מטושטשת או ראייה פחותה, דלקת או זיהום בלחמית, התאמצות העיניים, נפיחות בעין.
תופעות כלליות: הקאות, אי נוחות באף, תחושת גוש בגרון, ירידה ברמת הברזל בדם, תוצאות בדיקות דם חריגות של אנזימי הכבד, תחושה לא רגילה בעור, כאב, גירוי בגרון.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה - תופעות ששכיחותן טרם נקבעה:

תופעות בעיניים: זיהום בעין, עכירות בפני שטח העין, נפיחות בקרנית, משקעים בפני שטח העין, עלייה בלחץ בעין, שריטה בפני שטח העין, אלרגיה בעין, הפרשות מהעין, יצור מוגבר של דמעות, רגישות לאור.
תופעות כלליות: קוצר נשימה, קצב לב לא רגיל, סחרחורת, סימפטומים מוגברים של אלרגיה, גירוד, פריחה, אדמומיות בעור, בחילות ופריחת עור מעקצצת (סרפדת).

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות. גם לפי תנאי האריזה/ האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לזרוק תרופות למערכת הביוב או לפח האשפה הביתי. יש להתייעץ עם הרוקח לגבי אופן ההיפטרות מתרופות לאחר סיום השימוש וזאת בכדי להגן על הסביבה.
- אחסן מתחת ל- 25°C. אין להשתמש בתרופה לאחר 28 יום מהפתיחה הראשונה.
- אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium Chloride, Boric Acid, Hydrochloric Acid OR Sodium Hydroxide, Purified Water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

התרופה הינה תמיסה המסופקת באריזה המכילה בקבוק פלסטיק בנפח 5 מ"ל עם מכסה בורג.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: נוברטיס ישראל בע"מ, ת"ד 7126, תל אביב.

נערך במרץ 2025.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 133 10 31054

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.