

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ايسيتو 10، ايسيتو 15، ايسيتو 20

أقرص مطلية

التكوين:

ايسيتو 10: يحتوي كل قرص مطلي على:

إسيتالوبرام (على شكل أوكسالات) 10 ملغ

ايسيتو 15: يحتوي كل قرص مطلي على:

إسيتالوبرام (على شكل أوكسالات) 15 ملغ

ايسيتو 20: يحتوي كل قرص مطلي على:

إسيتالوبرام (على شكل أوكسالات) 20 ملغ

أقرص مطلية

تحتويات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل بدء العلاج بـ ايسيتو، بلغ الطبيب إذا:

● كنت في فترة الحمل أو مرضعة (أنظري في هذه الفقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة")

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الصرع. يجب التوقف عن العلاج بـ ايسيتو إذا حصلت نوبة من الصرع للمرة الأولى أو إذا طرأت زيادة على وتيرة النوبات (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد أو الكلية. من الجائز أن يضطر الطبيب لملائمة المقدار الدوائي للدواء.

● كنت تعاني من الحساسية من السكرى. إن العلاج بـ ايسيتو قد يؤثر على توازن نسب السكر. من الجائز أن يتطلب الأمر ملاءمة المقدار الدوائي للإنسولين و/أو الأدوية الأخرى لعلاج السكرى.

● كنت تعاني من أمراض مزمنة من الدواء. إن الإفراط في تناول أدوية إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي، وُصف هذا الدواء للعلاج من أجل لا تعطيه الآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص عادة للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

● قائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء".

إفرا النشرة بتعمن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موزجة عن الدواء. إن توفر لك ديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي، وُصف هذا الدواء للعلاج من أجل لا تعطيه الآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص عادة للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

إن الأدوية المضادة للإكتئاب (Antidepressants) تزيد من خطورة حدوث تصرفات وأفكار إنتحارية لدى الأطفال، المراهقين والشبان الصغار.

مع بدء العلاج بالدواء، يتوجب على المتعالجين من كافة الأعمار وأقاربهم، مراقبة ومتابعة التغيرات السلوكية مثل: تقادم الإكتئاب، أفكار إنتحارية، عدوانية وما شابه. إذا طرأت مثل هذه التغيرات، يجب مراجعة الطبيب في الحال.

لاي غرض مخصص للأطفال؟

ايسيتو هو عبارة عن مستحضر مضاد للإكتئاب (MAOis)، اللا إنتقائية (مثل: فينيلزين، إيبرونيازيد، إيزوكاربوكسازيد، نيلاميد، ترانيسبيرومين). إذا تناولت إحدى هذه الأدوية الإنتقائية (SSRI)، إن الأدوية التي تنتمي إلى هذه الفصيلة تعمل على جهاز السيروتونين في الدماغ عن طريق رفع نسبة السيروتونين. يستعمل ايسيتو لمعالجة الحالات التالية: الإكتئاب، إضطرابات الهلع، القلق العام، القلق الإجتماعي، إضطراب الوسواس القسري.

من الجائز أن تمر عدة أسابيع إلى أن تبدأ بالشعور بشكل أفضل. يجب مواصلة تناول الدواء حتى ولو إستغرق الأمر وقتاً حتى الشعور بالتحسن.

عليك التحدث مع الطبيب إذا كنت لا تشعر بتحسن أو إذا كنت تشعر بشكل أسوأ.

قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

● أنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي تحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

● كنت تتناول أدوية أخرى من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOis)، اللا إنتقائية، غير الكعوسة، مثل: فينيلزين، إيبرونيازيد، إيزوكاربوكسازيد، نيلاميد، ترانيسبيرومين. يجب الإنتظار 14 يوماً بعد تناول هذه الأدوية قبل بدء إستعمال ايسيتو، أو الإنتظار 7 أيام بعد تناول ايسيتو قبل بدء العلاج بهذه الأدوية. كما أنه، لا يجوز تناول ايسيتو بنفس الوقت مع مثبطات مونوأمين أوكسيداز الكعوسة من نوع MAOI-A (مثل: موكلوبيميد، الكعوسة، مثل موكلوبيميد (علاج الإكتئاب).

● أو مثبط مونوأمين أوكسيداز (MAOI) الأنتقائي (علاج الإكتئاب).

● أو مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOis)، اللا إنتقائية (مثل: فينيلزين، إيبرونيازيد، إيزوكاربوكسازيد، نيلاميد، ترانيسبيرومين). إذا تناولت إحدى هذه الأدوية الإنتقائية (SSRI)، إن الأدوية التي تنتمي بأفكار غير عادية تتغير بشكل سريع، فرح مجهول السبب ونشاط بدني أكثر من المعتاد. إذا كنت تشعر بهذه الأعراض، فيجب مراجعة الطبيب.

إن الأعراض مثل قلة الراحة أو صعوبة الجلوس بهدوء أو الوقوف بهدوء قد تظهر أيضاً في الأسابيع الأولى من العلاج. في حال ظهورها يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك بشكل فوري. إن أدوية مثل ايسيتو (السماة SSRI/SNRI) قد تؤدي إلى أعراض إضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

إضطرابات الهلع

عند معالجة إضطرابات الهلع يستغرق الأمر عادة 4-2 أسابيع قبل الشعور بأي تحسن. في بداية العلاج قد يشعر بعض المتعالجين بقلق زائد، الذي يزول خلال الأسبوع الأول والثاني من العلاج. لذلك، يوصى في حالات إضطرابات الهلع بالبدء بمقدار دوائي منخفض.

من المهم جداً تنفيذ تعليمات الطبيب بحرص وعدم التوقف عن العلاج أو تغيير المقدار الدوائي بدون إستشارة الطبيب.

● الأيسبريدن (حمض أستيبيل - ساليسيليك) ومضادات التهاب اللا ستيرودية (أدوية لتسكين الآلام أو لتميع الدم، مضادات التخثر). قد تزيد من قابلية حدوث نزفة.

● وارفارين (Warfarin)، ديبيريديامول (Dipyridamole) وفينبروكومون (Phenprocoumon) (أدوية لتميع الدم، مضادات التخثر): يقوم الطبيب بفحص زمن تخثر دمك بشكل موكّد مع بدء العلاج وعند إنتهاء العلاج من ذلك في نفس الأحيان.

● إن احتمال ظهور مثل هذه الأفكار يكون أكبر إذا:

- كانت لديك في السابق أفكار إنتحارية أو أفكار عن إلحاق الضرر بالذات.

- كنت شاكياً بأفكار. قبل المعلومات من الأبحاث السريرية على وجود خطورة زائدة لحدوث تصرف إنتحاري لدى البالغين ما دون عمر 25 سنة، الذين والأدوية المضادة للإكتئاب (م فصيلة مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة

- SSRI)، بسبب الخطورة المحتملة لتخفيض عبئة حدوث إختلاجات.

إذا وُجدت لديك أفكار إنتحارية أو أفكار عن إلحاق الضرر بالذات في أي وقت كان، **عليك مراجعة طبيبك أو التوجه إلى المستشفى في الحال.**

يوصى بإبلاغ قريب عائلة أو صديق مقرب بآبك تعاني من الإكتئاب أو

من إضطراب القلق والطلب منهم قراءة هذه النشرة. بالإمكان الطلب منهم أن يبلغوك عندما يعتقدون بأنه طرأ تقادم على الإكتئاب أو إضطراب القلق لديك، أو إذا كانوا منزعجين من التغيير الذي طرأ على سلوكك.

● الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص عادة للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

● لدى متعالجين ما دون عمر 18 سنة والذين تناولوا أدوية من هذه المجموعة، هنالك خطورة زائدة لحدوث أعراض جانبية مثل محالوات إنتحارية، أفكار إنتحارية وعدوانية (بالأخص عدوانية، تصرف ترمذي وضغب). على الرغم من ذلك، يمكن لطبيبك أن يصف هذا الدواء لمتعالجين ما دون عمر 18 سنة في حال اعتقاده أن هذا الأمر لمنفعليهم.

إذا وصف الطبيب هذا الدواء لمتعالج دون عمر 18 سنة وكنت ترغب بالتحادث معه - راجع الطبيب ثانياً.

عليك إبلاغ طبيبك في حال ظهور بعض الأعراض الجانبية التي ذُكرت أو إذا تقادمت لدى متعالجين دون عمر 18 سنة، كما أنه، لم يتم بعد فحص تأثيرات ايسيتو طويلة الأمد لدى هذه الفئة من العمر من حيث النمو، البلوغ والتطور الإدراكي - السلوكي.

● التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك.

● مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOis)، اللا إنتقائية (مثل: فينيلزين، إيبرونيازيد، إيزوكاربوكسازيد، نيلاميد، ترانيسبيرومين). إذا تناولت إحدى هذه الأدوية، فيجب الإنتظار 14 يوماً قبل بدء العلاج بـ ايسيتو. بعد التوقف عن العلاج بـ ايسيتو، يجب الإنتظار 7 أيام قبل بدء العلاج بهذه الأدوية.

● ميثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOis)، اللا إنتقائية (مثل: فينيلزين، إيبرونيازيد، إيزوكاربوكسازيد، نيلاميد، ترانيسبيرومين). إذا تناولت إحدى هذه الأدوية الإنتقائية (SSRI)، إن الأدوية التي تنتمي إلى هذه الفصيلة تعمل على جهاز السيروتونين في الدماغ عن طريق رفع نسبة السيروتونين. يستعمل ايسيتو لمعالجة الحالات التالية: الإكتئاب، إضطرابات الهلع، القلق العام، القلق الإجتماعي، إضطراب الوسواس القسري.

من الجائز أن تمر عدة أسابيع إلى أن تبدأ بالشعور بشكل أفضل. يجب مواصلة تناول الدواء حتى ولو إستغرق الأمر وقتاً حتى الشعور بالتحسن.

عليك التحدث مع الطبيب إذا كنت لا تشعر بتحسن أو إذا كنت تشعر بشكل أسوأ.

التوجه في الحال إلى القابلة و/أو الطبيب.

إذا كنت تتناولين ايسيتو قريباً من نهاية الحمل فقد تكونين عرضة لخطورة زائدة لحدوث نزف مهلي شديد بعد وقت قصير من الولادة، خاصة إذا وُجدت لديك سابقة لإضطرابات نزفية. على طبيبك أو القابلة الخاصة بك أن يكونا على علم بآبك تتناولين ايسيتو لمتبكما من تقديم الإستشارة لك.

إذا إستعملت ايسيتو خلال فترة الحمل فلا يجوز التوقف عن تناول ايسيتو بشكل مفاجئ.

من شأن إسيتالوبرام أن ينتقل إلى حليب الأم ولذلك لا يوصى بالإرضاع أثناء إستعمال الدواء.

لقد أظهرت الأبحاث لدى الحيوانات بأن سيتالوبرام، دواء يشبه إسيتالوبرام، عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري. لا يجوز مضغ القرص لأن مذاقه مر! لا تتوفر معلومات بخصوص سحق القرص.

فترة العلاج:

يجب بلع الدواء مع قليل من الماء. بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري. لا يجوز مضغ القرص لأن مذاقه مر! لا تتوفر معلومات بخصوص سحق القرص.

فترة العلاج:

يجب مواصلة تناول الدواء حتى ولو إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية نادرة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):

- إنتفاخ البطن، الشفتين، اللسان، التنفس أو البلع (أعراض لرد فعل تحسسي شديد).

- سخونة عالية، صعبة أو قلة هدوء، إرتباك، رجفان، تقلص عضلي شديد، من شأنها أن تكون أعراض لحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

سبب إنخفاض ضغط الدم، أداء وظيفي شاذ للكبد (ارتفاع في نسبة إنزيمات الكبد في الدم)، إضطرابات في الحركة (حركات عضلية لا إرادية)، إنتصاب مؤلم للغضيب التناسلي، أنزفة غير اعتيادية (مثل أنزفة في الجلد والأنسجة المخاطية) ولإنخفاض نسبة الصفائح الدموية (قلة الصفائح الدموية)، إفراز شاذ للهورمون ADH الذي يؤدي إلى إحتباس الماء في الجسم وإلى تخفيف الدم وخفض كمية الصوديوم، إرتفاع نسب هورمون البيرولاكتين في الدم، إفراز حليب لدى الرجال والنساء غير المرضعات، هوس إكتئابي، لوحظت زيادة في خطورة حدوث كسور لدى المتعالجين بأدوية من هذا النوع، تغير في نظم القلب (يسمى بإطالة المقطع QT، الذي يظهر في فحص التخطيط الكهربائي للنشاط الكهربائي للقلب)، نزف مهلي شديد بعد وقت قصير من الولادة (أنظري معلومات إضافية في فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة" التي تظهر في الفقرة 2 من هذه النشرة).

بالإضافة لذلك، يُعرف عن بعض الأعراض الجانبية التي تظهر عند تناول أدوية التي تعمل بشكل مشابه لإسيتالوبرام (المادة الفعالة بـ ايسيتو)، وهي: التملل (قلة الراحة أثناء الحركة)، فقدان الشهية للطعام.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تقادمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

● بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم م.ح.ص."

5) كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسلم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي فمجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقائه تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

6) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

أعراض جانبية شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 10 متعالجين):

● إنتفاخ الأنف (التهاب الجيوب الأنفية)، تناقص أو زيادة الشهية للطعام، قلق، قلة راحة، أحلام غير عادية، صعوبة النوم، نعاس، دوام، ثآؤب، رجفان، الشعور بتمثل في الحلق، إسهال، إمساك، تقيؤ، جفاف الفم، تعرق زائد، آلام عضلية ومغصلية، إضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي (قذف متأخر للسائل المنوي، مشاكل في الإنتصاب للغضيب، إنخفاض الرغبة الجنسية، صعوبات في الحصول للنشوة لدى النساء)، إرقاق، سخونة، إرتفاع الوزن.

أعراض جانبية غير شائعة (شيوع قدره حتى متعالج واحد من بين 100 متعالج):

● طفح، حكة في الجلد، كزكرة الأسنان، إنفعال، عصبية، نوبة من الهلع، إرتباك، إضطرابات في النوم، إضطرابات في حاسة السناق، إغماء، توسع الحدقتين، إضطرابات في الرؤية، طنين في الأذنين، تساقط الشعر، نزف شديد أثناء الشعور بقلق، صاع، غثيان، تعرق (يشمل تعرق ليلي)، الشعور بقلة راحة أو عصبية، رجفان، إرتباك أو توهان في الخلاء، الشعور بانفعال أو سخط، إسهال، إضطرابات في الرؤية، ضربات قلب (مفقان).

لا يجوز تناول الأدوية في العمق! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.


● إنخفاض نسبة الصوديوم في الدم (الأعراض هي: شعور غير جيد وغثيان مع ضعف العضلات أو إرتباك)، دواء عند الإنتقال من وضعية الجلوس أو الإستلقاء

لمزيد من المعلومات حول المستحضر والنشرات المحدّثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، قوموا بمسح الكود التالي:


For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:



ايسيتو 10 Esto 10



ايسيتو 15 Esto 15



ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20




ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20




ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20




ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20



ايسيتو 20 Esto 20

ايسيتو 20 Esto 20