



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

דרונקור

טבליות מצופות

חומר פעיל

כל טבליה מצופה מכילה דרונדארון 400 מ"ג (כהידרוכלוריד)

Dronedarone 400 mg (as hydrochloride)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה ראה בסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

שמור על עלון זה, ייתכן שתצטרך לקרוא בו שוב.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. **למה מיועדת התרופה?**

התרופה משמשת לטיפול בפרפור פרוזדורים לאחר השבת מקצב לב תקין (קצב סינוס).

קבוצה תרופתית: תכשיר אנטי אריתמי לויסות קצב הלב.

2. **לפני השימוש בתרופה**

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

- הינך סובל מהפרעות בהולכה עצבית דם לשריר הלב הופך להיות נוקשה וצר (מחלת לב כלילית).

בזמן הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- פרפור הפרוזדורים שלך הפך להיות כרוני תחת טיפול בדרונקור – יש להפסיק טיפול בדרונקור.

- הינך סובל מקצב לב איטי מאוד (פחות מ-50 פעימות בדקה).

- הינך סובל מנפיחות בכפות הרגליים או ברגליים, קשיי נשימה בשכיבה או בשינה,

הא.ק.ג (ECG) מראה על בעיה בלב הנקראת "הארכת מקטע QT" (מקטע של יותר מ-500 אלפיות השנייה).

- הינך סובל מפרפור פרוזדורים כרוני (פרפור הנמשך ברצף לפחות 6 חודשים) והתקבלה החלטה לא להחזיר לקצב סינוס בהיפוך.

- הינך סובל מחוסר יציבות (ירידות) בלחץ הדם, העשוי לגרום לזרימת דם עורקית בלתי מספקת לאברי הגוף.

- הינך סובל או סובלת בעבר מאי ספיקת לב העשויה להתבטא בצקות ברגליים, קשיי נשימה בשכיבה או בשינה או בקוצר נשימה בזמן תנועה.

- נפח הדם המזרם מהלב בכל התכווצות הוא נמוך מדי (הפרעה בתפקוד חדר שמאל).

- נטלת אמידארון בעבר ופיתחת תופעות לוואי ריאתיות או כבדיות.

- הינך נוטל תרופות לטיפול בזיהומים (כולל זיהומים פטרייתיים או איידס), לאלרגיה, לבעיות בקצב לב, לדיכאון, תרופות לאחר השתלה (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

- הינך סובל מבעיות חמורות בתפקוד הכבד.

- הינך סובל מבעיות חמורות בתפקוד הכליות.

- הינך נוטל דביגטרן (למניעת היווצרות קרישי דם) (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

אם אחד ממצבים אלו רלוונטי אליך, אין להשתמש בדרונקור.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בדרונקור ספר לרופא אם:

• הינך סובל מבעיה הגורמת לרמות נמוכות של אשלגן או מגנזיום בדם. יש לטפל בבעיה זו לפני תחילת השימוש בדרונקור.

• הינך מעל גיל 75 שנים.

• הינך סובל ממצב בו כלי דם המספק דם לשריר הלב הופך להיות נוקשה וצר (מחלת לב כלילית).

בזמן הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- פרפור הפרוזדורים שלך הפך להיות כרוני תחת טיפול בדרונקור – יש להפסיק טיפול בדרונקור.

- הינך סובל מנפיחות בכפות הרגליים או ברגליים, קשיי נשימה בשכיבה או בשינה,

קוצר נשימה בזמן פעילות או מעלייה במשקל (אלו סימנים וסימפטומים של אי ספיקת לב).

- ספר לרופא מיד אם אתה מפתח אחד מהסימנים או הסימפטומים הבאים של בעיה בכבד: כאב או חוסר נוחות באזור הקיבה (בטן), אובדן תיאבון, בחילות, הקאות, הצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים (צהבת), צבע כהה מהרגיל של השתן, עייפות (במיוחד בצירוף עם סימפטומים נוספים המתוארים כאן), גרד.

- הינך סובל מקוצר נשימה או שיעול יבש. ספר לרופא כדי שהוא יבדוק את ריאותיך. אם המזכר לעיל נוגע לך (או במקרה של ספק), נא התייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת דרונקור.

תרופות ממשפחת נוגדי דיכאון טריצקליים (לטיפול בדיכאון).

תרופות ממשפחת הפנוטיאזינים (להרגעה).

מחלת לב.

טליתרומיצין, אריתרומיצין או קלריתרומיצין (אנטבייטיקות לטיפול בזיהומים).

סרפנאדין – לטיפול באלרגיה.

נפאזודון – לטיפול בדיכאון.

ציסאפריד – לטיפול בריפלוקס של אוכל וחומצה מהקיבה לפה.

ריוטנאביר – לטיפול בזיהומים במחלת האיידס.

דביגטרן – למניעת היווצרות קרישי דם.

הרופא עשוי גם לבצע בדיקות דם נוספות. תוצאה של אחת הבדיקות, לבדיקת פעילות הכליות (רמות קריאטינין בדם), ייקח את זה בחשבון בעת בדיקת תוצאות של בדיקת דם וישתמש בערך יחוס אחר עבור הערך ה"נורמלי".

הרופא עשוי לערוך לך בדיקת ריאות. במקרים מסוימים יש צורך להפסיק את הטיפול בדרונקור.

אנא הודע שהינך לוקח דרונקור למי שבדוק את תוצאות בדיקת הדם שלך.

ילדים ומתבגרים

דרונקור אינה מומלצת בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הרופא שלך עשוי להמליץ על שימוש בתרופה נגד היווצרות קרישי דם, בהתאם למצבך.

דרונקור ותרופות אחרות עלולות להשפיע אחת על השנייה ולגרום לתופעות לוואי רציניות. הרופא עשוי לשנות את המינון של התרופות האחרות שאתה לוקח.

אין לקחת את התרופות הבאות ביחד עם **דרונקור**:

תרופות אחרות המשמשות לטיפול בהפרעות קצב הלב כגון: פלקאיניד, פרופאפנון, כינידין, דיזופיראמיד, דופטיליד, סוטאלול, אמידארון.

תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים כגון: קטוקונאזול, ווריקונאזול, איטראקונאזול או פוסאקונאזול.

תרופות ממשפחת נוגדי דיכאון טריצקליים (לטיפול בדיכאון).

תרופות ממשפחת הפנוטיאזינים (להרגעה).

מחלת לב.

טליתרומיצין, אריתרומיצין או קלריתרומיצין (אנטבייטיקות לטיפול בזיהומים).

סרפנאדין – לטיפול באלרגיה.

נפאזודון – לטיפול בדיכאון.

ציסאפריד – לטיפול בריפלוקס של אוכל וחומצה מהקיבה לפה.

ריוטנאביר – לטיפול בזיהומים במחלת האיידס.

דביגטרן – למניעת היווצרות קרישי דם.

יש להודיע לרופא או לרוקח אם הינך נוטל את אחת מהתרופות הבאות:

תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה, לכאב בחזה הנגרם על ידי מחלת לב או בעיות אחרות בלב כגון ורפמיל, דילטיאזם, ניפדיפין, מטופרולול, פרופרנולול או דיגוקסין.

תרופות להורדת כולסטרול בדם, כגון: סימבסטטין, לווסטטין, אטורבסטטין או רווסבסטטין.

תרופות נוגדות קרישה כגון וארפרין, ריברוקסבאן, אדוקסבאן ואפיקסבאן.

תרופות לטיפול באפילפסיה: פנוברביטל, קרבמפיין או פניטואין.

תרופות למניעת דחייט שתל: סירולימוס, טקרולימוס, אברולימוס, ציקלוספורין.

תכשיר צמחי למניעת דיכאון – סנט ג'ון וורט (St. John's Wort) (היפיריקום).

ריפאמפיצין – לשחפת.

שימוש בתרופה ומזון

יש לקחת טבליה אחת בבוקר עם האוכל וטבליה אחת בערב עם האוכל.

אין לשתות מיץ אשכוליות בזמן נטילת **דרונקור**, כיוון שיכול להעלות את רמת החומר הפעיל, דרונדארון, בדם ובכך להגדיל את הסיכוי לתופעות לוואי.

הריון, הנקה ופוריות

אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שיתכן שהינך בהריון או מתכננת להרות היועצי ברופא שלך.

אם את אישה בגיל הפוריות, הרופא יבצע בדיקת הריון לפני שתחילי את הטיפול עם **דרונקור**.

השימוש בדרונקור אינו מומלץ אם הינך בהריון או אם את חושבת שאת עשויה להיות בהריון.

אין לקחת **דרונקור** או אם את חושבת שאת עשויה להיטול לטיפול בדיכאון, או פוסאקונאזול.

אם נכנסת להריון בזמן השימוש בדרונקור, הפסיקי לקחת את הטבליות לפני לרופא מיד!

לא ידוע האם **דרונקור** עוברת לחלב האם. עליך להתייעץ עם הרופא כדי להחליט האם להשתמש בדרונקור או להניק. אין להניק במהלך הטיפול עם **דרונקור** ולמשך 7 ימים לאחר המנה האחרונה של **דרונקור**.

אם נכנסת להריון בזמן השימוש בדרונקור, הפסיקי לקחת את הטבליות לפני לרופא מיד!

נפאזודון – לטיפול בדיכאון.

ציסאפריד – לטיפול בריפלוקס של אוכל וחומצה מהקיבה לפה.

ריוטנאביר – לטיפול בזיהומים במחלת האיידס.

דביגטרן – למניעת היווצרות קרישי דם.

יש להודיע לרופא או לרוקח אם הינך נוטל את אחת מהתרופות הבאות:

תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה, לכאב בחזה הנגרם על ידי מחלת לב או בעיות אחרות בלב כגון ורפמיל, דילטיאזם, ניפדיפין, מטופרולול, פרופרנולול או דיגוקסין.

תרופות להורדת כולסטרול בדם, כגון: סימבסטטין, לווסטטין, אטורבסטטין או רווסבסטטין.

תרופות נוגדות קרישה כגון וארפרין, ריברוקסבאן, אדוקסבאן ואפיקסבאן.

תרופות לטיפול באפילפסיה: פנוברביטל, קרבמפיין או פניטואין.

תרופות למניעת דחייט שתל: סירולימוס, טקרולימוס, אברולימוס, ציקלוספורין.

תכשיר צמחי למניעת דיכאון – סנט ג'ון וורט (St. John's Wort) (היפיריקום).

ריפאמפיצין – לשחפת.

המינון המקובל בדרך כלל הוא טבליה אחת של **דרונקור** 400 מ"ג פעמיים ביום: טבליה אחת בבוקר עם ארוחת בוקר.

טבליה אחת בערב עם ארוחת ערב. אם הינך חושב שהתרופה חזקה מדי או חלשה מדי, ספר על כך לרופא או לרוקח.

צורת הנטילה

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים בזמן הארוחה.

אין לחצות את הטבליה. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

פנה מיד לרופא שלך או לחדר המיון הקרוב. הבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקבוע, יש ליטול מנה בזמן הנטילה הקבוע הבא. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד כפיצוי על המנה שנשכחה!

אם נכנסת להריון בזמן השימוש בדרונקור, הפסיקי לקחת את הטבליות לפני לרופא מיד!

נפאזודון – לטיפול בדיכאון.

ציסאפריד – לטיפול בריפלוקס של אוכל וחומצה מהקיבה לפה.

ריוטנאביר – לטיפול בזיהומים במחלת האיידס.

דביגטרן – למניעת היווצרות קרישי דם.

יש להודיע לרופא או לרוקח אם הינך נוטל את אחת מהתרופות הבאות:

תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה, לכאב בחזה הנגרם על ידי מחלת לב או בעיות אחרות בלב כגון ורפמיל, דילטיאזם, ניפדיפין, מטופרולול, פרופרנולול או דיגוקסין.

תרופות להורדת כולסטרול בדם, כגון: סימבסטטין, לווסטטין, אטורבסטטין או רווסבסטטין.

תרופות נוגדות קרישה כגון וארפרין, ריברוקסבאן, אדוקסבאן ואפיקסבאן.

תרופות לטיפול באפילפסיה: פנוברביטל, קרבמפיין או פניטואין.

תרופות למניעת דחייט שתל: סירולימוס, טקרולימוס, אברולימוס, ציקלוספורין.

תכשיר צמחי למניעת דיכאון – סנט ג'ון וורט (St. John's Wort) (היפיריקום).

ריפאמפיצין – לשחפת.

בכפות הרגליים או ברגליים, קשיי נשימה בשכיבה או בשינה, קוצר נשימה בזמן פעילות, עלייה במשקל.

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- שלשולים ועיזות הקאות מרובים העלולים להוביל לבעיות בכליות.

- קצב לב איטי.

תופעות לוואי לא שכיחות (עלולות להופיע ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- מחלת ריאות דלקתית (כולל הצטלקות ועיבוו הריאה). סימנים לכך כוללים קוצר נשימה או שיעול לא פרודוקטיבי.

תופעות לוואי נדירות (עלולות להופיע ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- בעיות בכבד כולל פגיעה כבדית מסכנת חיים. הסימנים כוללים: כאב או חוסר נוחות באזור הקיבה (בטן), אובדן תיאבון, בחילות, הקאות, הצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים (צהבת), צבע כהה מהרגיל של השתן, עייפות (במיוחד בצירוף עם סימפטומים נוספים המתוארים כאן), גרד.

- תגובות אלרגיות הכוללות נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון ובגרון.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד:

- שינוי בתוצאה אחת בבדיקת הדם: רמת הקריאטינין בדם.

- שינוי בתוצאת בדיקת הא.ק.ג (ECG) (QTc Bazett prolonged).

תופעות לוואי שכיחות:

- בעיות במערכת העיכול כגון: שלשול, בחילה, הקאה וכאב בטן.

- הרגשת עייפות.

- בעיות בעור כגון פריחה או גירוד.

- שינוי בתוצאות בדיקת תפקודי כבד בדם.

תופעות לוואי לא שכיחות:

- בעיות עור אחרות כגון אדמומיות העור או אקזמה (אדמומיות, גירוד, הרגשת צריבה או שלפוחיות).

- התגברות רגישות העור לחשיפה לשמש. שינוי בחוש הטעם.

תופעות לוואי נדירות:

- איבוד חוש הטעם.

- דלקת בדופן כלי הדם (כולל ואסקוליטיס לויקוציטוקלסטית).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

5. **איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי התאריך תפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/המגשית (בליסטר). תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: Crospovidone, Maize starch, Mannitol, Poloxamer 407, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose, Colloidal silicon dioxide, Opadry Y-1-700 (White).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

דרונקור ארוז בתוך מגשיות (בליסטרים) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון.

דרונקור הינן טבליות מצופות, מוארכות, קמורות משני צידיהן, בצבע לבן.

עבור **דרונקור** קיימים גודלי אריזה של 4, 7, 14, 15, 20, 28, 30, 30 טבליות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזה משווקים.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 16545, ת"א, 6116401.

שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

נוער בנובמבר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: