

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סרוקואל אקס.אר 150 מ"ג  
טבליות בשחרור ממושך

סרוקואל אקס.אר 50 מ"ג  
טבליות בשחרור ממושך

סרוקואל אקס.אר 300 מ"ג  
טבליות בשחרור ממושך

סרוקואל אקס.אר 200 מ"ג  
טבליות בשחרור ממושך

סרוקואל אקס.אר 400 מ"ג  
טבליות בשחרור ממושך

### החומר הפעיל וכמותו:

כל טבלייה של סרוקואל אקס.אר 50 מ"ג מכילה:  
קוויטיאפין (כפומראט) 50 מ"ג quetiapine (as fumarate) 50 mg

כל טבלייה של סרוקואל אקס.אר 150 מ"ג מכילה:  
קוויטיאפין (כפומראט) 150 מ"ג quetiapine (as fumarate) 150 mg

כל טבלייה של סרוקואל אקס.אר 200 מ"ג מכילה:  
קוויטיאפין (כפומראט) 200 מ"ג quetiapine (as fumarate) 200 mg

כל טבלייה של סרוקואל אקס.אר 300 מ"ג מכילה:  
קוויטיאפין (כפומראט) 300 מ"ג quetiapine (as fumarate) 300 mg

כל טבלייה של סרוקואל אקס.אר 400 מ"ג מכילה:  
קוויטיאפין (כפומראט) 400 מ"ג quetiapine (as fumarate) 400 mg

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, אנא ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

### קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.  
התרופה אינה מיועדת לקשישים הסובלים מדמנציה.

- תרופות נוגדות דיכאון וחרדה מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים עד גיל 25. עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה. אם חלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מייד לרופא.
- מטופלים קשישים הסובלים מפסיכזזה הקשורה בדמנציה והמטופלים בתרופות אנטי-פסיכוטיות נמצאים בסיכון מוגבר למוות.

### 1. למה מיועדת התרופה?

- לטיפול בסכיזופרניה.
- לטיפול במצב מאניה הקשור להפרעות ביפולריות.
- לטיפול בדיכאון הקשור להפרעות ביפולריות.

- לטיפול בדיכאון ביחד עם תרופה נוספת לטיפול בדיכאון.

**קבוצה תרפויטית:**  
תרופות אנטי פסיכוטיות.

## 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בסרוקואל אקס.אר אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
- אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:
  - תרופות לטיפול בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש (HIV).
  - תרופות ממשפחת האזולים (לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
  - אריתרומיצין או קלריתרומיצין (לטיפול בזיהומים).
  - נפאזודון (לטיפול בדיכאון).
- אם אינך בטוח, פנה לרופא או לרוקח לפני נטילת סרוקואל אקס.אר.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסרוקואל אקס.אר**

**לפני הטיפול בסרוקואל אקס.אר ספר לרופא אם:**

- אתה או מישהו מבני משפחתך סובל או סבל בעבר מבעיות בלב, כגון הפרעות בקצב לב, היחלשות או דלקת של שריר הלב או אם אתה נוטל תרופות המשפיעות על קצב הלב.
- יש לך לחץ דם נמוך.
- היה לך שבץ, בעיקר אם אתה קשיש.
- אתה סובל מבעיות בכבד.
- היו לך אי פעם פרכוסים (כפיון).
- אתה סובל מסוכרת או אם אתה בקבוצת סיכון לחלות בסוכרת. במקרה כזה, ייתכן שהרופא יבדוק את רמות הסוכר בדמך בזמן שאתה מטופל בסרוקואל אקס.אר.
- הייתה לך בעבר ספירת תאי דם לבנים נמוכה (ייתכן כתוצאה מתרופות אחרות).
- אין ליטול סרוקואל אקס.אר אם אתה קשיש עם שיטיון (דמנציה), כיוון שסרוקואל אקס.אר עלולה להגביר את הסיכון לשבץ, או במקרים מסוימים עלולה להגביר את הסיכון למוות אצל קשישים עם דמנציה.
- אתה קשיש הסובל ממחלת פרקינסון/פרקינסוניזם.
- יש לך או לבן משפחתך היסטוריה רפואית של קרישי דם, כיון שתרופות מסוג זה מעורבות ביצירת קרישי דם.
- יש לך או היה לך: מצב של הפסקות נשימה קצרות בעת שינת הלילה (נקרא דום נשימה - אפניאה) ואתה נוטל תרופות אשר מאטות את הפעילות הרגילה של המוח.
- יש לך או היה לך: מצב של חוסר יכולת לרוקן לגמרי את שלפוחית השתן (אצירת שתן), פרוסטטה מוגדלת, חסימת מעי או עלייה בלחץ התוך עיני. אלו מצבים הנגרמים לעיתים על-ידי תרופות (הנקראות אנטיכולינרגיות) המשפיעות על האופן בו תאי עצב מתפקדים במטרה לטפל במצב רפואי כלשהו.
- יש לך היסטוריה של התמכרות לאלכוהול או לתרופות.
- אתה סובל מדיכאון או מהפרעות אחרות המטופלות בנוגדי דיכאון. השימוש בתרופות אלו יחד עם סרוקואל אקס.אר יכול להוביל לתסמונת סרוטונין, הפרעה העלולה להיות מסכנת חיים (ראה פרק 2 סעיף "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות").

**ידע את הרופא באופן מיידי אם אתה חש באחד מהתסמינים הבאים לאחר נטילת סרוקואל אקס.אר:**

- שילוב של חום, קישיון שרירים חריף, הזעה או ירידה בהכרה (זו תופעה הנקראת "neuroleptic malignant syndrome"). ייתכן שתידרש לטיפול רפואי דחוף.
- תנועות בלתי רצוניות, בעיקר בפנים ובלשון.
- סחרחורת, תחושה חמורה של ישנוניות, דבר שיכול להעלות את הסיכון לנפילה מקרית אצל אנשים קשישים.
- התקף כפיון (פרכוסים).
- זקפה מתמשכת וכואבת.

- יש לך קצב לב מהיר ולא סדיר גם כאשר אתה במנוחה, דפיקות לב, בעיות נשימה, כאבים בחזה או עייפות בלתי מוסברת. הרופא יצטרך לבדוק את הלב ובמידת הצורך יפנה אותך מייד לקרדיולוג.

ידע את הרופא בהקדם האפשרי אם אתה חש באחד מהתסמינים הבאים לאחר נטילת סרוקואל אקס.אר:

- חום, סימנים של שפעת, כאב גרון או כל דלקת אחרת, כיוון שהדבר יכול להיות תוצאה של רמה נמוכה מאוד בספירת כדוריות דם לבנות, דבר שייטכן וידרוש הפסקת טיפול בסרוקואל אקס.אר ו/או מתן טיפול.
- עצירות עם כאב בטן מתמשך, או עצירות שלא הגיבה לטיפול תרופתי, הדבר יכול להוביל למצב חמור יותר של חסימת המעי.

### מחשבות אובדניות והחמרה של דיכאון

- אם אתה מדוכא, יכול להיות שיהיו לך לפעמים מחשבות אובדניות. עלייה במחשבות אובדניות יכולה להתרחש בתחילת הטיפול עם סרוקואל אקס.אר, כיוון שלוקח זמן עד שהתרופה מתחילה לפעול, כשבועיים ולעיתים יותר מכך. תיתכן עלייה במחשבות אלו גם אם תפסיק את הטיפול באופן פתאומי.
- מחשבות אלה יותר נפוצות בקרב מבוגרים צעירים. מידע ממחקרים קליניים מראה על עלייה בסיכון למחשבות אובדניות ו/או התנהגות אובדנית בקרב מבוגרים צעירים מתחת לגיל 25 הסובלים מדיכאון.
- אם יש לך מחשבות אובדניות, יש לפנות מייד לרופא או לבית חולים. שיתוף תחושת הדיכאון עם קרוב משפחה או חבר קרוב יכול לסייע, ויש להפנותם לקרוא עלון זה. תוכל לבקש מהם לומר לך אם הם חשים כי הדיכאון שלך מחמיר או שהם מודאגים משינויים בהתנהגות שלך.

### תופעות לוואי עוריות חמורות (SCARs)

- תופעות לוואי עוריות חמורות (SCARs), יכולות להיות מסכנות חיים או לגרום למוות, הן נדירות מאוד ודווחו אצל מטופלים בתרופה זו. אלו בדרך כלל באות לידי ביטוי:
- תסמונת סטיבנס-ג'ונסון (SJS - Stevens-Johnson syndrome) – פריחה נרחבת עם שלפוחיות ועור מתקלף. במיוחד מסביב לפה, אף, עיניים ואיברי המין.
- טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס (TEN - Toxic Epidermal Necrolysis), מחלת לייל, תסמונת חמורה יותר הגורמת להתקלפות נרחבת של העור.
- תסמונת DRESS - תסמונת התגובה התרופתית עם אוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים (מערכתיים) הכוללת תסמינים דמויי שפעת הכוללים גם פריחה, חום, בלוטות נפוחות ותוצאות חריגות בבדיקות הדם (כולל עלייה ברמת תאי הדם הלבנים (אוזינופיליה), ועלייה ברמת אנזימי כבד).
- AGEP (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) – שלפוחיות קטנות מלאות במוגלה.
- אדמנת רב צורתית (Erythema Multiforme) – פריחה בעור עם נקודות לא רגילות, אדומות ומגרות.

אם אתה סובל מתסמינים אלה יש להפסיק ליטול סרוקואל אקס.אר ולדווח לרופא או לפנות לטיפול רפואי מייד.

### עלייה במשקל

עלייה במשקל נצפתה בחולים הנוטלים סרוקואל אקס.אר, עליך לעקוב יחד עם הרופא אחר משקלך באופן שוטף.

### ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18!

### אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

אין ליטול סרוקואל אקס.אר אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- תרופות לטיפול בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס).
- תרופות ממשפחת האזולים (לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
- אריתרומיצין או קלריתרומיצין (לטיפול בזיהומים).
- נפאזודון (לטיפול בדיכאון).

יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות לאפילפסיה (כגון פניטואין או קארבאמאזפין).
  - תרופות להורדת לחץ דם.
  - ברביטורטים (לנדודי שינה).
  - תיורידזין או ליתיום (תרופות אנטי-פסיכיות).
  - תרופות המשפיעות על קצב הלב, למשל, תרופות שיכולות להשפיע על חוסר איזון באלקטרוליטים (רמות נמוכות של אשלגן ומגנזיום), כגון תרופות משתנות או אנטיביוטיקות מסוימות (תרופות לטיפול בזיהומים).
  - תרופות שעלולות לגרום לעצירות.
  - תרופות (נקראות אנטיכולינרגיות) המשפיעות על הדרך בה עובדת מערכת העצבים, בכדי לטפל במצבים רפואיים מסוימים.
  - נוגדי דיכאון. לתרופות אלו אינטראקציה עם סרוקואל אקס.אר, ואתה עלול לחוות תסמינים כגון התכווצויות שרירים קצביות בלתי רצונית, לרבות שרירים השולטים בתנועת העיניים, אי שקט, הזיות, תרדמת, הזעה מופרזת, רעד, החזרים (רפלקסים) מוגברים, מתח שרירים מוגבר, חום גוף מעל  $38^{\circ}\text{C}$  (תסמונת סרוטונין). פנה לרופא אם אתה חווה תסמינים אלה.
- לפני הפסקת נטילה של אחת מהתרופות שאתה נוטל, יש לפנות לרופא.

### שימוש בתרופה ומזון

- אין לשתות מיץ אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה זו. מיץ אשכוליות יכול להשפיע על האופן בו התרופה משפיעה.
- סרוקואל אקס.אר עשויה להיות מושפעת ממזון. משום כך, יש ליטול את התרופה לפחות שעה לפני האוכל או לפני השינה.

### שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להיזהר בכמות האלכוהול שאתה צורך. שילוב של סרוקואל אקס.אר ואלכוהול יכול לגרום לישנוניות.

### היריון והנקה

אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון, מתכננת היריון או מיניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. אין ליטול סרוקואל אקס.אר במהלך היריון, אלא אם דיברת על כך עם הרופא. אין ליטול סרוקואל אקס.אר בזמן הנקה.

תסמיני הגמילה הבאים יכולים להתרחש אצל ילודים שאימותיהם נטלו סרוקואל אקס.אר בשלושת החודשים האחרונים של ההיריון: רעד, קשיון שרירים ו/או חולשת שרירים, ישנוניות, אי שקט (אגיטציה), בעיות נשימה וקשיי אכילה. אם תינוקך מפתח אחד מסמינים אלו עלייך לפנות לרופא המטפל.

### נהיגה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לישנוניות. אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות לפני שאתה יודע כיצד התרופה משפיעה עליך.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

#### סרוקואל אקס.אר מכיל לקטוז

הטבליות מכילות לקטוז אשר הוא סוג של סוכר. אם נאמר לך על-ידי הרופא שאינך יכול לעכל סוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

סרוקואל אקס.אר 50 מ"ג – כל טבלייה מכילה 125.72 מ"ג לקטוז מונוהידראט.  
סרוקואל אקס.אר 150 מ"ג – כל טבלייה מכילה 74.65 מ"ג לקטוז מונוהידראט.  
סרוקואל אקס.אר 200 מ"ג – כל טבלייה מכילה 52.87 מ"ג לקטוז מונוהידראט.  
סרוקואל אקס.אר 300 מ"ג – כל טבלייה מכילה 49.31 מ"ג לקטוז מונוהידראט.  
סרוקואל אקס.אר 400 מ"ג – כל טבלייה מכילה 15.50 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

#### סרוקואל אקס.אר מכיל נתרן

סרוקואל אקס.אר 50 מ"ג, סרוקואל אקס.אר 150 מ"ג, סרוקואל אקס.אר 200 מ"ג מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן לטבלייה ועל כן נחשבת למעשה נטולת נתרן.

סרוקואל אקס.אר 300 מ"ג וסרוקואל אקס.אר 400 מ"ג מכילה 27 מ"ג נתרן (המרכיב העיקרי במלח שולחן) בכל טבלייה. כמות זו שוות ערך ל-1.35% מהצריכה היומית המקסימלית המומלצת לאדם בוגר.

### השפעה על תוצאות בדיקות שתן

- סרוקואל אקס.אר יכולה לגרום לתוצאה חיובית בבדיקת שתן לתרופות שאינך נוטל כגון מתדון או תכשירים לטיפול בדיכאון מסוג טריציקליים (TCAs). יש לוודא תקינות תוצאות אלו באמצעות בדיקות נוספות.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא בלבד. הרופא יתאים את המנה היומית של התרופה במינונים בטווח בין 50 מ"ג ל-800 מ"ג בהתאם למחלה, לצרכים האישיים.

- **אין לעבור על המנה המומלצת.**
- יש ליטול את הטבליה פעם ביום.
- הורדת המינון תבוצע באופן הדרגתי לפני הפסקת הטיפול.
- אין להפסיק את הטיפול בתרופה אף אם אתה חש הטבה במצבך אלא בהוראת הרופא בלבד.
- יש ליטול את התרופה לפחות שעה לפני האוכל או לפני השינה.

### **צורת הנטילה:**

- **אין ללעוס, אין לכתוש ואין לחצות את הטבליה!** כיוון שהטבליה בשחרור ממושך.
- יש לבלוע את הטבליה בשלמותן עם מים.
- אין לשתות מיץ אשכוליות בזמן הטיפול עם סרוקואל אקס.אר. זה עלול להשפיע על דרך הפעולה של התרופה.

### **בעיות כבד**

אם אתה סובל מבעיות כבד ייתכן שהרופא ישנה את המינון.

### **קשישים**

ייתכן שהרופא ישנה את המינון שלך אם אתה קשיש.

### **שימוש בילדים ומתבגרים**

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. ייתכן שתרגיש ישנוניות, סחרחורת, ודפיקות לב חריגות.

### **אם שכחת לקחת את התרופה**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

### **אם אתה מפסיק לקחת את התרופה**

הפסקת התרופה בצורה פתאומית, יכולה לגרום לתסמינים הבאים: חוסר יכולת לישון, בחילה, כאבי ראש, שלשול, הקאות, סחרחורת ועצבנות. הרופא יכול להמליץ לך על הורדה הדרגתית של המינון לפני הפסקת הטיפול.

**אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסרוקואל אקס.אר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**תופעות לוואי שכיחות מאוד** (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש 1 מתוך 10):

- סחרחורת (עלול לגרום לנפילות), כאב ראש, יובש בפה.
- ישנוניות (יכול להעלים עם המשך השימוש בתרופה, עלול לגרום לנפילות).
- עלייה במשקל.
- סימני הפסקת טיפול (תסמינים העלולים להתרחש כאשר אתה מפסיק לקחת סרוקואל אקס.אר) כוללים: הקאות, סחרחורת, בחילה, כאבי ראש, שלשולים, נדודי שינה ואי שקט. הפסקה הדרגתית במשך 1-2 שבועות מומלצת.
- תנועות שרירים לא רגילות. כולל קושי בהתחלת תנועת השרירים, רעידות, תחושת חוסר מנוחה, או קישיון שרירים ללא כאב.
- שינויים ברמות של שומנים מסוימים בדם (טריגליצרידים וכולסטרול).

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- קצב לב מהיר.
- הרגשה של דפיקות לב חזקות, מהירות או דילוג על פעימות.
- עצירות, קשיי עיכול.
- חולשה.
- נפיחות בזרועות או ברגליים.
- לחץ דם נמוך בעמידה שתוצאתו עלולה להיות סחרחורת או תחושת עילפון (עלול לגרום לנפילות).
- עלייה ברמות הסוכר בדם.
- טשטוש ראייה.
- חלומות לא רגילים, סיוטים.
- תחושת רעב מוגבר.
- עצבנות.
- הפרעות בדיבור ובשפה.
- מחשבות אובדניות והחמרת הדיכאון.
- קוצר נשימה.
- הקאה (בעיקר בקשישים).
- חום.
- שינויים ברמות הורמון בלוטת התריס בדם.
- ירידה ברמות של סוגים מסוימים של תאי דם.
- עלייה ברמת אנזימי הכבד הנמדדים בדם.
- עלייה ברמת ההורמון פרולקטין בדם. עלייה בהורמון פרולקטין במקרים נדירים עלולה להוביל ל:
  - חזה נפוח בגברים ובנשים ומתן חלב באופן בלתי צפוי.
  - הפסקת מחזור חודשי אצל נשים, או מחזור חודשי לא סדיר.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- פרכוסים או עוויתות.
- תגובות אלרגיות שיכולות לכלול גושים מורמים על העור, נפיחות בעור ונפיחות מסביב לפה.
- תסמונת הרגליים העצבניות (תחושה לא נעימה ברגליים).
- קשיים בבליעה.
- תנועות לא נשלטות, בעיקר של הפנים והלשון.
- קשיים בתפקוד מיני.
- סוכרת.
- שינוי הפעילות החשמלית של הלב שנראית בבדיקת ECG (הארכת מקטע QT).
- קצב לב איטי מהרגיל, דבר שיכול לקרות בתחילת הטיפול, ויכול להיות קשור ללחץ דם נמוך ולהתעלפויות.
- החמרה בסוכרת קיימת.
- קשיים במתן שתן.
- גודש באף.
- התעלפות (עלול לגרום לנפילות).

- ירידה בכמות של תאי דם אדומים.
- ירידה בכמות של נתרן בדם.
- בלבול.

#### תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- שילוב של חום, הזעה, נוקשות שרירים, עייפות חריפה או עילפון (neuroleptic malignant syndrome).
- הצהבה של העור והעיניים (צהבת).
- דלקת בכבד (הפטיטיס).
- זקפה ארוכה וכואבת.
- נפיחות בשד ויצור חלב בלתי צפוי.
- קרישי דם בוורידים, במיוחד ברגליים (מתבטא בנפיחות, כאב ואדמומיות של הרגל), העלולים להגיע עם זרם הדם לריאות ולגרום כאבי חזה וקשיי נשימה. אם אתה מבחין באחד מהתסמינים האלה יש לפנות מייד לקבלת סיוע רפואי.
- שיבוש בהופעת המחזור החודשי בנשים.
- הליכה, דיבור, אכילה ופעילויות אחרות בעת שינה.
- ירידה בטמפרטורת הגוף (היפותרמיה).
- דלקת הלב.
- תסמונת מטבולית - מצב בו יש שילוב של שלושה או יותר מהתסמינים הבאים: עלייה בשומן הבטני, ירידה ברמת "הכולסטרול הטוב" (HDL-C), עלייה ברמות טריגליצרידים בדם, לחץ דם גבוה ועלייה בסוכר בדם.
- שילוב של חום, תסמינים דמויי שפעת, כאב גרון, או כל זיהום אחר יחד עם ספירה מאוד נמוכה של תאי דם לבנים, מצב הנקרא אגרנולוציטוזיס.
- חסימת מעי.
- עלייה ברמות קראטינין פוספוקינאז בדם (מגיע מן השרירים).

#### תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש 1 מתוך 10,000):

- תגובה אלרגית חמורה (נקראת שוק אנפילקטי) יכולה לכלול קשיי נשימה, והלם.
- התנפחות מהירה של העור, לרוב סביב העיניים, השפתיים והגרון (אנגיואדמה).
- מצב חמור של שלפוחיות בעור, בפה, בעיניים ובאיברי המין (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון).
- פריחה חריפה, שלפוחיות, או אזורים אדומים בעור.
- הפרשה לא תקינה של ההורמון ששולט בנפח השתן.
- הרס של סיבי שריר וכאבי שרירים (רבדומיוליזיס).

#### תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:

- פריחה בעור עם נקודות אדומות לא רגילות (erythema multiforme). ראה סעיף 2.
- הופעה מהירה של אזורים עם עור אדום המשובץ בפוסטולות קטנות (שלפוחיות קטנות המלאות בנוזל צהוב/לבן הנקראת Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP)). ראה סעיף 2.
- תגובה אלרגית חריפה פתאומית עם תסמינים כגון חום ושלפוחיות על העור וקילוף העור (toxic TEN epidermal necrolysis). ראה סעיף 2.
- תסמונת DRESS - תסמונת התגובה התרופתית עם אאוזינופליה ותסמינים סיסטמיים (מערכתיים) הכוללת תסמינים דמויי שפעת הכוללים גם פריחה, חום, בלוטות נפוחות וחריגה בתוצאות בדיקות דם (כולל עלייה ברמת תאי הדם הלבנים, (אאוזינופיליה), ועלייה ברמת אנזימי כבד). ראה סעיף 2.
- תסמיני גמילה עלולים להתרחש בילודים של אמהות שנטלו סרוקואל אקס.אר בהיריון.
- שבץ.
- הפרעה בשריר הלב (קרדיומיופתיה).
- דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס).
- דלקת של כלי הדם (וסקוליטיס), לעיתים קרובות מלווה בפריחה עורית עם בליטות קטנות אדומות או סגולות.

קבוצת התרופות אליהן משתייכת סרוקואל אקס.אר עלולה לגרום להפרעות בקצב הלב, שעלולות להיות חמורות ובמקרים חמורים לגרום למוות.

### תופעות הלוואי הבאות נראו בבדיקות דם:

- שינוי ברמת השומנים בדם (טריגליצרידים וכולסטרול).
  - שינוי ברמת הסוכר בדם.
  - שינויים ברמות הורמני בלוטת התריס.
  - עלייה בכמות אנזימי הכבד.
  - ירידה בכמות תאי דם מסוגים מסוימים.
  - ירידה בכמות תאי הדם האדומים.
  - עלייה ברמות האנזים קריאטיין פוספוקינאז, מגיע מן השריר.
  - ירידה ברמות הנתרן בדם.
  - עלייה ברמות הורמון הפרולקטין בדם. לעתים נדירות זה עלול לגרום ל:
    - התנפחות החזה בגברים ובנשים ויצירת חלב באופן בלתי צפוי.
    - הפסקת המחזור החודשי או מחזור לא סדיר אצל נשים.
- ייתכן כי הרופא שלך יבקש לבצע לך בדיקות דם מפעם לפעם.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. אין לאחסן מעל ל-30°C.

## 6. מידע נוסף

### נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

microcrystalline cellulose; lactose monohydrate; sodium citrate; hypromellose; magnesium stearate; titanium dioxide; polyethylene glycol 400; ferric oxide, yellow (50, 200 and 300 mg tablets); ferric oxide, red (50 mg tablets).

### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**טבליות סרוקואל אקס.אר 50 מ"ג** הן בצורת קפסולה, קמורות משני הצדדים, בעלות צבע אפרסקי, ומוטבע על צידן האחד XR50.

**טבליות סרוקואל אקס.אר 150 מ"ג** הן בצורת קפסולה, קמורות משני הצדדים, צבען לבן, ומוטבע על צידן האחד XR150.

**טבליות סרוקואל אקס.אר 200 מ"ג** הן בצורת קפסולה, קמורות משני הצדדים, צבען צהוב, ומוטבע על צידן האחד XR200.

**טבליות סרוקואל אקס.אר 300 מ"ג** הן בצורת קפסולה, קמורות משני הצדדים, בעלות צבע צהוב חיוור, ומוטבע על צידן האחד XR300.

**טבליות סרוקואל אקס.אר 400 מ"ג** הן בצורת קפסולה, קמורות משני הצדדים, בעלות צבע לבן, ומוטבע על צידן האחד XR400.

האריזה מכילה 10, 30, 50, 60 או 100 טבליות באריזת בליסטר. ייתכן שלא כל גודלי האריזה משווקים.

### שם היצרן וכתובתו:

צ'פלאפארם ארזנימיטל בע"מ, גרייפסוואלד, גרמניה.

שם בעל הרישום וכתובתו:  
צמל ביו-פארמה בע"מ, רח' המגשימים 20, פתח תקווה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
1418931973 סרוקואל אקס.אר 50 מ"ג:  
1469733472 סרוקואל אקס.אר 150 מ"ג:  
1419031974 סרוקואל אקס.אר 200 מ"ג:  
1419131975 סרוקואל אקס.אר 300 מ"ג:  
1419231976 סרוקואל אקס.אר 400 מ"ג:

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלונים מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית סירקו את הקוד הבא

**For further information about the medicinal product and for updated consumer leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the code**



סרוקואל אס.אר 400 מ"ג



סרוקואל אס.אר 300 מ"ג



סרוקואל אס.אר 200 מ"ג



סרוקואל אס.אר 150 מ"ג



סרוקואל אס.אר 50 מ"ג

ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני [info.pharma@tzamal-medical.co.il](mailto:info.pharma@tzamal-medical.co.il) או בטלפון מספר 073-7151111.

עלון זה נערך בנובמבר 2024.