

מידע נוסף (נא למלא)

שם המטופלת:

.....

שם הרופא:

.....

מספר הטלפון של הרופא:

.....

כרטיס זה ותוכנו אושרו על ידי משרד
הבריאות בפברואר 2025

ולסיפיטי (אטרסימוד)

כרטיס תזכורת בנושא היריון



Version 1.0



פיזור פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח
טל': 09-9700500 פקס: 09-9700501

מידע למטופלת

אם נעשה שימוש במהלך היריון, ולסיפטי עלול לגרום נזק לעובר. הסיכונים האפשריים כוללים אובדן ההיריון ומומים מולדים.

• אין להשתמש בולסיפטי אם את בהיריון, מיניקה, או יכולה להרות ואינך משתמשת באמצעי מניעה יעילים.

• לפני תחילת הטיפול בולסיפטי:

1. הרופא יסביר את הסיכונים האפשריים לעובר אם תהרי בזמן נטילת ולסיפטי, ויידע אותך בקביעות כיצד למזער את הסיכונים.

2. עלייך להשתמש באמצעים יעילים למניעת היריון בזמן נטילת ולסיפטי ולפחות 14 ימים לאחר שתפסיקי ליטול ולסיפטי.

3. הרופא ידאג שתבצעי בדיקת היריון שצריכה להיות שלילית. בדיקות היריון יבוצעו גם במהלך הטיפול.

• דעי את הרופא שלך באופן מיידי אם תהרי במהלך הטיפול בולסיפטי, או במהלך 14 הימים לאחר הפסקת הטיפול. הרופא ידון איתך על ההשפעות המזיקות לתינוק הקשורות לטיפול ויתכן ויפנה אותך לבדיקות נוספות כגון אולטרסאונד. יש לעצור את הטיפול בולסיפטי במהלך ההיריון.

• ספרי לרופא מיד אם את בהיריון או מיניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת להרות.

• שמרי כרטיס זה איתך והראי אותו לכל רופא או רוקח המעורב בטיפול בך.

• ראי את העלון לצרכן של ולסיפטי למידע נוסף.

דיווח תופעות לוואי

חשוב לדווח על כל תופעות לוואי, גם כאלו שאינן מופיעות בעלון לצרכן.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח תופעות לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות:

www.health.gov.il

או על ידי בניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לפיזר במייל:

isr.aereporting@pfizer.com