

## معلومات إضافية (يرجى ملؤها)

اسم المتعاجة:

.....

اسم الطبيب:

.....

رقم هاتف الطبيب:

.....

هذه البطاقة ومحتواها تمت المصادقة عليهما  
من قبل وزارة الصحة في شباط 2025

# فيلسيبيتي (إيتراسيمود)

بطاقة تذكير بخصوص الحمل



Version 1.0



فايزر للمستحضرات الصيدلانية إسرائيلية م.ض، شارع شنكار 9،  
هرتسليا بيتواح هاتف: 09-9700500 فاكس: 09-9700501

## معلومات لمتلقيّة العلاج

إذا تم استخدامه خلال فترة الحمل، فيلسيبيتي قد يضر الجنين. وتشمل المخاطر المحتملة فقدان الحمل والعيوب الخلقية.

- يمنع استخدام فيلسيبيتي إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو قد تصبحين حاملاً ولا تستخدمين وسائل منع حمل فعالة.
- قبل البدء بالعلاج بفيلسيبيتي:

1. سوف يشرح لك الطبيب المخاطر المحتملة على الجنين إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول فيلسيبيتي، وسيعلمك بانتظام كيفية تقليل المخاطر.
2. يجب عليك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل أثناء تناول فيلسيبيتي ولمدة 14 يوماً على الأقل بعد التوقف عن تناول فيلسيبيتي.

3. سيتأكد الطبيب أن تجري اختبار الحمل الذي يجب أن يكون سلبياً. سيتم أيضاً إجراء اختبارات الحمل أثناء العلاج.

- أخبري طبيبك فوراً إذا أصبحت حاملاً أثناء العلاج بفيلسيبيتي، أو خلال 14 يوماً بعد التوقف عن العلاج. سوف يناقش الطبيب معك الآثار الضارة على الطفل المرتبطة بالعلاج وقد يحيلك إلى اختبارات إضافية مثل الموجات فوق الصوتية (اولتراساوند). يجب أن يتم إيقاف العلاج بفيلسيبيتي أثناء الحمل.

- أخبري طبيبك فوراً إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل.

- احتفظي بهذه البطاقة معك وأظهرها لأي طبيب أو صيدلي مشارك في علاجك.

- لمزيد من المعلومات راجعي النشرة للمستهلك لفيلسيبيتي.

## الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

من المهم الإبلاغ عن كل الأعراض الجانبية، حتى تلك التي لا تظهر في نشرة المستهلك. من الممكن تبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال نموذج التبليغ عن أعراض جانبية الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة:

[www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

أو من خلال الدخول على الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية أيضاً لفايزر عن طريق البريد الإلكتروني:

[isr.aereporting@pfizer.com](mailto:isr.aereporting@pfizer.com)