

## لماذا يجب عليّ أن أقرأ هذا الدليل للمُتعالج؟

يُمكن أن يرتبط العلاج بأوزورديكس بالمخاطر الآتية:

- ارتفاع في الضغط داخل العين، يُمكن أن يؤدي لغلوكوما (مرض عيون يُسبب فقدان الإبصار).
- التهاب في داخل العين (غالبًا نتيجةً لتلوث).

لمنع تطور/الحد من الانعكاسات الخطيرة، من المهم أن تعرف العلامات والأعراض المُبكرة لتلك المخاطر المُرتبطة بالعلاج بأوزورديكس.

## كيف أستعد للعلاج؟

قبل العلاج، سيصف لك الطبيب قطرة عيون عبارة عن مُضاد حيوي. عليك استخدامها لمدة 3 أيام قبل العلاج الخاص بك. عليك استخدام قطرة العيون لمدة 3 أيام بعد الحقن. يُمنع استخدام مُستحضرات التجميل في يوم الحقن.

## ما الذي سينطوي عليه العلاج الخاص بي؟

من أجل إعدادك قبل العلاج، سيُنَفَّذ الطبيب النشاطات الآتية:

- سيُنظف العين للحد من خطورة التلوث، ويُمكن أن يُعطي لك قطرة عيون إضافية عبارة عن مضاد حيوي.
- سيُغطي وجهك بملاءة خاصة.
- سيُخدّر عينك بمادة مُخدّرة لكيلا تشعر بالألم.
- سيستخدم جهازًا لإبقاء عينك مفتوحة بلطف.

بعد ذلك، سيستخدم الطبيب أداة توصيل (مطابق) مُخصصةً لحقن الدواء لداخل العين، عبر الجزء الأبيض من العين.

يُمكن أن تسمع رنين نقرية في أثناء الإجراء، ويُمكن أيضًا أن تشعر بقليل من الضغط على العين.

بعد ذلك، سيُنَفَّذ طبيبك فحص عيون روتيني للتأكد من أن إعطاء الدواء قد تمّ بنجاح.

# أوزورديكس (Ozurdex®) - دليل المُتعالج

(غرسة ديكساميثازون داخل الجسم الزجاجي 0.7 ملغ)

يشمل دليل المُتعالج هذا معلومات سلامة مهمة يُستحسن معرفتها قبل العلاج بأوزورديكس وبعده.

2

لماذا يجب عليّ أن أقرأ هذا الدليل للمُتعالج؟

2

العلاج

2

كيف يجب عليّ أن أستعد للعلاج؟

2

ما الذي سينطوي عليه العلاج الخاص بي؟

3

ماذا سيحدث بعد العلاج الخاص بي؟

4

أين يمكن العثور على المزيد من المعلومات

## أين يُمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الدواء الخاص بك



على غرار أي علاج دوائي، فيمكن أيضًا للعلاج بأوزورديكس أن يُسبب أعراضًا جانبيةً، لكنها لا تحدث لدى الجميع، مثل:

- أحداث في العينين مثل إعتام عدسة العين (كاتاراكت) وانفصال الشبكية.
- يُمكن العثور على قائمة مُفصّلة بالأعراض الجانبية المُمكنة في نشرة المُستهلك المُزوّدة في عبوة المُنتج الخاصة بأوزورديكس.

للمزيد من المعلومات عن الدواء، نرجو الاطلاع على نشرة المُستهلك. يُمكن الوصول للنشرة بشكلٍ رقمي على موقع وزارة الصحة على العنوان الإلكتروني <https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

للحصول على نُسخٍ إضافيةٍ من دليل المُتعالج، نرجو الاتصال بعنوان البريد الإلكتروني [pvisrael@abbvie.com](mailto:pvisrael@abbvie.com).

للإبلاغ عن أعراض جانبية ناجمة عن استخدام الدواء، نرجو الاتصال بشركة AbbVie على عنوان البريد الإلكتروني [pvisrael@abbvie.com](mailto:pvisrael@abbvie.com). يُمكن الإبلاغ عن أي أعراض جانبية على موقع وزارة الصحة على العنوان الإلكتروني [sideeffects.health.gov.il](http://sideeffects.health.gov.il)

من أجل تبسيط القراءة وتسهيلها، كُتِب هذا الدليل بصيغة المُذكّر. وعلى الرغم من ذلك، فدليل المعلومات مُخصّص للجنسين.

فُحص دليل المُتعالج هذا وصدق عليه من قبل وزارة الصحة في 03/Sep/2024

## ماذا سيحدث بعد العلاج الخاص بي؟

بعد الحقنة:

- قد يُصبح الإبصار لديك مُشوَّشًا لمُدّة يومٍ واحدٍ.
- وكذلك، يُمكن أن ترى أجسامًا طافية أو نقاطًا؛ هذه ظاهرةٌ سليمة ومن المُتوقَّع أن تختفي بمرور الوقت.
- إذا لم تختفِ تلك الأعراض، أو إذا تفاقت، فنرجو منك الاتصال بطبيبك.
- إذا كنت عادةً تقود سيارةً أو تُشغّل ماكيناتٍ، فيُمنع القيام بتلك النشاطات حتى يختفي أي تشوش الإبصار.

## اتصل بالطبيب أو المُمرضة المُعالجين بدون تأخير إذا عايشت تلك المؤشرات والأعراض في أي وقت بعد العلاج بأوزورديكس.

- تدهور في الإبصار بعد الحقن.
- ألم أو عدم راحة في داخل العين أو حولها.
- زيادة في تعداد الأجسام الطافية أو النقاط في مجال الإبصار.
- تشوش إبصار يستمر أكثر من يومٍ واحد بعد الحقن.
- احمرار في العين يستمر في التفاقم.
- إفرازات من العين.