

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמ"ו – 1986

התרופה מסווגת ללא מרשם רופא

ספירט ויטפילד פלוריש ספירט

הרכב:

חומצה בנזואית w/v 6%, חומצה סליצילית w/v 3% (w/v 6% Salicylic Acid, 3% Benzoic Acid) למרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זאת ניתנת ללא צורך במרשם רופא ואינה מיועדת בדרך כלל לילדים לתינוקות מתחת לגיל שנתיים. עלִיך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה" בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עלִיך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בפטריות.

קבוצה תרופוטי: תכשירים אנטי-פטריותיים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- ספירט ויטפילד פלוריש עלולה לגרום לתגובות אלרגיות אצל חלק מהמטופלים.
- אין להדליק סגריה או להיות בקרבת אש גלויה – קיים סיכון לכוויות חמורות. בד (בגדים, מצעים, תחבושת וכו') שבא במגע עם התרופה, נשרף בקלות ויתרש ומוהוה סיכון חמור לשריפה. כביסת הבגדים והמצעים עשויה להפחית את הצטברות התרופה אך לא להסירה לחלוטין.
- יש להימנע ממגע עם עיניים ורקמות ריריות.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

לספירט ויטפילד פלוריש יש אינטראקציות ידועות עם תכשירים אחרים. עם זאת, חומצה סליצילית בשימוש

מקומי עלולה להגביר את הספיגה של תרופות אחרות הניתנות במתן מקומי. לכן, יש להימנע משימוש בו-זמני בספירט ויטפילד פלוריש ובתרופות אחרות הניתנות במתן מקומי על אותו אזור בעור.

הריון, הנקה ופוריות:

אם הנך בהריון יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכונית:

לתרופה אין השפעה על היכולת לנהוג ולהשתמש במכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה אלוהול העלול לגרום לתגובות צריבה על עור פגום.

תרופה זו מכילה 70 מ"ל אלוהול בכל 100 מ"ל, ריכוז השווה ערך ל-0.7 מ"ל/מ"ל.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לימינו ולאופן השימוש בתרופה.

המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא הוא:

יש למרוח על העור הפגוע באמצעות צמר גפן ספוג בחומר, 1-3 פעמים ביום, ולהניח לחומר להתייבש.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

אין לבלוע, התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את ארזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב מכשירים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בספירט ויטפילד פלוריש עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10% משתמשים מתוך 100:

תחושת חום או צריבה (שעשויה להימשך עד 5 דקות לאחר השימוש).

• **חומצה בנזואית (E210) –** דווחו תגובות אלרגיות לחומצה בנזואית. חומר זה עלול לגרות את העיניים, העור והריריות.

• **חומצה סליצילית –** חומצה סליצילית גורמת לגירוי עדין. שימוש בתכשירים המכילים חומצה סליצילית על העור עלול לגרום לדלקת העור (דרמטיטיס). ישנן דיווחים על תסמינים של הרעלת סליצילטים חריפה לאחר שימוש ממושך בתכשירים המכילים חומצה סליצילית על שטחי עור נרחבים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלִיך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הלחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע היעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס למוח האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- אחסן בטמפרטורת החדר, מתחת ל-25°C.
- זהירות! חומר דליק, שמור מפני אש.
- ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה, עד שפג תוקפו.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Alcohol 70%

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק חום המכיל נוזל צלול חסר צבע.

תכולת האריזה: 100 מ"ל

היצרן ובעל הרישום:

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.נ. משגב 2017400, ישראל.

עלון זה נערך ב-03/2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 609127485

לשם הפטנט ולהקלת הקנייתו, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.