

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط



السينزا 150 ملغ كبسولات

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

alectinib 150 mg (أليكتينيب 150 ملغ)

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، لإحتوائها على معلومات هامة من أجلك.

- إحتفظ بالنشرة. من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.
- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم، حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

السينزا مخصص لعلاج سرطان الرئتين من نوع الخلايا غير الصغيرة (non-small cell lung cancer [NSCLC]) عندما يكون الورم إيجابياً لـ ALK - أي أنه يوجد في خلايا السرطان عيب في المورثة المسماة ALK ('anaplastic lymphoma kinase').

يمكن أن يتم وصف **السينزا** لك في الحالات التالية:

- بعد إستئصال الورم، كعلاج ما بعد العملية الجراحية (مساعد) أو
- كعلاج أول لورم متقدم أو
- كعلاج لورم متقدم موضعياً أو إنتشر لمناطق أخرى في جسمك (نقيلي) بعد علاج بدواء يسمى crizotinib. أو عدم تحمل (intolerance) الدواء crizotinib.

كيف يعمل السينزا

يوقف **السينزا** عمل الإنزيم المسمى تيروزين كيناز من نوع ALK. إن الشكل غير الطبيعي لهذا الإنزيم (جاء خلل في المورثة) يحفز على نمو خلايا سرطانية. بإمكان **السينزا** إبطاء أو إيقاف نمو السرطان لديك ويمكنه منع عودة الورم بعد إستئصاله بواسطة عملية جراحية. من شأنه أيضاً أن يساعد على تقليص السرطان لديك.

الفصيلة العلاجية: مثبط لتيروزين كيناز

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (alectinib) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6 - «معلومات إضافية»).

⚠ تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـالسينزا، إستشر الطبيب أو الصيدلي إذا:

- عانيت في الماضي من مشاكل في المعدة أو في الأمعاء مثل ثقب (perforation) أو إذا وجدت لديك حالات أدت لإلتهاب في البطن (إلتهاب الرتج - diverticulitis) أو إذا إنتشر السرطان لداخل البطن (نقيلي). من الجائز أن **السينزا** قد يزيد الخطورة لتطور ثقب في جدار الأمعاء.
- وجدت لديك مشكلة وراثية لعدم تحمل الجلاكتوز (galactose intolerance)، نقص اللاكتاز الخلقي (congenital lactase deficiency) أو سوء إمتصاص الجلوكتوز - چالكتوز (glucose-galactose malabsorption).

بعد تناول **السينزا**، إحك للطبيب حالاً:

- إذا شعرت بألم شديد في البطن أو في المعدة، سخونة، قشعريرة، غثيان، تقيؤ، أو قساوة في البطن أو نفخة، لأن هذه يمكن أن تكون أعراضاً لإنتقاب في جدار المعى.
- إذا تطورت الأعراض الجانبية التالية خلال فترة العلاج بـ **السينزا** توجه حالاً لطبيبك:
- تضرر الكبد - يجري لك طبيبك فحوص الدم قبل بدء العلاج، وكل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العلاج وبعد ذلك بوتيرة منخفضة أكثر. وذلك للتأكد من عدم وجود مشاكل لديك في الكبد طوال فترة تناولك لـ **السينزا**. إحك لطبيبك حالاً إذا كنت تقاسي من إحدى العلامات التالية:
- إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين، آلام في الجانب الأيمن من منطقة البطن، بول داكن، حكة في الجلد، تناقص الشهية للطعام، غثيان أو تقيؤ، الشعور بإرهاق، ظهور كدمات وأنزفة بسهولة أكبر مما هو عليه في السابق.
- نظم قلب بطيء (bradycardia).
- إلتهاب الرئتين - قد يسبب **السينزا** خلال العلاج إلى إنتفاخ الرئتين (إلتهاب) الذي قد يكون خطيراً أو يشكل خطراً على الحياة. العلامات يمكن أن تكون مشابهة لعلامات سرطان الرئتين لديك. إحك لطبيبك حالاً إذا وجدت لديك علامات جديدة أو تفاقم في العلامات بما في ذلك صعوبات في التنفس، ضيق في التنفس أو سعال مع أو بدون بلغم أو سخونة.
- ألم شديد في العضلات، حساسية وضعف في العضلات. يجري لك طبيبك فحوص دم كل أسبوعين على الأقل خلال الشهر الأول وعندما يتطلب الأمر خلال العلاج بـ **السينزا**. إحك لطبيبك حالاً إذا وجدت لديك علامات جديدة أو تفاقم في علامات المشاكل العضلية، بما في ذلك ألم مجهول السبب في العضلات، أو ألم عضلي لا يزول، حساسية أو ضعف في العضلات.
- تفكك غير سليم لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم الإنحالي). إحك لطبيبك حالاً إذا شعرت بألم مرهق، لديك ضعف أو ضيق في التنفس.
- عليك الإنتباه لتلك الأعراض الجانبية خلال فترة إستعمال **السينزا**. لمعلومات إضافية، أنظر الفقرة 4 «الأعراض الجانبية».
- **حساسية لضوء الشمس**
- لا يجوز التعرض للشمس لفترة زمنية مطولة خلال فترة تناول **السينزا** ولمدة 7 أيام بعد التوقف عن العلاج. عليك وضع كريم واقى ومرهم شفاه ذو عامل وقاية SPF 50 (Sun Protection Factor) وما فوق لتفادي حدوث حروق الشمس.
- **الأطفال والمراهقون**
- لم يتم فحص **السينزا** لدى الأطفال أو المراهقين. لا يجوز إعطاء هذا الدواء لأطفال أو لمراهقين دون عمر 18 سنة.
- **الفحوص والمتابعة**
- عندما تتناول **السينزا** يجري لك طبيبك فحوص الدم قبل بدء العلاج، كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العلاج وبعد ذلك بوتيرة منخفضة أكثر. وذلك للتأكد من عدم وجود مشاكل في الكبد أو العضلات لديك عند تناول **السينزا**.
- **التداخلات / التفاعلات بين الأدوية**
- **إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو قد تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، لأن **السينزا** يمكن أن يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية وكذلك فإن أدوية معينة يمكن أن تؤثر على طريقة عمل **السينزا**.**
- يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول واحداً من الأدوية التالية:
- ديجوكسين، دواء لعلاج مشاكل القلب
- دابيجاتران إتيكسيلات، دواء لعلاج الخثرات الدموية
- ميتوتريكسات، دواء لعلاج إلتهاب مفاصل خطير، سرطان والمرض الجلدي الصدفي
- نيلوتينيب، دواء لعلاج أنواع معينة من السرطان
- لاياتينيب، دواء لعلاج أنواع معينة من سرطان الثدي
- ميتوكسانترون، دواء لعلاج أنواع معينة من السرطان أو التصلب المتعدد (مرض يؤثر على الجهاز العصبي المركزي حيث يضر بالطبقة الهاقبة على الأعصاب)

- إيثيروليموس، دواء لعلاج أنواع معينة من السرطان أو لمنع رفض عضو مزروع من قبل جهاز مناعة الجسم
- سيروليموس، دواء لمنع رفض عضو مزروع من قبل جهاز مناعة الجسم
- توبوتيكان، دواء لعلاج أنواع معينة من السرطان
- أدوية لعلاج متلازمة الفشل المناعي المكتسب (الإيدز) / فيروس HIV (مثل: ريتونافير، ساكوينافير)
- أدوية لعلاج التلوثات، بما في ذلك التلوثات الفطرية (مثل: كيتوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوساكونازول)، وتلوثات جرثومية (مضادات حيوية، مثل: تيليتروميسين)

- عشبة سانت جونس وورت (St. John's Wort)، لعلاج الإكتئاب
- أدوية لوقف الإختلاجات (أدوية مضادة للصرع، مثل: فينيتوئين، كاربامازيبين، فينوباربيتال)
- أدوية لعلاج السل (مثل: ريفامبيسين، ريفابوتين)
- نيفازودون، دواء لعلاج الإكتئاب

وسائل منع الحمل الفموية

إذا كنت تتناولين **السينزا** ووسائل منع حمل فموية، فمن الجائز أن تكون وسائل منع الحمل أقل نجاعة.

السينزا مع الطعام والشراب

يجب تناول الدواء مع الطعام.

إحك للطبيب المعالج الخاص بك أو للصيدلي إذا كنت أنت / أنت تشرب / ين عصير الجريب فروت أو تتناول / ين الجريب فروت أو النارج / البرتقال المر خلال فترة العلاج بـ **السينزا** كونها قد تغير من كمية الدواء في جسمك.

وسائل منع الحمل، الحمل والإرضاع

وسائل منع الحمل - معلومات للنساء:

- لا يجوز الحمل خلال فترة إستعمال هذا الدواء.
- إذا كان بإمكانك الحمل، عليك إستعمال وسائل منع حمل الأكثر نجاعة خلال فترة العلاج وعلى الأقل لمدة 5 أسابيع بعد التوقف عن العلاج.
- إذا تناولت **السينزا** سوية مع وسائل منع حمل فموية، فمن الجائز أن تكون وسائل منع الحمل أقل نجاعة.

وسائل منع الحمل - معلومات للرجال:

- لا يجوز إنجاب طفل أبداً خلال فترة تناول هذا الدواء.
- إذا كان بإمكان زوجتك أن تصبح حامل، فعليك إستعمال وسائل منع حمل الأكثر نجاعة خلال فترة العلاج وعلى الأقل لمدة 3 أشهر بعد التوقف عن العلاج.
- عليك التحدث مع طبيبك بخصوص الطرق الصحيحة لمنع الحمل بالنسبة لك وبالنسبة لزوجك / زوجتك.

الحمل:

- لا يجوز تناول **السينزا** إذا كنت في فترة الحمل، لأن الدواء قد يلحق الضرر بطفلك.
- إذا أصبحت حامل خلال فترة العلاج بالدواء أو خلال الأسابيع الخمسة التي تلي تناول المقدار الدوائي الأخير، أخبري طبيبك حالاً عن ذلك.
- إذا أصبحت زوجتك حامل بينما تتناول هذا الدواء، أو خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تناول المقدار الدوائي الأخير، أخبر طبيبك بذلك. كما أنه، يتوجب على زوجتك التوجه لتلقي إستشارة طبية.

الإرضاع:

لا يجوز الإرضاع خلال فترة إستعمال الدواء. سبب ذلك بأنه لا يعرف فيما إذا كان بإمكان **السينزا** الإنتقال إلى حليب الأم وبالتالي من شأنه أن يلحق الضرر برضيعك.

السياقة وإستعمال الماكينات

يجب توخي الحذر عند السياقة وإستعمال الماكينات، وذلك عند تناول **السينزا**. وذلك لأنه قد تتطور لديك مشاكل في الرؤية، تباطؤ في نظم القلب أو إنخفاض في ضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى إغماء أو دوام.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي **السينزا** على لكتوز (نوع من السكر). إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل أو أنك غير قادر على هضم سكريات معينة، فاستشر طبيبك قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

• الجرعة الدوائية اليومية الإعتيادية من **السينزرا** (1200 ملغ) تحتوي على 48 ملغ صوديوم (المركب الأساسي في ملح الطعام/ ملح الطبخ). تعادل هذه الكمية %2.4 من إستهلاك الصوديوم اليومي الأعظمي الموصى به لشخص بالغ.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية الإعتيادية

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

• الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 4 كبسولات (المجموع 600 ملغ) مرتين في اليوم. ذلك يعني بأنه عليك تناول 8 كبسولات بالإجمال (1200 ملغ) كل يوم.

• إذا وجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد قبل بدء العلاج بـ **السينزرا**:

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي 3 كبسولات (450 ملغ)، مرتين في اليوم. ذلك يعني بأن عليك تناول 6 كبسولات بالإجمال (900 ملغ) كل يوم.

أحياناً من شأن الطبيب أن يخفض جرعتك الدوائية، أن يوقف علاجك لفترة زمنية قصيرة أو أن يوقف علاجك تماماً، إذا شعرت بسوء.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة تناول الدواء

• يتم تناول **السينزرا** عن طريق الفم. عليك بلع الكبسولات بشكلها الكامل. لا يجوز فتح أو إذابة الكبسولات.

• يجب تناول الدواء مع الطعام.

إذا تقيأت بعد تناول جرعة دوائية من **السينزرا**، فلا تتناول جرعة دوائية إضافية، بل عليك تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر مما تحتاج من **السينزرا**، أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء فعليك التحدث مع الطبيب أو التوجه إلى المستشفى حالاً. خذ معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء **السينزرا** في الوقت المطلوب، فيجب التصرف بحسب التعليمات التالية:

• إذا كان المقصود بأكثر من 6 ساعات حتى موعد تناول الجرعة الدوائية التالية، فتناول الجرعة الدوائية المنسية لحظة تذكرك بذلك.

• إذا كان المقصود بأقل من 6 ساعات حتى موعد تناول الجرعة الدوائية التالية، فلا يجوز تناول الجرعة الدوائية المنسية. يجب الإنتظار وتناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت المحدد الخاص بك.

• لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

إذا توقفت عن تناول الدواء **السينزرا**

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

من المهم تناول **السينزرا** مرتين في اليوم للفترة الزمنية التي حددها طبيبك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **السينزرا** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

الأعراض الجانبية التالية يمكن أن تظهر خلال فترة إستعمال هذا الدواء.

يجب إبلاغ الطبيب حالاً إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية التالية. من شأن الطبيب أن يخفض جرعتك الدوائية، إيقاف العلاج

الخاص بك لفترة قصيرة أو إيقاف العلاج الخاص بك تماماً:

• علامات جديدة أو تفاقم العلامات الحالية، بما في ذلك صعوبة في التنفس، ضيق في التنفس، أو سعال مع أو بدون بلغم أو سخونة - هذه العلامات قد تكون مشابهة لعلامات ناجمة عن سرطان الرئتين (علامات محتملة لإلتهاب الرئتين). يمكن أن يؤدي **السينزرا** خلال العلاج إلى إلتهاب خطير في الرئتين أو يشكل خطراً على الحياة.

• إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين، ألم في الجانب الأيمن من منطقة البطن، بول داكن، حكة في الجلد، تناقص الشهية للطعام، غثيان أو تقيؤ، إرهاق، ظهور أنزفة أو كدمات بسهولة أكبر مما هو عليه في السابق (علامات محتملة لمشاكل في الكبد).

• علامات جديدة أو تفاقم العلامات الحالية لمشاكل في العضلات، بما في ذلك: ألم عضلي مجهول السبب أو ألم عضلي لا يزول، حساسية أو ضعف عضلي (علامات محتملة لمشاكل في العضلات).

• إغماء، دوام وإنخفاض ضغط الدم (علامات محتملة لإنخفاض نظم القلب).

• تشعر بإرهاق، ضعف أو ضيق في التنفس (علامات محتملة لتفكك غير سليم لخلايا الدم الحمراء [فقر الدم الإنحلالي]).

أعراض جانبية إضافية:

راجع طبيبك إذا لاحظت الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

• نتائج شاذة في فحوص الدم المخصصة لتحديد فيما إذا كان هناك مشاكل في الكبد (إرتفاع نسب الأنين أمينوترانسفيراز، أسبارتات أمينوترانسفيراز وبيليبروبين)

• نتائج شاذة في فحوص الدم المخصصة لتحديد فيما إذا كان هناك ضرر للعضل (إرتفاع نسب كرياتين فوسفوكيناز)

• نتائج شاذة في فحوص الدم لفحص وجود مرض في الكبد أو مشاكل في العظام (إرتفاع نسب فوسفاتاز القلوي)

• قد تشعر بإرهاق، ضعف أو ضيق في التنفس جراء إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء - فقر الدم

• تقيؤ - إذا تقيأت بعد تناول جرعة دوائية من **السينزرا**، فلا تتناول جرعة دوائية إضافية، بل عليك تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي

• إمساك

• إسهال

• غثيان

• طفح

• إنتفاخ ناتج عن تراكم سوائل في الجسم (وذمة)

• زيادة الوزن

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين عشرة):

• نتائج شاذة في فحوص الدم لفحص الأداء الوظيفي الكلوي (إرتفاع نسبة الكرياتينين)

• إلتهاب في مخاطية الفم

• حساسية للشمس - لا يجوز التعرض للشمس لفترة زمنية مطولة خلال فترة تناول **السينزرا** ولمدة 7 أيام بعد التوقف عن العلاج.

• عليك وضع كريم واقى ومرهم شفاه ذو عامل وقاية SPF 50 وما فوق لتجنب حروق الشمس.

• تغير في حاسة التذوق

• مشاكل في العينين بما في ذلك تشوش الرؤية، فقدان الرؤية، رؤية نقاط سوداء أو بقع بيضاء، إزدواج الرؤية

• إرتفاع في نسب حمض البول في الدم (hyperuricemia)

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين مئة):

• مشاكل في الكلى بما في ذلك فقدان سريع للأداء الوظيفي الكلوي (تضرر كلوي حاد)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• عبوة القنينة: لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الضوء. يجب حفظ القنينة مغلقة بإحكام للحماية من الرطوبة.

• عبوة اللويحة: لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الضوء والرطوبة.

• لا يجوز رمي الدواء في سلة القمامة المنزلية أو في مياه المجاري. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء من أجل حماية البيئة.

6) معلومات إضافية

المادة الفعالة في الدواء هي alectinib. تحتوي كل كبسولة على alectinib hydrochloride الذي يعادل 150 ملغ.

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Sodium lauryl sulfate, hypromellose, carboxymethylcellulose calcium, lactose monohydrate, hydroxypropylcellulose, titanium dioxide (E171), magnesium stearate, potassium chloride, carrageenan, carnauba wax, corn starch.

Ink: white shellac, FD&C Blue No. 2 aluminium lake (E132), yellow iron oxide (E172), red iron oxide (E172), carnauba wax, and glyceryl monooleate.

لمعلومات إضافية عن بعض مركبات الدواء (لكتوز وصوديوم)، راجع الفقرة 2.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

يتوفر **السينزرا** على شكل كبسولة بلون أبيض حتى أبيض - مائل للأصفر مكونة من جزئين، على جزء واحد طبعت بالأسود الكتابة «ALE» وعلى الجزء الثاني طبعت بالأسود الكتابة «150 mg».

• عبوة القنينة: تحتوي العلبة على قنينة ذات غطاء مقاوم للفتح من قبل الأطفال، حيث تحتوي على 240 كبسولة.

• عبوة اللويحة: تحتوي العلبة على 224 كبسولة (4 علب تحتوي كل واحدة منها على 56 كبسولة).

* من الجائز ألا تسوّق كافة أنواع العبوات.

صاحب الإمتياز وعنوانه: روش فارماسوتيك (إسرائيل) م.ض.، ص.ب. 6391، هود هشارون 4524079.

إسم المنتج وعنوانه: هوفمان - لا روش م.ض.، بازل، سويسرا.

تم إعداد هذه النشرة بتاريخ: كانون الأول 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

155-82-34552-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.