



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

رياچيلا 1.5, 3, 4.5, 6, كبسولات

كل كبسولة تحتوي على كاربيرازين (كلمح هيدروكلوريد) (cariprazine as hydrochloride salt) 1.5, 3, 4.5 أو 6 ملغ على التوالي.

مواد غير فعالة ومسببات الحساسية في الدواء – أنظر بند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- لعلاج الفصام لدى البالغين.
- لعلاج حاد في حالات الهوس أو حالات مختلطة المرتبطة باضطراب ثنائي القطب من نوع I لدى البالغين.
- لعلاج حالات الإكتئاب المرتبطة باضطراب ثنائي القطب من نوع I لدى البالغين.
- لعلاج الإضطراب الإكتئابي الكبير (MDD) بدمجه مع أدوية مضادة للاكتئاب، لدى البالغين.

الفصيلة العلاجية: دواء مضاد للذهان.

رياچيلا يحتوي على المادة الفعالة كاربيرازين وينتمي لفصيلة أدوية مضادة للذهان.

الفصام هو مرض يتميز بأعراض مثل سماع، مشاهدة أو إحساس بأشياء غير موجودة (هذيان)، رغبة، معتقدات خاطئة، كلام وتصرف مرتبك وتبدل المشاعر. الأشخاص الذين يعانون من هذا الوضع قد يشعرون باكتئاب، ذنب، قلق، توتر، أو عدم القدرة على البدء أو المواظبة على نشاطات مُجدولة، عدم الرغبة بالتحدث، عدم التفاعل شعوريًا مع وضع الذي يُؤد عادةً أحاسيس لدى آخرين.

الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب نفسي الذي يؤدي لتغيرات متطرفة في المزاج. يتواجد تصرف جنوني متطرف في طرف واحد من الاضطراب واكتئاب وخيم على الطرف الآخر.

يشير الاكتئاب الكبير (MDD) إلى اضطراب حاد في المزاج المصحوب بأعراض جسدية، عاطفية وسلوكية والتي تمس في أداء أولئك الذين يعانون منه بشكل كبير.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعالة (كاربيرازين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (أنظر بند 6).
- كنت تتناول أدوية لعلاج:
 - التهاب كبد الناتج عن فيروس هيباتيتيس C (أدوية التي تحتوي على بوسبيريفير، تيلابريفير)
 - تلوثات جرثومية (أدوية التي تحتوي على كلاريثروميسين، تيليثروميسين، نافاسيلين)
 - داء السل (أدوية التي تحتوي على ريفامبيسين)
 - تلوثات فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) (أدوية التي تحتوي على كوفيسينات، إندينافير، نيلفينافير، ريتونافير، ساكوينافير، إيفافيرينز، إترافيرين)
 - تلوثات فطرية (أدوية التي تحتوي على إتراكونازول، فوساكونازول، فريكونازول)
 - متلازمة كوشينغ – عندما ينتج الجسم فائض من الكورتيزول (أدوية التي تحتوي على كيتوكونازول)
 - إكتئاب (أدوية نباتية التي تحتوي على St. John's wort (هيبيريكوم برفوراتوم) وأدوية التي تحتوي على نيفازودون)
 - صرع واختلاجات (أدوية التي تحتوي على كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينتوئين)
 - نُعاس (أدوية التي تحتوي على مودافينيل)
 - فرط ضغط دم رئوي (أدوية التي تحتوي على بوسينتان)

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

أخبر طبيبك فورًا إذا:

- كان لديك أفكار أو مشاعر لإلحاق الضرر بالذات أو القيام بعمل انتحاري. هناك احتمال أعلى لظهور أفكار وتصرفات انتحارية في بداية العلاج.
- كنت تعاني من دمج سخونة، تعرق، تنفس أسرع، تصلب عضلات ونعاس أو وسن (قد تكون علامات لمتلازمة خبيثة للدواء المضاد للذهان).

قبل أو خلال العلاج برياجيلا، أخبر الطبيب إذا:

- عانيت ذات مرة أو بدأت تعاني من عدم هدوء وعدم القدرة على الجلوس دون حراك. هذه الأعراض قد تظهر في مرحلة مبكرة من العلاج برياجيلا. أخبر الطبيب إذا حدث هذا.
- عانيت ذات مرة أو بدأت تعاني من حركات شاذة لا إرادية، غالبًا في اللسان أو في الوجه. أخبر الطبيب إذا حدث هذا.
- كنت تعاني من مشاكل في النظر. سينصحك الطبيب بالتوجه إلى طبيب عيون.
- كنت تعاني من نبض غير منتظم أو إذا كان لدى شخص آخر من عائلتك تاريخ من نبض غير منتظم (بما في ذلك إطالة مقطع QT الذي يظهر في فحص كهربية القلب)، وأخبر الطبيب إذا كنت تأخذ أدوية أخرى لأنها قد تسبب هذا التغيير في فحص كهربية القلب أو لتفاقمه.
- كنت تعاني من ضغط دم مرتفع أو منخفض، مرض قلب وأوعية دموية. سيحتاج الطبيب إلى فحص ضغط دمك بشكل روتيني.
- كنت تعاني من دوار أثناء الانتقال لوضعية الوقوف بسبب انخفاض جدي في ضغط دمك، الذي قد يسبب الإغماء.
- كان لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك في الماضي خثرات دموية، بما أنه وجدت علاقة بين تناول أدوية لعلاج الفصام وتشكل خثرات دموية.
- كان لديك تاريخ من سكتة دماغية، خاصة إذا كنت مُسن أو تعلم بأن لديك عوامل اختطار أخرى لسكتة دماغية. أخبر الطبيب فورًا إذا كنت تلاحظ أي علامات كانت لسكتة دماغية.
- كنت تعاني من الخرف (فقدان الذاكرة وقدرات عقلية أخرى)، خاصة إذا كنت مُسنًا.
- كنت تعاني من مرض باركنسون.
- كنت تعاني من السكري أو عوامل اختطار للسكري (على سبيل المثال سمنة، أو فرد آخر من العائلة يعاني من السكري). سيحتاج الطبيب إلى أن يفحص بشكل روتيني مستوى السكر في دمك بما أنه قد يرتفع خلال استعمال رياجيلا. علامات مستوى سكر مرتفع في الدم هي عطش مفرط، تبول بكميات كبيرة، ارتفاع في الشهية وشعور بالضعف.
- عانيت في أي وقت مضى من اختلاجات (نوبات) أو صرع.

زيادة في الوزن

رياجيلا قد يؤدي إلى زيادة جديّة في الوزن التي قد تؤثر على صحتك. لذلك، الطبيب بحاجة لفحص وزن جسمك بشكل روتيني.

الأطفال والمراهقين

هذا الدواء غير موصى به للأطفال والمراهقين تحت جيل 18 سنة لأنه لا توجد معلومات بخصوص هؤلاء المتعالجين.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو أخذت في الآونة الأخيرة، أو من المحتمل أن تأخذ أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا تستطيع تناول أدوية معينة سوية مع رياجيلا (أنظر في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

تناول رياجيلا سوية مع أدوية معينة قد يتطلب ملائمة جرعة رياجيلا أو الدواء الآخر. وهي تشمل أدوية لعلاج:

- أمراض القلب (مثل: ديجوكسين، فيراپاميل، ديلتيازام)
- تخثر الدم (مضادات التخثر (أدوية تمنع تخثر الدم)، مثل ديبجترن)
- حالات عدوى جرثومية (مثل اريثروميسين)
- حالات عدوى فطرية (مثل فلوكونازول)

يجب استعمال رياجيلا بحذر عند دمجها مع أدوية أخرى التي تؤثر على أدائك العقلي.

استعمال الدواء والغذاء

لا يجوز شرب عصير الجريب فروت خلال العلاج برياجيلا.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

عليك الامتناع عن استهلاك الكحول خلال العلاج برياجيلا.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

نساء في جيل الخصوبة / وسائل منع الحمل

على النساء بجيل الخصوبة استعمال وسائل منع ناجعة خلال العلاج برياچيلا. حتى بعد إيقاف العلاج، يجب استعمال وسائل منع حمل لمدة 10 أسابيع على الأقل بعد تناول الجرعة الأخيرة من رياچيلا. السبب لذلك هو أن الدواء سيبقى في جسمك لبعض الوقت بعد تناول الجرعة الأخيرة.

الحمل

لا يجوز تناول هذا الدواء خلال الحمل إلا إذا قال لك الطبيب بفعل ذلك. إذا قرر الطبيب بأن عليك تناول هذا الدواء خلال الحمل، سيقوم الطبيب بمتابعة طفلك عن قرب بعد الولادة. السبب لذلك هو أن الأعراض التالية قد تظهر لدى حديثي الولادة لأمهات اللواتي تناولن هذا الدواء خلال الثلث الأخير من الحمل (الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل): رجفة، تصلب و/أو ضعف عضلات، نعاس، عدم هدوء، مشاكل تنفس وصعوبات أكل. إذا طُور طفلك أحد هذه الأعراض، توجهي إلى الطبيب.

الإرضاع

لا يجوز الإرضاع خلال العلاج برياچيلا لأنه لا يمكن نفي الاختطار على الطفل. توجهي إلى الطبيب للاستشارة.

السياقة واستعمال الماكينات

يوجد اختطار طفيف أو متوسط بأن الدواء قد يؤثر على القدرة على السياقة واستعمال الماكينات. قد يحدث نعاس، دوار ومشاكل نظر خلال العلاج بهذا الدواء (أنظر بند 4 "الأعراض الجانبية"). تجنب السياقة أو استعمال أدوات عمل أو ماكينات حتى تعرف بأن هذا الدواء لا يؤثر عليك بشكل سلبي.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

كيسولات رياچيلا 3, 4.5, 6 تحتوي على Allura red AC (E 129). هذه صبغة قد تسبب تفاعلات أرجية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة استعمال الدواء.

الجرعة وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط.

جرعة البداية الموصى بها هي 1.5 ملغ مرة في اليوم عن طريق الفم. بعد ذلك، من الممكن أن يلائم لك الطبيب جرعة الدواء بالتدرج، بزيادات من 1.5 ملغ، حسب استجابتك للعلاج. الجرعة القصوى لعلاج الفصام وحالة الهوس من الاضطراب ثنائي القطب يجب ألا تتخطى 6 ملغ مرة في اليوم؛ لعلاج حالة الإكتئاب من الاضطراب ثنائي القطب وفي حالة الإكتئاب الكبير (MDD) الجرعة القصوى يجب أن لا تتخطى 3 ملغ مرة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول

- يجب تناول رياچيلا في موعد ثابت في كل يوم، مع أو بدون طعام.
- لا توجد معلومات بخصوص فتح الكبسولة ونثرها.

إذا تناولت دواء آخر لعلاج الصرع قبل بدء العلاج برياچيلا، سيقدر الطبيب إذا كان يجب وقف العلاج بالدواء الآخر بالتدرج أو بشكل فوري وكيفية ملائمة جرعة رياچيلا. سيشرح لك الطبيب أيضاً كيف تتصرف إذا انتقلت من علاج برياچيلا لعلاج بدواء آخر.

معالجون مع مشاكل كلية أو كبد

إذا كنت تعاني من مشاكل وخيمة في الكلية أو في الكبد، قد يكون رياچيلا لا يلائمك. استشر الطبيب.

المستنون

سيختار الطبيب بحرص الجرعة الملائمة لاحتياجاتك. رياچيلا غير مُخصص للعلاج لدى المستنين الذين يعانون من الخرف (فقدان الذاكرة).

إذا تناولت بالخطأ جرعة أعلى

إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. قد تشعر بدوار نتيجة لضغط دم منخفض، نبض غير طبيعي، نعاس، تعب، حركات جسم شاذة، صعوبة في الوقوف أو المشي.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المحدد, يجب تناول الجرعة فور تذكرك. لكن إذا كاد يحين موعد الجرعة التالية, يجب تخطي الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية كالمعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. إذا نسيت تناول جرعتين أو أكثر, اتصل بالطبيب.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصي من قبل الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا توقفت عن تناول هذا الدواء, تأثير الدواء سينتهي. حتى إذا طرأ تحسن في حالتك الصحية, لا يجوز تغيير أو إيقاف العلاج برياجيلا دون استشارة الطبيب, لأن ذلك قد يؤدي إلى عودة الأعراض.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية فيما يتعلق باستخدام الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء, قد يسبب استعمال برياجيلا أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية, من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب التوجه فوراً للطبيب إذا كان لديك:

- رد فعل تحسسي وخيم الذي يتميز بسخونة, انتفاخ الفم, الوجه, الشفتين أو اللسان, ضيق تنفس, حكة, طفح وأحياناً انخفاض ملحوظ في ضغط الدم. (عرض جانبي نادر)
- دمج سخونة, تعرق, تصلب عضلات ونعاس أو وسن. قد تكون هذه علامات لملازمة خبيثة للدواء المضاد للذهان. (عرض جانبي شيوعه غير معروف)
- آلام عضلات, تشنجات عضلات أو ضعف عضلات غير مُبرر. قد تكون هذه علامات لضرر للعضل الذي قد يسبب مشاكل كلية وخيمة جداً. (عرض جانبي نادر)
- أعراض متعلقة بخثرات دموية في الأوردة, خاصة في الرجلين (الأعراض تشمل انتفاخ, ألم واحمرار في الرجل), التي قد تنتقل عن طريق وعاء دموي وتصل إلى الرئات وتسبب ألماً في الصدر وصعوبة في التنفس. (عرض جانبي شيوعه غير معروف)
- أفكار أو مشاعر لضرر ذاتي أو تنفيذ عمل انتحاري, محاولة انتحار. (عرض جانبي غير شائع)

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

- عدم هدوء وعدم القدرة على الجلوس دون حراك
- رعاش – وضع طبي مع أعراض كثيرة ومتنوعة التي تشمل قلة حركة أو بطء في الحركة, تباطؤ التفكير, تشنجات أثناء ثني الأطراف (تصلب "عجلة أسنان"), جر الرجلين, رجفة, قلة التعبير في الوجه أو فقدان تعبير الوجه, تصلب عضلات, سيلان اللعاب

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):

- قلق
- نعاس, صعوبات نوم, أحلام شاذة, كوابيس, مشي خلال النوم
- دوام, صداع
- حركات التواء لا إرادية, وضعيات شاذة
- طحن أسنان متزايد أو شد الفك, سيلان اللعاب, رمش متواصل للعين كرد فعل للنقر على الجبين (ارتكاس غير طبيعي), مشاكل في الحركة, اضطراب في حركات اللسان (هذه تُدعى أعراض خارج الهرمية)
- ضبابية الرؤية
- ضغط دم مرتفع
- نبض سريع, منتظم أو غير منتظم
- انخفاض أو زيادة في الشهية
- غثيان, تقيؤ, إمساك, اسهال, صعوبات هضم, جفاف في الفم, آلام بطن, ألم أسنان
- زيادة في الوزن
- تعب, حمى
- ألم في الأطراف, ألم ظهر
- ألم حلق
- فرط تعرق

- أعراض التي يمكن مشاهدتها في فحوصات مختبر:
 - ارتفاع في مستويات إنزيمات كبد
 - ارتفاع في مستويات فسفوكيناز الكرياتين في الدم
 - مستوى غير طبيعي من الدهون (على سبيل المثال كولسترول و/أو دهون) في الدم

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

- إكتئاب
- ارتباك فجائي وخيم
- شعور بالدوار
- شعور لمس شاذ, غير لطيف
- نعاس, قلة حيوية أو قلة اهتمام بالعمل
- حركات لا إرادية, غالبًا في اللسان أو الوجه. هذه الأعراض قد تظهر بعد استعمال قصير أو متواصل.
- انخفاض أو زيادة في الرغبة الجنسية, مشاكل انتصاب
- تهيج في العينين, ضغط مرتفع داخل العين, خلل في الرؤية
- مشاكل تركيز الرؤية للبعيد أو للقريب
- ضغط دم منخفض
- ادراك نبضات القلب (الخفقان)
- تخطيط كهربية قلب غير طبيعي, توصيل كهربائي غير طبيعي للقلب
- وتيرة قلب بطيئة, غير منتظمة
- فواق
- حرقة
- وذمة
- عطش
- ألم عند التبول
- تبول بتواتر عالي وبكمية كبيرة بشكل شاذ
- حكة, طفح
- سكري
- آلام في العضلات
- أعراض التي يمكن مشاهدتها في فحوصات مختبر:
 - مستوى غير طبيعي من الصوديوم في الدم
 - ارتفاع في مستويات الجلوكوز في الدم (سكر في الدم), ارتفاع في مستويات صبغة المرارة (بيليروبين) في الدم
 - فقر دم (مستويات منخفضة من خلايا دم حمراء)
 - ارتفاع في مستويات نوع معين من خلايا دم بيضاء
 - انخفاض في مستويات هرمون محفز الغدة الدرقية (TSH) في الدم

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

- إختلاج
- فقدان ذاكرة, فقدان القدرة على التحدث
- عدم راحة في العين في ضوء ساطع
- تعكر العدسة في العين, التي تسبب انخفاض في الرؤية (ساد)
- صعوبة في البلع
- انخفاض في مستويات نوع معين من خلايا دم بيضاء, هذا قد يسبب لك بأن تكون أكثر حساسية للتلوثات
- قصور الغدة الدرقية

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض التي لم يُحدد شيوعتها بعد):

- التهاب في الكبد (ألم في الجانب الأيمن من أعلى البطن, إصفرار العين والجلد, ضعف, سخونة)
- التهاب الأنف والبلعوم

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة, عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في صفحة البيت بموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية, أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp.) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية في العبوة الخارجية للحماية من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في سلة النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُتَّعَمَل. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضًا على:

رياچيلا 1.5:

Starch pregelatinized (maize), gelatine, titanium dioxide (E 171), magnesium stearate, black ink (black iron oxide (E 172), shellac, propylene glycol, potassium hydroxide)

رياچيلا 3:

Starch pregelatinized (maize), gelatine, magnesium stearate, titanium dioxide (E 171), yellow iron oxide (E 172), brilliant blue FCF (E 133), allura red AC (E 129), black ink (black iron oxide (E 172), shellac, propylene glycol, potassium hydroxide)

رياچيلا 4.5:

Starch pregelatinized (maize), gelatine, magnesium stearate, titanium dioxide (E 171), yellow iron oxide (E 172), brilliant blue FCF (E 133), allura red AC (E 129), white ink (shellac, titanium dioxide (E 171), propylene glycol, simeticone)

رياچيلا 6:

Starch pregelatinized (maize), gelatine, titanium dioxide (E 171), magnesium stearate, allura red AC (E 129), brilliant blue FCF (E 133), black ink (black iron oxide (E 172), shellac, propylene glycol, potassium hydroxide)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

- رياچيلا 1.5: كبسولة بلون أبيض مطبوع عليها "GR 1.5" بلون أسود. أحجام عبوات مصادق عليها: 14 أو 30 كبسولة.
- رياچيلا 3: كبسولة بلون أبيض وأخضر مطبوع عليها "GR 3" بلون أسود. أحجام عبوات مصادق عليها: 14 أو 30 كبسولة.
- رياچيلا 4.5: كبسولة بلون أخضر مطبوع عليها "GR 4.5" بلون أبيض. حجم عبوة مصادق عليه: 30 كبسولة.
- رياچيلا 6: كبسولة بلون أرجواني وأبيض مطبوع عليها "GR 6" بلون أسود. حجم عبوة مصادق عليه: 30 كبسولة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة.

المنتج وعنوانه: جدعون ريختر بي. إل. سي, بودابست, هنغاريا.

تم التنقيح في كانون الأول 2024 حسب تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

رياچيلا 1.5: 163-54-35920-00

رياچيلا 3: 163-55-35921-00

رياچيلا 4.5: 163-56-35922-00

رياچيلا 6: 163-57-35923-00

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لأبناء كلا الجنسين.

صاحب التسجيل: دكسل م.ض., شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل