

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
(תכשירים) התשמ"ו - 1986  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## ספטל סקר® תמיסה לחיטוי לשימוש חיצוני

### הרכב

כלורהקסדין גלוקונאט 4% w/v  
(Chlorhexidine Gluconate 4% w/v)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 -  
"מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על-פי ההוראות בסעיף הוראות השימוש בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

### 1. למע מיועדת התרופה?

- לטיפול ידיים אנטיספטיות
- חיטוי ידיים לפני ניתוח
- חיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח
- קבוצה תרופית: חומרים מחטאים.
- 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתכשיר:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. במיוחד במטופלים עם היסטוריה של תגובות אלרגיות חששות הקשורות לכלורהקסדין.
- אם קיים חשש למגע עם העיניים, האוזן התיכונה, המוח וקרומ המוח (הרקמה המכסה את המוח וחוט השדרה).

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בחבלי הגוף (לדוגמה אף או אוזניים).
- יש להשתמש בזהירות ביילודים, במיוחד אלו שנולדו לפני הזמן. ספטל סקר עולו לגרום לכוויות כימיות בעור.
- הסר כל בד סופג, אריג או בגד לפני שתמשיך לניתוח. אין להשתמש בכמויות מוגזמות ואין לאפשר לתמיסה להצטבר בקפלי העור או מתחת למטופל או לטפס על הסדינים או דבר אחר שנמצא במגע ישיר עם המטופל. כאשר ישנו צורך לשים תחבושות על אזורים בעור שנחשפו לספטל סקר, יש לנקוט בזהירות ולוודא שלא נשארו עודפי תמיסה בטרם חבישת האזור.
- אין לאפשר מגע עם העיניים בגלל חשש לפגיעה בראייה. אם נגרם מגע עם העיניים - שטוף באופן מיידי ויסודי עם מים. במקרה של גירוי, אדם או כאב בעין, או הפרעה לראייה פנה לייעוץ רפואי באופן מיידי. מקרים חמורים של פגיעה מתמשכת בקרנית (פגיעה בפני שטח העין) שעלולה לדרוש השתלת קרנית דווחו כאשר מוצרים דומים באו בטעות במגע עם העין במהלך פרוצדורות

כיורוגיות, בחולים בהרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**  
**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**  
**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לימיון ואופן הטיפול בתכשיר.

### שים לב

אין בלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. **הוראות השימוש:**  
אין למהול את התמיסה.

### לשטיפת ידיים אנטיספטית:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסף 5 מ"ל של ספטל סקר לא מהול ורחץ את הידיים במשך כדקה
3. שטוף היטב במים
4. יבש היטב את הידיים

### לחיטוי ידיים לפני ניתוח:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסף 5 מ"ל של ספטל סקר לא מהול ורחץ את הידיים במשך כדקה
3. נקה את הציפורניים באמצעות מברשת
4. שטוף את הידיים במים
5. חזור על הפעולה פעם נוספת למשך 2 דקות
6. שטוף היטב במים
7. יבש היטב את הידיים

### לחיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח:

1. שטוף את כל הגוף עם 25 מ"ל של ספטל סקר, לפחות פעמיים, בדרך כלל פעם אחת ביום שלפני הניתוח ופעם שנייה ביום הניתוח
2. שטוף היטב במים
3. יבש היטב את הגוף

### אין לעבור על המנה המומלצת.

### אם בטעות בלעת ספטל סקר

אם בטעות בלעת ספטל סקר, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדיקת תגובות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בספטל סקר עולו לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

לעיתים נדירות כלורהקסדין עולו לגרום לרגישות יתר כולל שוק אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השפתיים ולחץ דם נמוך).

**תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה:**  
• תגובות אלרגיות (לדוגמה דלקת של העור, גירוד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפדת, גירוי בעור, שלפוחיות).

• פגיעה בקרנית (פגיעה בפני שטח העין), וזקק קבוע לעיניים כולל ליקוי ראייה קבוע (בעקבות חשיפה מקרית של העיניים במהלך ניתוחי ראש, פניה וצוואר) בחולים תחת הרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

### תופעות לוואי ביילודים:

יתכנו כוויות כימיות ביילודים ובתינוקות (שכיחות לא ידועה).

אם מתרחשת אחת מהתגובות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי.

**אם תופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

### יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

**לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך חודשיים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה של התכשיר.**

### 6. מידע נוסף

• **נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:** Pluronic PE 6800, ammonyx M, isopropanol, D-gluconolactone, herbacol 15.393/T(B), spectralcol ponceau 4R, sodium hydroxide (for pH adjustment), purified water.

• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** נוזל צמיג, צלול עד מעט עכור, בצבע אדום. כל בקבוק מכיל 500 מ"ל תמיסה.

### שם היצרן:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, בנימינה.

### בעל הרישום ותכונות:

טבע ישראל בע"מ, תל אביב.

נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 043.08.23618.00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

teva

SEPTAL SCRUB PL SH0824

