

## جليسيراز بالعين تحميل

المادة الفعالة:

كل تحميلة تحتوي على:

جليسيرول (Glycerol) 2,250 ملغ.

مواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في الدواء - انظر للفصل 6 "معلومات إضافية".  
اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات  
مُختصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه للطبيب أو الصيدلي.

عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة (فصل 3- "كيف  
تستعمل الدواء؟").  
استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب في حال تفاقم  
أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 7 أيام.

### 1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتخفيف الإسهال.

الفصيلة العلاجية: ملين للأعما.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- \* إذا كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة جليسيرول أو لأحد المركبات الإضافية التي  
يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6 "معلومات إضافية").
- \* في حال وجود ألم البطن حاد أو أن مصدره غير معروف.
- \* في حال وجود غثيان أو تقيؤ.
- \* في حال وجود انسداد أمعاء أو تضيق في الأمعاء.
- \* في حال وجود نزيف شرجي مصدره غير معروف.
- \* في حال وجود بواسير المصحوبة بنوبة حادة من الألم والنزيف.
- \* في الحالات الوخيمة من الجفاف

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بجليسيراز بالعين، تحدث مع الطبيب الصيدلي أو الممرضة.  
إن الاستعمال المتواصل قد يسبب الإمان على الأدوية الملمية. لا تستعمل هذا الدواء لفترات  
متكررة، أو لفترة زمنية طويلة، بدون استشارة الطبيب.  
يجب استعمال الملمينات بآقل وتيرة ممكنة ولمدة لا تزيد عن 7 أيام. الاستعمال لفترات  
زمنية أطول يستلزم وصفة طبية بعد تقييم كل حالة بشكل فردي.

إن علاج الإسهال المزمن أو متكرر الحدوث يستوجب دائماً تدخل الطبيب من أجل  
التشخيص، وصف الأدوية والمتابعة خلال العلاج. إن إساءة استعمال الملمينات قد تؤدي  
إسهال دائم الذي يشمل فقدان الماء، أملاح معدنية (خصوصاً البوتاسيوم) وعوامل غذائية  
ضرورية أخرى. في الحالات الأكثر وخامة من إساءة الاستعمال، قد يتم الوصول للجفاف  
أو لمستويات منخفضة من البوتاسيوم (hypokalemia)، مما قد يؤدي لنقص في الوظيفة  
القلبية أو العضلية-العصبية، خصوصاً في حالات العلاج بشكل متزامن مع جليكوزيدات  
قلبية، مدرات بول أو كورتيكوستيرويدات.

إن إساءة استعمال المسهلات، خصوصاً المواد التي تحفز الإسهال (منبهات)، قد يؤدي  
للإمان (الوضع قد يستلزم زيادة الجرعة بشكل متواصل)، الإسهال المزمن وفقدان الوظيفة  
السليمة للأمعاء (ضعف عضلات الأمعاء).  
في حالات الإسهال، يوصى أولاً بالقيام بتصحيح عادات الأكل وإدراج استهلاك كاف من  
الألياف والماء في النظام الغذائي اليومي.  
عند استعمال الملمينات، هناك حاجة لشرب 6-8 كؤوس ماء، أو سوائل أخرى، في اليوم  
حتى يتم تليين البراز.

قم باستشارة الطبيب عندما تتبع الحاجة للملمينات من تغير مفاجئ في حركات الأمعاء  
الاعتيادية (تواتر وخصائص الإخراج) الذي يستمر لأكثر من أسبوعين أو عندما يكون  
استعمال الملمينات غير ناجح.

### الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص غالباً للاستعمال لدى الأطفال والرضع تحت جيل 6 سنوات. عند  
الأطفال تحت جيل 6 سنوات، يمكن استعمال الدواء فقط بعد استشارة طبيبك، من المحبذ

أيضاً أن يقوم المسنون أو الأشخاص الذين حالتهم الصحية ليست سليمة باستشارة الطبيب  
قبل استعمال الدواء.

تداخلات/ تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة  
طبية وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك بذلك.  
لم تُجر أبحاث رسمية حول التفاعلات بين الأدوية.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

استشيري الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعة.  
لم يتم القيام بأبحاث ملائمة حول استعمال الدواء لدى النساء الحوامل أو المرضعات. حتى  
إذا لم يكن هناك منع واضح لاستعمال الدواء في الحمل وفي الإرضاع، يوصى باستعمال  
الدواء فقط عندما تكون هناك حاجة وتحت إشراف طبي.

### التأثيرات على قدرة القيادة واستعمال الآلات

هذا الدواء لا يؤثر على القدرة على القيادة أو استعمال الآلات، بالرغم من ذلك، قد تظهر  
خلال استعمال الدواء أعراض جانبية غير مرغوب بها، لذلك من المحبذ معرفة ما هو رد  
الفعل للدواء قبل أن تقود أو تستعمل الآلات.

### 3. كيف تستعمل الدواء

عليك التحقق من الطبيب بخصوص الجرعة وطريقة العلاج في الدواء.  
الجرعة المتبعة عادة من جليسيراز لدى البالغين هي: تحميلة واحدة في اليوم للبالغين عند  
الحاجة.

هذا الدواء عادةً غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والرضع تحت جيل 6 سنوات، لا  
يجوز استعمال الدواء لدى الأطفال تحت جيل 6 سنوات، بدون استشارة طبيبك. تعزز الحمية  
الغنية بالسوائل من تأثير الدواء.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

في الاستخدام المتواصل لمدة تزيد عن أسبوع يجب استشارة الطبيب.

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال في فتحة الشرج فقط.

### تعليمات الاستعمال

أخرج التحميلة من غلافها وبعد ذلك، إذا كانت هناك حاجة، فم بتربطها لتسهيل إدخالها  
لفتحة الشرج. إذا كانت التحميلة لينة قد بتربط التحميلة المغلفة، قبل فتحها، في الماء البارد.

### إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب أو لغرفة  
الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.  
لم يتم التبليغ عن أي حالة لجرعة مفرطة على أي حال، جرعات زائدة (إساءة استعمال  
الملمينات - استعمال متكرر أو متواصل أو بجرعات زائدة) قد يؤدي لآلم بطن، إسهال  
متواصل الذي يؤدي لفقدان ماء، أملاح معدنية (خصوصاً البوتاسيوم) وعوامل غذائية  
ضرورية أخرى. يجب القيام بتعويض السوائل والكهارل التي تم فقدانها، قلة التوازن  
الكهربي يتميز بالأعراض التالية: ظمأ، تقيؤ، ضعف، وذمة، ألم في العظام (تنتفج العظام)  
والأيومن منخفض في الدم (نقص البوتاسيوم في الدم). لمعلومات حول موضوع إساءة استعمال  
الملمينات الرجاء انظر البند 2- "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء".

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول  
فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.  
إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

ككل أي دواء، قد يسبب استعمال الدواء أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرح  
من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.  
تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية عند استعمال جليسيرول. لا تتوفر معلومات كافية  
من أجل تحديد شوب كل واحد من الأعراض الجانبية.

### أمراض الجهاز الهضمي

ألم نابح من انقباضات في مراكز معزولة أو مخص بطني (آلام بطن تشنجية ومفاجئة)  
وإسهال، بما في ذلك فقدان سوائل وكهارل، بوتيرة أعلى في حالات الإسهال الخيم،  
بالإضافة للتقيؤ في المستقيم.

### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على: sodium stearate,  
sodium hydrogen carbonate.

### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

تحميل مديبة الرأس (على شكل طورييد)، شفاقة، متجانسة ذات مظهر موحد.  
يتم تسويق جليسيراز بالعين في عبوات تحتوي على 18 أو 50 تحميلة.  
قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة.

اسم وعنوان صاحب التسجيل والمسئود:

راز روكوت م.ض، شارع جيشر هيتس 31، المنطقة الصناعية عيمك جيفر، إسرائيل.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 166-64-35814-00

تم نتيجها في كانون الثاني 2025 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

RAZP0136/43-01

إن اتباع التعليمات التي تظهر في نشرة العبوة يقلل من الاختطار (احتمال الخطر) لأعراض  
جانبية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي  
لم يتم ذكره في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

### التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ  
عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة  
(www.health.gov.il) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو  
عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول  
أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال نظرهم وبذلك تمنع التسمم، لا تسبب التقيؤ دون أمر  
صريح من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على  
العبوة الخارجية. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة والإبعاد عن مصادر حرارة  
مباشرة.

- لا توجد شروط تخزين خاصة، لكن يوصى بالتخزين في حرارة الغرفة.