

גליצרז מבוגרים פתילות

החומר הפעיל:

כל פתילה מכילה:

גליצרול (Glycerol) 2,250 מ"ג.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה בפרק 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה (פרק 3 – "כיצד תשתמש בתרופה?").
היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה שתסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת עצירות.

קבוצה תרופוטית: משלשל.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- * אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל גליצרול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- * במקרה של כאב בטן אקוטי או ממקור לא ידוע.
- * במקרה של בחילה או הקאה.
- * במקרה של חסימת מעיים או היצרות במעיים.
- * במקרה של דימום רקטלי ממקור לא ידוע.
- * במקרה של טחורים המלווים בהתקף חרף, כאב ודימום.
- * במצבים חמורים של התייבשות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בגליצרז מבוגרים, דבר עם רופא, רוקח או אחות.
שימוש ממושך עשוי לגרום לתלות במשלשלים. אל תשתמש בתרופה זו לעיתים תכופות, או למשך תקופת זמן ארוכה, בלי להתייעץ עם רופא.
יש להשתמש במשלשלים בתדירות הנמוכה ביותר האפשרית ולא למשך מעל 7-10 ימים. שימוש לתקופות זמן ארוכות יותר דורש מרשם רופא לאחר הערכה מתאימה של כל מקרה פרטני.

טיפול בעצירות כרונית או נשנית תמיד מחייבת התערבות רופא לשם אבחון, מרשם תרופות ומעקב במהלך הטיפול. שימוש לרעה במשלשלים יכול לגרום לשלשול קבוע הכולל אובדן של מים, מלחי מינרלים (במיוחד אשלגן) ופקטורים תזונתיים חיוניים אחרים. במקרים חמורים יותר של שימוש לרעה, עשויים להגיע התייבשות או רמות אשלגן נמוכות (היפוקלמיה), מה שעלול לגרום לחוסר תפקוד לבבי או שרירי-עצבי, במיוחד במקרים של טיפול במקביל עם גליקוזידים לבביים, משתנים או קורטיקוסטרואידים. שימוש לרעה במשלשלים, במיוחד חומרים המעודדים שלשול (סטימולנטים), יכול לגרום לתלות (מצב שעלול לחייב עלייה מתמשכת במינון), עצירות כרונית ואובדן תפקוד מעיים תקין (חולשת שרירי המעיים). במקרים של עצירות, מומלץ קודם כל לפעול לתיקון הרגלי האכילה ולשלב בדיאטה היומית צריכה מסיפקת של סיבים ומים.
כאשר משתמשים במשלשלים, יש צורך לשתות לפחות 6-8 כוסות מים, או נזולים אחרים, ביום כדי להביא לריכוך הצואה.

היוועץ עם הרופא כאשר הצורך במשלשלים נובע משינוי פתאומי בתנועות המעיים הרגילות (שכיחות ומאפייני ההתפתות) הנמשך מעל לשבועיים או כאשר השימוש במשלשלים אינו יעיל.

ילדים ומתבגרים

תרופה זו לא מיועדת לרוב לשימוש בילדים ותינוקות מתחת לגיל 6. בילדים מתחת לגיל 6, ניתן להשתמש בתרופה רק לאחר התייעצות עם הרופא שלך. רצוי שגם קשישים או אנשים שאינם במצב רפואי תקין יתייעצו עם הרופא בטרם שימוש בתרופה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחורנה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עם כך לרופא או לרוקח שלך.
לא נערכו מחקרים רשמיים על האינטראקציות הבין-תרופותיות.

הריון, הנקה ופוריות

היוועץ עם הרופא בטרם שימוש בתרופה אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה.
לא בוצעו מחקרים מתאימים על השימוש בתרופה בנשים בהריון או מניקות. אפילו אם אין איסור ברור לשימוש בתרופה בהריון או בהנקה, מומלץ להשתמש בתרופה רק כאשר יש צורך ותחת פיקוח רפואי.

השפעות על יכולת הנהיגה ושימוש במכונית

תרופה זו אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להשתמש במכונית. עם זאת, ייתכן שבמהלך השימוש בתרופה יופיעו תופעות לוואי לא רצויות. לכן רצוי לדעת מה התגובה לתרופה לפני שאתה נוהג או משתמש במכונית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל בגליצרז מבוגרים: פתילה אחת ליום למבוגרים, לפי הצורך.

תרופה זו לא מיועדת בדרך כלל לשימוש בילדים ותינוקות מתחת לגיל 6. אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 6, ללא התייעצות עם הרופא שלך. תזונה עשירה בנוזלים תורמת להשפעה של התרופה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

בשימוש ברציפות מעל שבוע יש להיוועץ ברופא.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש בפי הטבעת בלבד.

הוראות שימוש

הסר את הפתילה מהעטיפה שלה ואז, אם יש צורך, הרטב אותה כדי להקל על החדרתה לפי הטבעת. אם הפתילות רכות הרטב את הפתילה העטופה, טרם פתיחתה, במים קרים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
לא דווחו כל מקרים של מנת יתר. בכל מקרה, מנת עודפות (שימוש לרעה במשלשלים – שימוש תדיר או ממושך או במנות עודפות) יכול לגרום לכאב בטן, שלשול ממושך המביא לאובדן של מים, מלחי מינרלים (במיוחד אשלגן) ופקטורים תזונתיים חיוניים אחרים. יש לפעול להשלמת הנוזלים והאלקטרוליטים שאבדו. חוסר איזון אלקטרוליטי מתאפיין בתסמינים הבאים: צמא, הקאה, חולשה, בצקת, כאב בעצמות (רככת) ואלבומין נמוך בדם (היפואלבומינמיה). למידע בנושא שימוש לרעה במשלשלים נא ראה סעיף 2 – "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי הבאות דווחו בשימוש בגליצרז. אין מספיק מידע זמין כדי לקבוע את שכיחות כל אחת מתופעות הלוואי.

מחלות מערכת העיכול

כאב הנובע מהתכווצויות במוקדים מבודדים או קוליק בטני (כאבי בטן עונתיים ופתאומיים) ושלשול, כולל אובדן נוזלים ואלקטרוליטים, בשכיחות גבוהה יותר במקרים של עצירות חמורה, כמו גם גירוי ברקטום.

היענות להנחיות המופיעות בעלון האריזה מפחיתה את הסיכון לתופעות לוואי.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מלחות והרחק ממקורות חום ישירים.
- אין תנאי אחסון מיוחדים, אך מומלץ לאחסן בטמפרטורת החדר.

אין לזרוק תרופה זו למי השפכים ולפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח שלך כיצד להיפטר מתרופה בה אין לך צורך יותר. הדבר יעזור להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם: sodium stearate, sodium hydrogen carbonate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

פתילות מחודדות בקצה (צורת טורפדו), שקופות, הומוגניות בעלות מראה אחיד.

גליצרז מבוגרים משווקת באריזות המכילות 18 או 50 פתילות. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

שם וכתובת בעל הרישום והיבואן:

רז רוקחות בע"מ, רחוב גשר העץ 31, פארק תעשיות עמק חפר, ישראל.

מספר רישום בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

166-64-35814-00

נערך בינואר 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

RAZP0136/43-01