

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986 התרופה משוקת ללא מרשם רופא

קאפסירופ סירופ

חומרים פעילים
כל 1 מ"ל מכילים:

אפדרין הידרוכלוריד	1.2 mg
דקסטרומתורפאן הידרברומיד	1 mg
פוטסיום גואיאקול-סולפונאט	24 mg
סודיום בנזואט	4 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עלִיך לטויל את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המיון נוסף זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עלִיך לפנות לרופא אם חסמני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת שיעול במבוגרים ובמתבגרים מגיל 12 ומעלה.

קבוצה תרופוית:

ephedrine hydrochloride הוא סימפטומיטי
dextromethorphan hydrobromide הוא נוגד שיעול
potassium guaiacolsulphonate הוא מכייח

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- בעת התקף אסתמטי או דיכוי נשימתי.
- אם את בהיריון או מניקה.
- אם אתה נוטל תרופות מקבוצת מעכבי מונואמיין אוקסידז (לדיכאון) או שהפסקת טיפול בהן 14-10 יום האחרונים.
- אם אתה נוטל תרופות מקבוצת SSRI (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חזרת של סרוטונין, כגון פלואוקסטיין).
- אם אתה סובל מבעיות בתפקוד הכבד.
- בילדים מתחת לגיל 12.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי היועץ ברופא.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

- אם אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת הנשימה (כגון אסתמה), הלב/ואו כלי דם, העיניים (כגון גלאוקומה), הכליה/מערכת השתן, בלוטת התריס (תירואיד), בלוטת הערמונית.
- אם אתה סובל או סבלת בעבר מאלרגיה (במיוחד אלרגיה לתרופות), מסוכרת.
- במקרה של שיעול מתמשך כתוצאה מעישון או מבעיה כלשהי המערבת את מערכת הנשימה, כגון אסתמה, אמפיזמה, COPD (מחלת ריאות כרונית מחסומת מספונות) או שיעול המלווה בליחה מרובה (ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה").

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות בלא מרשם ותוספי חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון תרופות הרגעה, שינה, פרקינוסון, לאפילפטיה, נגד אלרגיות, חומרים מרדמים לניתוחים ומשככי כאבים נרקוטיים). תרופות נגד דיכאון מסוג מעכבי מונואמיין אוקסידז או SSRI (ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה").

- תרופות להודרת לחץ דם וללב (כגון חוסמי בטא).
- תרופות נגד מיגרנה.
- תרופות נגד התקרות ואו אלרגיה.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול בתרופה.

היריון והנקה
אם את בהיריון או מניקה אין להשתמש בתרופה.

הניהגה ושימוש במכוונת

השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות ואו בראייה ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכוונת מסוכונת ובכל פעילות המחייבת ערנות.

עישון

אם אתה מעשן יש לדווח על כך לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה אתה, סוכרוז ונתרן.
אתנול - התכשיר מכיל v/v 5.2% אתנול (אלכוהול). כל 1 מ"ל מכילים 44.4 מ"ג אתנול. תכולה כוללת של אתנול באריזה: 5,106 מ"ג.

סוכרוז - אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא לפני נטילת התרופה זו. כמו כן סירוף זה יכול להזיק לשיניים.

נתרן - תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן במנה, לפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 שנים: 10 מ"ל שלוש פעמים ביום 10-1 מ"ל בערב לפני השינה.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12. שים לב: יש להקפיד על מדידת המנה בכנסית מדידה מיוחדת.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אם שכחת לטויל את התרופה בזמן הדרוש, אין לטויל מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא.
אין לטויל תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקאפסירופ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש לתופעות לוואי אם מתפתחות התופעות הבאות:

- סימנים פתאומיים של אלרגיה כגון פריחה, גרד, חום, נפיחות בגרון, בפנים, בשפתיים, בעפעפיים, בלשון ו/או בחלקים אחרים בגוף, קוצר/קשיי נשימה, שוק אנפילקטי.
- תחושת קור בקצות הידיים או הרגליים, בחילה, האטות/האצה של קצב הלב.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות:
סחרחורת, אי נוחות בקיבה, מנמנם.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):
כאב ראש, יובש בפה, עצירות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלִיך להתייעץ עם הרופא.



ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>
ניתן גם לדווח על תופעות לוואי לרא"ל safety@trima.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקום חשוך וקריר, מתחת ל-25°C.
- לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש בתרופה במשך 6 חודשים ולא יאוחר מתאריך התפוגה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Purified water, sucrose, honey 375mg, alcohol 96%, caramel, citric acid anhydrous, vanillin, orange flavor, cherry flavor, eucalyptus oil.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

האריזה מכילה בקבוק ובו 115 מ"ל סירוף בצבע חום-קרמל. הבקבוק עמיד לפתיחה בפני ילדים.

בעל הרישום, היצרן וכותבתו: תרימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.

נערך בספטמבר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 176-34-37847-99
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.



0924A
מעברות 4023000
תוצרי רפואה ישראלים
מעברות בע"מ

