

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פוזיד טבליות

טבליות

כל טבליה מכילה:

Furosemide 40 mg
פורוסמיד 40 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

פעילות רפואית

משתן לטיפול בבצקת ריאות, בבצקת המתלווה לאי-ספיקת לב, לשחמת הכבד, למחלת כליות לטיפולו בלחץ דם גבוה.

קבוצה תרפויטית

תרופות משתנות.

תרופות אלו ניתנות לטיפול בבצקת, מצב בו יש יותר מדי מים בגוף שלך. מצב זה יכול להתרחש עקב בעיה בלב, ריאות, כליות, כבד, כלי דם או לחץ דם גבוה. פוזיד טבליות עוזרת לכליות להיפטר מעודף המים שלא נדרשים בגוף.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל, furosemide, לסולפונאמידים אחרים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- אתה סובל מליקוי חמור בכליות המונע מהן לתפקד כראוי ולייצר שתן.
- אתה סובל מאי ספיקת כליות הנובעת מתרופות או מכימיקלים הנוטים לגרום לנזק כליתי או לנזק לכבד או אם יש לך אי ספיקת כליות כתוצאה מהפרעות שמקורן בכבד.
- יש לך רמות נמוכות מאוד בדם של אשלגן, נתרן או של אלקטרוליטים אחרים או תת-נפח דם (הרופא יוכל ליעיץ לך).
- אתה מיובש.
- יש לך חם דם נמוך.
- אתה נוטל תוספי אשלגן או משתנים שומרי אשלגן לטיפול בלחץ דם גבוה (כגון אמילוריד או ספירינולקטון).
- יש לך שינוי ברמות ההכרה ותדרמת כתוצאה **משחמת הכבד** (עייפות, חולשה, אצירת מים, בחילות או הקאות, ירידה במשקל או בתיאבון, הצהבה של העור או העיניים, גרד) או כתוצאה **מאנצפולופתיה כבדית** (בלבול, שינוי ברמות ההכרה ותדרמת כתוצאה מכשל כבדי).
- יש לך מחלת אדיסון (רמות נמוכות של הורמוני קורטיקוסטרואידים מופרשים).
- יש לך הרעלת דיגיטליס (בחילות או הקאות, רמות גבוהות של אשלגן בדם, קצב לב איטי, מהיר או לא סדיר).
- את מניקה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול פוזיד טבליות, ספר לרופא אם:

- אתה סובל מתת-נפח דם (hypovolaemia).
- אתה בסיכון לפתח לחץ דם נמוך או כאשר מדובר בפגים כיוון שהם עלולים יותר להיות בעלי טיהה לפתח אבנים בכליות.
- יש לך גודש בכבד (זרימת דם איטית דרך כלי הדם) או בעיות כבד אחרות.
- יש לך בעיות כליה או שיש לך רמות נמוכות של חלבונים בדם (תת-חלבון בדם – hypoproteinaemia) כתוצאה מליקוי כליתי.
- יש לך בעיות חריגות בדם.
- יש לך או יכול להיות שיש לך סוכרת. אם אתה נוטל אינסולין, ייתכן שהרופא יצטרך להתאים את מינון האינסולין שלך.
- אתה חקשיש, אם אתה נוטל תרופות אחרות העלולות לגרום לירידה של לחץ הדם ואם יש לך מצבים רפואיים אחרים המעמידים אותך בסיכון לירידה בלחץ הדם.
- אתה סובל מלחץ דם נמוך או מרגיש סחרחורת כאשר אתה נעמד.
- אתה מרגיש סחרחורת או מיובש. זה יכול לקרות אם איבדת כמות גדולה של מים בגלל הקאה, שלשול או מתן שתן בתדירות גבוהה מאוד. זה יכול להתרחש גם אם אתה מתקשה לשתות או לאכול.
- יש לך רמות נמוכות בדם של מינרלים חיוניים כמו נתרן או אשלגן או שיש לך חוסר איזון בסיס-חומצה בגוף שזוהה בבדיקות דם.
- אתה סובל מבעיות בערמונית (פרוסטטה) כלומר הגדלה של בלוטת הערמונית (לגברים בלבד) או שיש לך קושי במתן שתן.
- אתה עומד לעבור בדיקת סוכר (גלוקוז).
- אתה סובל משיגדון (גאוס – מאופיינת במפרקים כואבים עקב עליה ברמות של חומצת שתן).
- אתה עומד לעבור בדיקות דם או שתן.
- יש לך רמות מוגברות של סידן או רמות נמוכות של מגנזיום בדם; מומלץ ניטור קפדני של נוזלים ורמות אלקטרוליטים.
- אתה כבר מטופל בתרופות כמו נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) – לטיפול בדלקת וכואב) או מעכבי ACE (תרופות המשמשות להורדת לחץ דם).

בדיקות ומעקב

במשך תקופת נטילת תרופה זו ייתכן שהרופא ינטר את מצבך ויפנה אותך לבדיקות דם.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות ההקראות מעכבי ACE (כגון רפימריל, אנלפריל, פרינדופריל) או חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין II (כגון לוסרטן, קאנדסארטאן, אירבסארטאן). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המנה של התרופה שלך או לבקש ממך להפסיק את נטילתה.
- אליסקירן – לטיפול ביתר לחץ דם
- ניטור להורדת לחץ דם כמו מעכבי רנין, חוסמי אלפא (כגון פראזוסין), תרופות משתנות (כגון אמילוריד, ספירנולקטון), פנותיאזינים (כגון פרומטאזין)
- תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב מסוג חוסמי בטא (כגון סוטלול, אתנולול, פרופרנולול)
- תרופות כמו נוגדי דיכאון טריציקליים (כגון אמיריפטילין), מעכבי מונואמיני אוקסידאז (MAOIs) (כגון סגלילין) או תרופות היפנוטיות ונוגדות חרדה (כגון ברביטואטים)
- תרופות להורדת לחץ דם או לבעיות לבלביות (קצב לב לא סדיר) כמו חוסמי תעלות סידן, חוסמי בטא, קלונדין, מוקסונידין, ניטרופרוסיד סודיום, אמילודין, דיספירקמיר, פלקזיניד, מינוקסידיל, לידוקאין, הידראלאזין, דיאזוקסיד, מתילדופה
- דיגוקסין המשמש לטיפול באי ספיקת לב. ייתכן שהרופא יצטרך לשנות את מינון התרופה
- ליתיום – לטיפול במחלות נפשיות
- סוכראלפאט – תרופה זו עלולה להפחית את הספיגה של פוזיד.
- כולסטרילאמיני או כולסטיטול לטיפול בכולסטרול גבוה
- תרופות נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) – תרופות לטיפול בכאב ודלקת (כגון איבופרופן, נפרוקסן, אינדומתאצין, קטורולאק) או סיליולאטים (כגון אספירין)
- אנטיביוטיקות המשתייכות למשפחת האימינוגליקוזידים או הפולימיקסינים מכיוון שעלול להיות סיכון לנזק לאזניים או לכליות (כגון צפקלור, גנטאמיצין, ונקמיצין)
- אמפוטריצין (לטיפול בזיהומים פטרייתיים)
- תרופות לטיפול באפילפסיה (נוגדי פרכוסים כגון קרבמזפין, פניטואין)
- נוגדי פטריות (סיכון לאובדן אשלגן או לנזק כליתי המתואר בשילוב עם פורוסמיד)
- תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים הנגרמים על-ידי וירוס, כגון ריטובויר

- תרופות המשמשות לטיפול בדלקת, המכונות קורטיקוסטרואידים כגון פרדניזולון, דקסמתזון
- תרופות או מוצרי מזון המכילים ליקריץ (סיכון מוגבר לאובדן אשלגן בשילוב עם פורוסמיד)
- ציספלאטיין – לטיפול בסרטן (סיכון מוגבר לנזק לכליות בשילוב עם פורוסמיד)
- מתוטריאסט – סיכוי מוגבר לרעילות של פורוסמיד
- לבדופנה – לטיפול במחלת פרקינסון (סיכון מוגבר להורדת לחץ דם בשילוב עם פורוסמיד)
- תרופות לדיכוי מערכת החיסון (כגון ציקלוספורין)
- תרופות המשמשות כמרפי שרירים כגון באקלופן או טיזאנידין
- גלולות למניעת היריון או תרופות המכילות אסטרגון עלולות לחסום את השפעת פורוסמיד אם נלקחות בו זמנית
- תרופות כגון אלפרוסטדיל, לטיפול בכשל זקפתי (אין אונות – אימפוטנציה)

- תיאופילין למניע בצפצופים וקושי בנשימה
- פרובנסיד לטיפול שיגדון (גאוס)
- תרופות המשמשות להרדמה כללית
- תרופות משלשלות – משמשות להקלה על עצירות
- תרופות לסוכרת (כגון אינסולין). ייתכן ירידה ביעילות כאשר אתה נוטל פוזיד טבליות
- תרופות לטיפול בבעיות נפשיות המכונות 'פסיכזות' כגון ריספרידון, אמיסולפריד, פימוזיד, או כלורפרומאזין. יש להימנע משימוש בפימוזיד בו זמנית עם פוזיד טבליות
- תרופות לטיפול באסטמה כאשר ניתנות במינונים גבוהים
- תרופות משתנות אחרות כגון בנדרופלומינתיאזיד. ייתכן שהרופא יצטרך לשנות את המינון של התרופה שלך.
- מלחי אשלגן המשמשים לטיפול ברמת אשלגן נמוכה בדם

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

עליך להימנע משתיית אלכוהול כאשר אתה נוטל פוזיד טבליות כיוון שזה עשוי לגרום לירידה נוספת בלחץ הדם שלך.

היריון והנקה

יש להיוועץ ברופא לפני שאת נוטלת פוזיד טבליות אם הינך בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת ללדת בתינוך.

הבריץ

אין ליטול טבליות פוזיד אם את בהיריון, אלא אם נאמר לך אחרת על-ידי הרופא שלך.

הנקה

אין להניק אם את נוטלת פוזיד טבליות. זאת כיוון שכמויות קטנות עלולות לעבור לתוך חלב האם.

נהיגה ושימוש במכוונת

בחלק מהמטופלים פוזיד טבליות עלולה לגרום לסחרחורת או להיות פחות ערייתים דבר שיכול להפריע ליכולת לנהוג או להפעיל מכוונת. אם אתה חש פחות ערני מבדרך-כלל, אל תנהג או תפעיל מכוונת והתייעץ עם הרופא שלך.

פוזיד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פוזיד טבליות מכיל לקטוז (סוכר חלב). אם נאמר לך על-ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא המטפל לפני נטילת תרופה זו. ראה גם סעיף 6 – "מידע נוסף".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

על השימוש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

יש להישמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא ואופן הטיפול בתכשיר.

מינון

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

הרופא יתאים את המינון לכל חולה בהתאם למצבו ותגובתו של המטופל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש

אין מידע לגבי כתישה/לעיסה של הטבליה.

ניתן לחצות את הטבליה בקו החציה.

יש לבלוע את הטבליות עם מעט מים.

ניתן ליטול את התרופה עם אוכל.

אם נוטל בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לאחד מייון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמינים של מינון יתר כוללים התייבשות ושינויים ברמות של חומרים מסוימים בדם.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, קח את המנה הבאה מיד כשנזכרת וזא קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שכחחת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תותיות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפוזיד טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא או לבית החולים אם יש לך אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

- תגובה אלרגית חמורה העשויה לכלול גירוד, פריחה עורית עם גירוד חמור וסרפדת, חום, רגישות לאור, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון או קושי נשימה או בליעה
- שלפוחיות או קילוף של העור מסביב לשפתיים, לעיניים, לפה, לאף ולאיברי המין, תסמינים דמויי שפעת וחום יכולים להוות מצב הנקרא נמק אפידרמלי רעילי (toxic epidermal necrolysis)
- דלקת של כלי דם (vasculitis, העלולה לגרום לפריחה, חום וכאבי מפרקים או שרירים) או דלקת כליה העלולה לשנות את מספר הפעמים שאתה מטיל שתן או שאתה עלול לראות דם בשתן. ייתכן שיהיה לך חום, תחוש נמנום, או תבחין בנפיחות, למשל, של הקרסול
- כתמים אדומים על העור, כאבי פרקים ו/או דלקת בעיניים, 'פוסטולוזיס תפרחתית מפושטת חדה (AGEP)' (פריחה מושרית מתרופה – (אלרגית) המלווה בחום ושלפוחיות על העור/קילוף של העור וכתמים זעירים מדימום בעור
- דלקת פתאומית של הלבלב מלווה בכאב חמור בבטן העליונה או המקרין לכיוון הגב
- כל חבורה או דימום בלתי מוסברים, חום, כאב גרון, כיבים בפה. זה יכול להיות סימן לספירת דם נמוכה, ארגנולוציטוזיס
- ספירת דם לא תקינה (ירידה בתאי דם לבנים) המלווה ברגישות מוגברת לזיהום
- אנמיה אפלטטית (מצב המאופיין בירידה בתאי דם אדומים)
- סימנים לדלקת בכליות לדוגמה כאבים בצדדים, דם בשתן
- הלם (ירידה חמורה בלחץ הדם, חיוורון קיצוני, אי שקט, דופק חלש ומהיר, עור לח, פגיעה בהכרה) כתוצאה מהתרחבות חמורה ופתאומית של כלי הדם עקב אלרגיה לחומרים מסוימים
- הפרעה פסיכיאטרית
- שינויים בכבד הגורמים להצהבה של העור או של לובן העיניים
- קריש דם (גורם לכאב, נפיחות או רגישות ברגליים)

תופעות לוואי נוספות

עליך לדווח לרופא או לרוקח אם הבחנת באחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (מופיעות ביותר ממשמש אחד מתוך 10 משתמשים):

- התייבשות, שינוי במאזן של נוזלים וחומרים בגוף (כגון נתרן, אשלגן, כלור, סידן ומגנזיום) הגורם ליובש בפה, לחולשה, לעייפות או נמנום, לאי-שקט, לעווייתות, לכאבים, חולשה או התכווציות של השרירים, ללחץ דם נמוך הגורם לירידה בריכוז ולתגובות מאוטות, לקושי במתן שתן, לקצב לב מהיר או לא סדיר, לבחילה ולהקאות
- תופעות לוואי שכיחות (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים):**
 - תת-נפח דם (hypovolaemia)
 - עלייה בערכי קריאטינין ושתנן (אוריאה) בדם (נראה בבדיקות דם)
- תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים):**
 - שינויים בראייה הכוללים ראייה מטושטשת או צהובה
 - שינויים בגוף הנראים בבדיקות כגון רמות גלוקוז או רמות חומצה אורית רמות בדם של חלק מהשומנים (כולסטרול וטריגליצרידים) עשיות לעלות, אך בדרך-כלל חוזרות לרמות תקינות תוך 6 חודשים
 - שיגדון (גאוס)
 - קצב לב לא סדיר
 - התכווציות או חולשת שרירים
 - שינויים בכמות השתן או בצורך להשתין
 - ייצור השתן עלול להיפסק בפתאומית, אם יש לך הפרעה בשלפוחית השתן, בלוטת ערמונית מוגדלת או היצרות של השופכנים
 - ירידה בלחץ דם הגורמת לפגיעה בריכוז ובתגובות, הרגשת סיחור, תחושות של לחץ בראש, כאב ראש, סחרחורת, נמנום, הרגשת חולשה, שינויים בראייה, יובש בפה וחוסר יכולת לעמוד זקוף
- רגישות לאור (פוטוסנסטיביות)
- הרגשת עייפות
- יובש בפה, צמא, הפרעות בעמי כגון שלשול, עצירות, בחילה או הקאות
- בעיות שמיעה כגון 'צלצולים באוזניים', חירשות (לפעמים בלתי הפיך)

תופעות לוואי נדירות (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים):

- עלייה בתאים מסויימים בדם (אאוזינופילים)
- עלייה באנזימי כבד מסויימים
- תחושת נמלול ודקרוך, תחושת גירוד או עקצוץ בעור
- בלבול, כאב ראש, סחרחורת, עייפות, תחושה כללית לא טובה, חום
- ייצור שתן מוגבר עלול להתרחש או להחמיר, אם יש לך חסימה בדרכי השתן
- פריחות עוריות כולל גרד

תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים):

תנועות לא רצוניות של השריר

- תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):**
 - חמצת מטבולית המאופיינת בכאבי חזה, דופק לא סדיר, כאב ראש, תחושת בחילה, הקאות, כאב בטן, שינוי בתיאבון ועלייה במשקל, חולשת שרירים, כאבי עצמות מפרקים
 - ירידה ברמות אשלגן בגוף (חסר אשלגן) המאופיינת בחולשת שרירים וחוסר יכולת לכווץ שריר אחד או יותר (שיתוק), הפרשה מוגברת של שתן ובעיות לב
 - מופעים שונים של דלקת עור (דרמטיטיס) כולל פריחה אלרגית (אורטיקריה), נגעים שלפוחיתיים, אריתמה מולטיפורמה (erythema multiforme), ארגמנת (פרפורזה – דימומים תת-עוריים), דלקת עור שמלווה בקילוף של העור (exfoliative dermatitis), גרד
- תופעות לוואי נוספות בילדים:**
 - משקעים של מלחי סידן בכליות או מומי לב כגון צינור עורקי פתוח (patent ductus arteriosus) דווחו אצל פגים בעקבות טיפול בפורוסמיד
 - אבנים בכליות בתינוקות
- אם הפיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.** ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הורעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור את התרופה במקום קריר ויבש, מתחת ל-25°C.**
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. מומצים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose, microcrystalline cellulose, starch, crosopvidone, povidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, propylparaben, butylparaben.

כל טבליה מכילה 36 מ"ג לקטוז.

ניצור נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליה לבנה, עגולה ושטוחה עם הטבעה "TEVA" בצד אחד וקו חציה בצידה השני של הטבליה.

גדלי אריזה: 25 טבליות, 30 טבליות, 50 טבליות ו-1,000 טבליות.

ייתכן שלא כל גדלי האריזות משוקים.

שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ,

רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

העלון נערך בספטמבר 2024.

2024
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
020.20.02072

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת,

התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ועלולונים מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, סייקו את הקוד הבא: <p>For further information about the medicine and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:</p> <p></p> <p>40 mg</p> <p>ניתן לפנות לבעל הרישום לקבלת עלון לצרכן מודפס באנגלית בכתובת: Tevacare@med-trix.com או בטלפון: 1-800-805-005 You may contact the license holder for a printed leaflet in English at: Tevacare@med-trix.com or by telephone: 1-800-805-005</p>
