

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986**

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

## فوزيد أقراص

### أقراص

التركيبية

يحتوي كل قرص على:

Furosemide 40 mg

فوروسيميد 40 ملع

**للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر البند 2 – "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 – "معلومات إضافية".**

اقرأ النشرة ب**إمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعمله للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

**الفعالية الطبية**

مدرّ للبول لعلاج الوذمة الرئوية، والوذمة التي ترافق قصورَ القلب وتشمّع الكبد والمرضى الكلوي، ولعلاج ضغط الدم المرتفع.

### الفصيلة العلاجية

أدوية مدرّة للبول.

تعطى هذه الأدوية لعلاج الوذمة، وهي حالة من وجود كمية أكبر من اللازم من الماء في جسمك. يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب مشكلة في القلب، الرئتين، الكليتين، الكبد، الأوعية الدموية أو ضغط الدم المرتفع. يساعد فوزيد أقراص الكليتين على التخلص من فائض الماء الذي لا يحتاجه الجسم.

### 2. قبل استعمال الدواء

**لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة، furosemide، أو لسوفلوناتيميدات أخرى أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 – "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من اختلال شديد في الكليتين يمنعهما من القيام بوظيفتهما كما ينبغي ومن إنتاج البول.
- كنت تعاني من قصور كلوي نابع من أدوية أو مواد كيميائية تميل إلى التسبب بضرر كلوي أو ضرر كيدي أو إذا كنت مصابًا بقصور الكليتين نتيجةً لاضطرابات مصدرها الكبد.
- وُجدت لديك مستويات منخفضة جدًا في الدم للبتواسيوم، الصوديوم أو كهارل (الكتروليتات) أخرى أو نقص حجم الدم (بإمكان الطبيب أن يقدم لك المشورة).
- كنت مصابًا بالتخفاف.
- وُجد لديك ضغط دم منخفض.
- كنت تستعمل إضافات البوتاسيوم أو مدرّات البول المستيقية للبوتاسيوم لعلاج ضغط الدم المرتفع (مثل أميلوريد أو سبيرونولاكتون).
- وُجد لديك تغير في مستويات الوعي وغيبوبة نتيجةً ل*تشمّع الكبد* (تعب، ضعف، احتباس الماء، غثيان أو تقيؤات، انخفاض في الوزن أو في الشهية، اصفرار الجلد أو العينين، حكة) أو نتيجةً **للاعتلال الدماغي الكبدي** (ارتباك، تغيرٌ في مستويات الوعي وغيبوبة نتيجة للفشل الكبدي).
- كنت مصابًا بمرض أديسون (مستويات منخفضة لهرمونات الكورتيكوستيرويدات المفوّزة).
- وُجد لديك تسّم من الديجيتاليس (غثيان أو تقيؤات، مستويات مرتفعة للبوتاسيوم في الدم، نظم قلبي بطيء، سريع أو غير منظم).
- كنت مرضعًا.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**

**قبل العلاج بفوزيد أقراص، أخبر الطبيب إذا:**

- كنت تعاني من نقص حجم الدم (hypovolaemia).
- كنت مرضعًا لخطر نشوء ضغط دم منخفض أو إذا كان الحديث يدور عن أطفال خدّج لأنهم قد يكونون أكثر ميلًا لنشوء حصوات الكلى.
- وُجد لديك احتقان في الكبد (حريان دموي بطيء عبر الأوعية الدموية) أو مشاكل أخرى في الكبد.
- وُجدت لديك مشاكل في الكلية أو أن لديك مستويات بروتينات منخفضة في الدم (نقص بروتين الدم – hypoproteinaemia) نتيجةً لخّلل كلوي.
- وُجدت لديك مشاكل شادة في الدم.
- وُجد لديك أو يُحتمل أن لديك سكري. إذا كنت تستعمل الإنسولين، فقد يضطر الطبيب إلى تعديل جرعة الإنسولين الخاصة بك.
- كنت مسنًا، إذا كنت تستعمل أدوية أخرى من شأنها أن تسبب انخفاض ضغط الدم وإذا وُجدت لديك حالات طبية أخرى تعرّضك لخطر انخفاض ضغط الدم.
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو تشعر بالدوار عندما تقف.
- كنت تشعر بالدوار أو بالتخفاف. يمكن أن يحدث ذلك إذا قدّدت كمية كبيرة من الماء بسبب التقيؤ أو الإسهال أو التبول بوتيرة عالية جدًا. يمكن أن يحدث ذلك أيضًا إذا كنت تتسبّعب الشرب أو الأكل.
- وُجدت لديك مستويات منخفضة في الدم لمعادن حيوية مثل الصوديوم أو البوتاسيوم أو أن لديك نقصًا في توازن القاعدة-الحمض في الجسم، تم الكشف عنه في فحوص الدم.
- كنت تعاني من مشاكل في غدة البروستاتا، أي تضخّم غدة البروستاتا (خاص بالرجال فقط) أو أنك تواجه صعوبة في التبول.
- كنت على وشك الخضوع لفحص السكر (الجلوكوز).
- كنت تعاني من النقرس (حجوات – يتميز بمفاصل مؤلمة بسبب ارتفاع مستويات حمض البول).
- كنت على وشك الخضوع لفحوص الدم أو البول.
- وُجدت لديك مستويات كالسيوم متزايدة أو مستويات مغنيزيوم منخفضة في الدم؛ يوصى بمراقبة مشددة للسوائل ومستويات الكهارل.
- كنت تتلقى الإن علاجًا بأدوية مثل مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs – علاج الالتهاب والألم) أو مثبطات ACE (أدوية تستعمل لخفض ضغط الدم).

**الفحوص والمتابعة**

طيلة فترة استعمال هذا الدواء يُحتمل أن يراقب الطبيب وضعك ويحكك إلى فحوص للدم.

### التفاعلات بين الأدوية

**إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك**. خاصة إذا كنت تستعمل:

- أدوية تسمى مثبطات ACE (مثل رامبيرييل، إينالابريل، بيريندوبريل) أو حاصرات مستقبل الانجيوتنسين II (مثل لوسارتان، كانديسارتان، اربيسارتان). قد يضطر طبيبك إلى تغيير جرعة دوائك أو يطلب منك أن تتوقف عن استعماله.
- الليسكريين – لعلاج فرط ضغط الدم
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل مثبطات الرينين، حاصرات ألفا (مثل برازوسين)، أدوية مدرّة للبول (مثل أميلوريد، سبيرونولاكتون)، فينوثيازينات (مثل بروميثازين)
- أدوية لعلاج اضطرابات نظم القلب من نوع حاصرات بيتا (مثل سوتالول، أتينولول، بروبرانولول)
- أدوية مثل مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات (مثل أميتريبتيلين)، مثبطات مونو أمين أوكسيداز (MAOIs) (مثل سيليجيلين) أو أدوية تنويمية ومضادة للتلق (مثل الباربيتورات)
- أدوية لخفض ضغط الدم أو للمشاكل القلبية (نظم قلبي غير منظم) مثل حاصرات قنوات الكالسيوم، حاصرات بيتا، كلونيدين، موسكونيدين، نيتروبروسيد الصوديوم، أمبودارون، ديسوبيراميد، فليكابنيد، مينوكسيديل، ليدوكائين، هيدرالازين، ديازوكسيد، ميثيل دوبا
- ديجوكسين المستعمل لعلاج قصور القلب. قد يضطر الطبيب إلى تغيير الجرعة الدوائية ليثيوم – لعلاج الأمراض النفسية
- سوكرالفات – هذا الدواء قد يقلّل امتصاص فوزيد.
- كوليستيرامين أو كوليستيپول لعلاج الكوليسترول المرتفع
- أدوية مضادة للالتهاب لاسيترويدية (NSAIDs) – أدوية لعلاج الألم والالتهاب (مثل إيبوبروفين، نابروكسين، إندوميثاسين، كيتورولاك) أو الساليسيلات (مثل الأسبيرين)
- مضادات حيوية تنتمي إلى فصيلة الأمينوجليكوزيدات أو البوليبيميسينات لأنه قد يكون هناك خطر لضرر في الأذنين أو الكليتين (مثل سيفاكلور، جينتاميسين، فانكوميسين)
- أموغوتريپسين (للعلاج للثلاوثات الظطرية)
- أدوية لعلاج الصرع (مضادات الاختلاجات مثل كاربامازيبين، فينيتونين)
- مضادات الفطريات (خطر فقدان البوتاسيوم أو التضمر الكلوي الموصوف عند الدمج مع فوروسيميد)
- أدوية تستعمل لعلاج الثلاوثات الناجمة عن فيروس، مثل ريتونافير

- أدوية تستعمل لعلاج الالتهاب، تسمى الكورتيكوستيرويدات مثل بريدنيزولون، ديكساميثازون
- أدوية أو منتجات غذائية تحتوي على عرقسوس (خطر متزايد لفقدان البوتاسيوم عند الدمج مع فوروسيميد)
- سيسبيلاتين – لعلاج السرطان (خطر متزايد لتضمر الكليتين عند الدمج مع فوروسيميد)
- ميثوتريكسات – تزايد احتمال نشوء سُمّية من فوروسيميد
- ليفودوبا – لعلاج مرض الباركنسون (خطر متزايد لخفض ضغط الدم عند الدمج مع فوروسيميد)
- أدوية لكبت الجهاز المناعي (مثل سيكلوسبورين)
- أدوية تستعمل كمرخية للعضلات مثل باكوفين أو تيزانيدين
- حبوب منع الحمل أو الأدوية التي تحتوي على إستروجين قد تعيق تأثير فوروسيميد إذا استُعملت بشكل متزامن
- أدوية مثل البروستايدل، لعلاج الفشل الانتصابي (الضعف الجنسي – العنة)
- ثيوفيلين لعلاج الأربيز التنفسي والصعوبة في التنفس
- بروبينيسيد لمنع النقرس (حجوات)
- أدوية تستعمل للتخدير العام
- أدوية مُسبّلة – تستعمل للتخفيف من الإمساك
- أدوية للسكري (مثل إنسولين). يُحتمل أن يطرأ انخفاض على الفعالية عندما تستعمل فوزيد أقراص
- أدوية لعلاج المشاكل النفسية المسماة "الذهان" مثل ريسبيريدون، أميسولبريد، بيموزيد، أو كلوربرومازين. يجب الامتناع عن استعمال بيموزيد بالتزامن مع فوزيد أقراص
- أدوية لعلاج الربو عندما تعطى بجرعات عالية
- أدوية أخرى مدرّة للبول مثل بيندروفلوميثازيد. قد يضطر الطبيب إلى تغيير جرعة دوائك.

- أملاح البوتاسيوم المستعملة لعلاج المستوى المنخفض للبوتاسيوم في الدم

### استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع الطعام.

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يجب عليك الامتناع عن شرب الكحول عند استعمالك لفوزيد أقراص لأن ذلك قد يسبب انخفاضًا إضافيًا في ضغط دمك.

### الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب قبل أن تستعملي فوزيد أقراص إذا كنت حاملًا أو مرضعًا، أو تظنين أنك حامل، أو تخططين لإنجاب طفل.

### الحمل واستعمال الماكينات

لا يجوز استعمال أقراص فوزيد إذا كنت حاملًا، إلا إذا أخبرك طبيبك بغير ذلك.

### الإرضاع

لا يجوز الإرضاع إذا كنت تستعملين فوزيد أقراص. ذلك لأن كميات صغيرة قد تنتقل إلى داخل حليب الأم.

### السياقة واستعمال الماكينات

قد يسبب فوزيد أقراص دوارًا لدى بعض متلقي العلاج أو يجعلهم أقل تيقظًا، الشيء الذي يمكن أن يشوش على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات. إذا أحسست بأنك أقل تيقظًا من المعتاد فلا تُقُد السيارة أو تُشغّل الماكينات واستشر طبيبك.

### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي فوزيد أقراص على اللاكتوز (سكر الحليب). إذا أخبرك طبيب بأن لديك عدم التحمل لسكريات معينة، فاقصّل بالطبيب الكانديس قبل استعمال هذا الدواء. انظر أيضًا البند 6 – "معلومات إضافية".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

### الجرعة الدوائية

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددها الطبيب فقط.

سيلائم الطبيب الجرعة الدوائية لكل مريض وفقًا لحالة متلقي العلاج واستجابته.

**يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

### كيفية الاستعمال

لا تتوفر معلومات عن هرس/ مضغ القرص.

يمكن شطر القرص في خط الشطر.

يجب بلع الأقراص مع القليل من الماء.

يمكن تناول الدواء مع الطعام.

**إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أعلى**

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. تشتمّل أعراض فرط الجرعة الدوائية على تجفاف وتغيرات في مستويات مواد معينة في الدم.

**إذا نسيت تناول الدواء**

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناول الجرعة القادمة فور تنكّرك ثم تناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة التي نسيتها.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.**

**إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.**

### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال فوزيد أقراص إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

**يجب التوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا وُجد لديك أحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:**

- رد فعل تحسسي خطير قد يشتمل على حكة، طفح جلدي مع حكة شديدة وشرى، حمى، حساسية للضوء، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق أو صعوبة في التنفس أو البلع
- حويصلات أو تقشّر الجلد حول الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية، أعراض شبيهة بالإنفونزا وحمى يمكن أن تشكل حالة تسمى تقشّر الأنسجة المتموتة البثرية (toxic epidermal necrolysis) (تسبب طفحًا جلديًا وحمى والأما في المفاصل التهاب الأوعية الدموية (vasculitis)، قد يسبب طفحًا جلديًا وحمى والأما في المفاصل أو الحصلات) أو التهاب كلوي قد يعجز عدد مرات التبول لديك أو أنك قد ترى دمًا في البول.
- قد تصاب بالحمى، تشنن، تشنن بالعماس، تشنن بالعماس، مثلًا، في الكاحل
- بقع حمراء على الجلد، الألم في المفاصل و/أو التهاب في العينين، "البثر الطفحي المعمم الحاد (AGEP)" (طفح ناجم عن الدواء – acute febrile drug eruption)، الذي يتميز برد فعل خطير حاد (تحسسي) مصحوب بالحمى والحويصلات على الجلد/ تقشّر الجلد ويقع صغيرة جدًا ناجمة عن زيف دموي في الجلد
- التهاب فجائي في البنكرياس مصحوب بالألم شديد في الجزء العلوي من البطن أو يشع نحو الظهر
- أي كدمة أو نزيف دموي لا يبرر لهما، حمى، ألم في الحلق، قروح في الفم. يمكن أن يكون ذلك علامة لعدّ دموي منخفض، ندرة المحيبات
- عدّ دموي غير سليم (انخفاض في خلايا الدم البيضاء) مصحوب بحساسية متزايدة للتلوث
- فقر الدم اللاتسّجي (حالة تتميز بانخفاض في خلايا الدم الحمراء)
- علامات التهاب في الكلتين، مثل الألم في الجانبين، دم في البول
- صدمة (انخفاض شديد في ضغط الدم، شحوب شديد، هياج (عدم الهدوء)، نبض ضعيف وسريع، جلد رطب، تضمر الوعي) نتيجةً لتوسّع خطير وفجائي في الأوعية الدموية بسبب الحساسية لمواد معينة
- اضطراب نفسي
- تغيرات في الكبد تسبب اصفرار الجلد أو بياض العينين
- خثرة دموية (تسبب الألم أو الانتفاخ أو الحساسية في الرجلين)

### أعراض جانبية إضافية

**عليك إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا لاحظت أحد الأعراض الجانبية التالية:**

- أعراض جانبية شائعة جدًا (تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين 10 مستعملين):**
- تخفاف، تغير في توازن السوائل والمواد في الجسم (مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكور، الكالسيوم والمغنيزيوم) مما يسبب جفافًا في الفم، ضعفًا، تعبًا أو نعاسًا، عدم انخفاض التركيز وتباطؤ ردود الفعل، صعوبة في التبول، وتيرة قلب سريعة أو غير منتظمة، غثيانًا أو تقيؤات

**أعراض جانبية شائعة عند مستعمل واحد كحد أقصى من بين 10 مستعملين:**

- نقص حجم الدم (hypovolaemia)
- ارتفاع في قيم الكرياتينين والبولة (اليوريا) في الدم (يشاهد في فحوص الدم)
- أعراض جانبية غير شائعة (تظهر عند مستعمل واحد كحد أقصى من بين 100 مستعمل):**
- تغيرات في الرؤية تشتمل على رؤية مشوشة أو صفراء
- تغيرات في الجسم تظهر في الفحوص مثل مستويات الجلوكوز أو مستويات حمض اليوريك
- قد ترتفع مستويات بعض الدهنيات في الدم (الكوليسترول والجليسيريدات الثلاثية)، لكنها تعود عادة إلى مستوياتها الطبيعية خلال 6 أشهر
- نقرس (حجوات)
- نظم قلبي غير منظم
- تقلصات أو ضعف العضلات
- تغيرات في كمية البول أو في الحاجة إلى التبول
- قد يتوقف إنتاج البول بشكل فجائي، إذا وُجد لديك اضطراب في المثانة البولية، تضخّم غدة البروستاتا أو تضيق الحالبين
- انخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى تضمر التركيز وردود الفعل، شعور بالدوار، أحاسيس من الضغط في الرأس، صداع، دوام، نعاس، شعور بالضعف، تغيرات في الرؤية، جفاف في الفم وعدم القدرة على الوقوف منتصب، ضغط دم منخفضًا بسبب حساسية للضوء (تحسّس ضوئي)
- شعور بالتعب

جفاف في الفم، عطش، اضطرابات في الأمعاء مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان أو التقيؤات

- مشاكل في السمع مثل "طنين في الأذنين"، صمم (أحيانًا غير قابل للانعكاس)
- أعراض جانبية نادرة (تظهر عند مستعمل واحد كحد أقصى من بين 1,000 مستعمل):**
- ارتفاع في خلايا معينة في الدم (اليوريتيات)
- ارتفاع في إنزيمات معينة في الكبد
- إحساس بالتمثيل والنخر، إحساس بالحكة أو الوخز في الجلد
- ارتباك، صداع، دوام، تعب، شعور عام غير جيد (توعلك)، حمى
- قد يحدث تزايد في إنتاج البول أو قد يتعاقم، إذا وُجد لديك انسداد في المسالك البولية
- طفوح جلدية تشتمل الحكة

**أعراض جانبية نادرة جدًا (تظهر عند مستعمل واحد كحد أقصى من بين 10,000 مستعمل):**

- حركات عضلية لا إرادية

**أعراض جانبية مدى شوبعا غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شوبوعها بعد):**

- حماض استقلابي يتميز بالألم في الصدر، نبض غير منتظم، صداع، إحساس بالغثيان، تقيؤات، آلام البطن، تغير في الشهية وارتفاع الوزن، ضعف العضلات، آلام في العظام والمفاصل
- انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم (نقص البوتاسيوم) والذي يتميز بضعف العضلات وعدم القدرة على تقليص عضلة واحدة أو أكثر (شلل)، إفراز متزايد للبول ومشاكل في القلب
- اشكال مختلفة من الالتهاب الجلدي (ديرماتيتيس) بما في ذلك طفح جلدي تحسسي (شرى)، آفات فقاغية، حماسي متعددة الأشكال (erythema multiforme)، فرقرية (يوربورا – حالات زيف دموي تحت الجلد)، التهاب جلدي مصحوب بتقشّر الجلد (exfoliative dermatitis)، حكة

**أعراض جانبية أخرى لدى الأولاد:**

- تم الإبلاغ عن ترسّبات من أملاح الكالسيوم في الكليتين أو عيوب في القلب مثل القناة الشريانية السالكة (patent ductus arteriosus) لدى الخدّج في أعقاب العلاج بفوروسيميد
- فحوصات في الكليتين لدى الأطفال الرضع
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفقّم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**
- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عنب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يُحفظ الدواء في مكان بارد وجاف، فيما دون 25°C.**
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:**

Lactose, microcrystalline cellulose, starch, crospovidone, povidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, propylparaben, butylparaben.

يحتوي كل قرص على 36 ملغ من اللاكتوز.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:**

القرص أبيض، مستدير ومسطح، على أحد جانبيه مطبوع "TEVA" وعلى الجانب الآخر من القرص خط للشطر.

أحجام العبوة: 25 قرصًا، 30 قرصًا، 50 قرصًا و-1,000 قرص.

قد لا تسوّق جميع أحجام العبوات.

**اسم صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه:**

تيفع إسرائيل لم.ض. شارع دفرًا هانفيّنا 124، تل أبيب 6944020.

تم تسجيل النشرة في **أيلول/سبتمبر 2024**.

رقم تسجيل الدواء في **سجّل الأدوية الرسمي** في وزارة الصحة: 020.20.20472
من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

<p>لعزيد من المعلومات عن المستحضر وللاطلاع على النشرات المحدثّة باللغة العربية، العربية والإنجليزية، امسحوا الرمز التالي:</p> <p><b>For further information about the medicine and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:</b></p>  <p><b>40 mg</b></p> <p>يمكن التوجّه إلى صاحب الامتياز للحصول على نشرة المستهلك المطبوعة بالإنجليزية على العنوان:</p> <p><b><a href="mailto:Tevacare@med-trix.com">Tevacare@med-trix.com</a> أو على هاتف رقم: 1-800-805-005</b></p> <p><b>You may contact the licensee holder for a printed leaflet in English at: <a href="mailto:tevacare@med-trix.com">tevacare@med-trix.com</a> or by telephone: 1-800-805-005</b></p>
--