نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986
يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

برايد 100 برايد 400
أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:
يحتوي كل قرص مطلي من **برايد 100** على:
أميسولبرايد 100 ملغ - Amisulpride 100 mg
يحتوي كل قرص مطلي من **برايد 400** على:
أميسولبرايد 400 ملغ - Amisulpride 400 mg

لقائمة المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟
الدواء مخصص لعلاج مرض الفُصام.

الفصيلة العلاجية:
ينتمي **برايد** لفصيلة الأدوية المضادة للذهان من مجموعة substituted benzamides.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (أميسولبرايد) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية"). علامات لرد فعل تحسسي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.
- كنت حاملاً أو من شأنك أن تحملي (أنظري الفقرة 2 "الحَمل، الإرضاع والخصوبة").
- كنت تعاني من سرطان الثدي أو من ورم متعلق بالپرولاكتين.
- كنت تعاني من ورم في الغدة الكظرية (المسمى ورم القواتم).
- كنت تتناول أدوية قد تغير نظم القلب مثل الأدوية المستعملة للتحكم في نبضات قلبك (أنظر الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تتناول ليڤودوپا، دواء لعلاج مرض الپاركينسون (أنظر الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").
- شُخص لديك ورم في الغدة النخامية.
- كان المتعالج دون عمر 18 سنة.

لا تتناول الدواء إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن واثقاً، إستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول **برايد**.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
قبل العلاج بـ برايد، إحك للطبيب إذا:
- كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- كنت تعاني من مرض الپاركينسون.
- عانيت ذات مرة من إختلاجات (نوبات صرع).
- وجد لديك عدم إنتظام في نظم القلب.
- كنت تعاني من نبض بطيء (دون 55 نبضة في الدقيقة).
- كانت نسب الپوتاسيوم في دمك منخفضة.
- وجدت لديك أو لشخص من عائلتك سابقة لخثرات دموية، لأنه وجدت علاقة بين أدوية مثل **برايد** وتشكل خثرات دموية.
- كنت تعاني من مرض قلبي أو لديك سابقة عائلية لمشاكل في القلب.
- قال لك طبيبك بأنه من الجائز أنك أصبت بسكتة دماغية.
- كنت تعاني من السكري أو قيل لك بأنك معرض لخطورة زائدة للإصابة بالسكري.
- كنت مسناً، لأنه يوجد إحتمال أكبر لدى المسنين بأن يتطور لديهم إنخفاض في ضغط الدم أو الشعور بميل للنوم.
- كنت مسناً ويوجد لديك خرف.
- لديك أو لدى شخص آخر من عائلتك سابقة لسرطان الثدي.
- لديك نسب مرتفعة من البرولاكتين، وهو هورمون يُنتج في الغدة النخامية.

بُلّغ عن مشاكل خطيرة في الكبد عند تناول **برايد**. **توجه إلى الطبيب على الفور** إذا شعرت بإنهاك، فقدان الشهية للطعام، غثيان، تقيؤات، آلام في البطن أو إذا لاحظت لون أصفر في العينين أو في الجلد.

أثناء العلاج، إذا تطوّر لديك تصلب العضلات أو فقدان العضل المرتبط بآلام في العضلات (إنحلال العضلات المخططة)، تنفس سريع، تعرّق، ضبابية الوعي (نعاس/ميل للنوم) وسخونة غير مبررة - **توقف عن العلاج على الفور وإستشر الطبيب بشكل عاجل** لأن هذه الأعراض هي علامات لمتلازمة نادرة تسمى متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (neuroleptic malignant syndrome) مما قد تؤدي إلى نتيجة مميتة (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت حالة من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، إستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول **برايد**.

الأطفال والمراهقون
الدواء غير مخصص لأطفال ولمراهقين دون عمر 18 سنة، لأنه لم تثبت نجاعة وسلامة إستعمال المستحضر لدى هذه الفئة العمرية.

الفحوص والمتابعة
إن تناول **برايد** قد يؤثر على نتائج فحوص دم معينة، من ضمنها الفحوص التي تقيس الهورمون المسمى پرولاكتين وفحوص الكبد. إذا كنت مقبلاً على إجراء فحوص دم، فمن المهم أن تخبر طبيبك بأنك تتناول **برايد**. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص إستعمال هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
ذلك لأن **برايد** قد يؤثر على عمل أدوية معينة أخرى. كما أن، أدوية معينة قد تؤثر على عمل **برايد**.

بالأخص، لا يجوز تناول برايد وأخبر الطبيب إذا كنت تتناول أي دواء من الأدوية التالية:
- أدوية تستعمل للسيطرة على نبضات القلب لديك مثل كينيدين، ديزوپيراميد، پروكائيناميد، أميودارون وسوتالول.
- بيپريديل، المستعمل لعلاج أمراض القلب.
- سيساپريد، المستعمل لعلاج الحرقان.
- تيوريدازين أو سولتوپريد، المستعملان لعلاج الأمراض النفسية.
- ميثادون، المستعمل لعلاج الألم والإدمان على المستحضرات أفيونية المفعول.
- مضادات حيوية مثل إريتروميسين (يعطى عن طريق الحقن) أو سپارفلوكساسين.
- ڤينكامين (يعطى عن طريق الحقن)، المستعمل لعلاج مشاكل الدورة الدموية في الدماغ.
- هالوفانترين، المستعمل لعلاج الملاريا.
- پنتاميدين، المستعمل لعلاج الالتهاب الرئوي.
- ليڤودوپا، المستعمل لعلاج مرض الپاركينسون.
- كلوزاپين، يُستعمل لعلاج مرض الفصام.

أخبر الطبيب إذا كنت تتناول الأدوية التالية:
- أدوية مستعملة لعلاج الإكتئاب أو لتهدئة الأمراض الإنفعالية والنفسية مثل پيموزيد، هالوپيريدول، إيميپرامين وليثيوم.
- أدوية مستعملة لعلاج إرتفاع ضغط الدم والشقيقة مثل كلونيدين، ديلتيازيم، ڤيراپاميل، چوانفاسين أو ديچيتاليس.
- أدوية قد تخفض نسب الپوتاسيوم. وهذا يشمل مدرات البول مثل بندروفلوميتيازيد أو هيدروكلوروتيازيد، بعض المسّهلات، چلوكوكورتيكوستيروئيدات (تُستعمل لعلاج الربو الشديد ومشاكل الإلتهاب الأخرى)، تيتراكوساكتيد وأمفوتريسين (تُستعمل لعلاج التلوثات الفطرية).
- أدوية مستعملة لعلاج الآلام الشديدة، والتي تسمى مستحضرات أفيونية المفعول، مثل مورفين وپيتيدين.
- مسكنات الآلام مثل ترامادول وإندوميتاسين.
- أدوية تساعدك على النوم مثل باربيتورات وبنزوديازيپينات.
- مواد منوّمة.
- مضادات الهيستامين مثل پروميتازين التي تسبب النعاس.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت حالة من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، إستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول **برايد**.

إستعمال الدواء والطعام
يجب بلع الدواء مع الكثير من الماء قبل وجبة الطعام.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول
لا يجوز شرب الكحول خلال فترة العلاج بالدواء، لأن الكحول قد يلحق الضرر بعمل الدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة
إستشيري الطبيب قبل تناول الدواء إذا كنت في فترة الحمل أو الإرضاع، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل.

الحمل
لا يوصى بإستعمال أقراص **برايد** خلال فترة الحمل ولدى نساء في سن الخصوبة اللواتي لا تستعملن وسائل منع حمل ملائمة. إذا كنت تستعملين أقراص **برايد** خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، فإن رضيعك قد يعاني من عصبية، توتر عضلي متزايد، رجفان خارج عن سيطرة الجسم، ميل للنوم، مشاكل في التنفس أو صعوبات في الإطعام. إستشيري طبيبك إذا تطور لدى رضيعك واحد من تلك الأعراض.

الإرضاع
لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بأقراص **برايد**. تحدثي مع طبيبك عن الطريقة الأفضل لإطعام رضيعك وذلك إذا كنت تتناولين **برايد**.

السياقة وإستعمال الماكنات
قد تشعر بضعف في اليقظة، بنعاس أو بميل للنوم، وقد تعاني من تشوش في الرؤية، عند تناول الدواء. إذا حدث ذلك فلا يجوز السياقة أو إستعمال معدات العمل أو الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوي هذا الدواء على لكتوز (نوع من السكر). إذا قيل لك من قبل طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، إستشره قبل تناول الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
يحتوي هذا الدواء على الصوديوم. يحتوي **برايد** على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) للقرص، وبذلك يعتبر "خالٍ من الصوديوم" (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

3) كيفية إستعمال الدواء؟
يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي
المقدار الدوائي الذي يتوجب عليك تناوله من **برايد** يتعلق بمرضك. يجب الحرص على تطبيق تعليمات الطبيب بالضبط.

الكبار
عادة، إذا كان المقدار الدوائي اليومي هو حتى 400 ملغ، فيجب تناول الدواء مرة في اليوم. إذا كان المقدار الدوائي اليومي أكبر من 400 ملغ، فيجب تقسيم المقدار الدوائي اليومي إلى مرتين في اليوم.

المسنون
يتوجب على طبيبك متابعة حالتك بحرص نظراً لأنك معرض لخطورة أكبر لإنخفاض ضغط الدم أو للميل للنوم جراء تناول هذا الدواء.

أشخاص لديهم مشاكل في الكلى
من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى أن يصف لك مقداراً دوائياً أخفض.

الأطفال والمراهقون
لا يجوز إستعمال هذا الدواء لدى أطفال ومراهقين دون عمر 18 سنة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة التناول
- يجب تناول الدواء عبر الفم.
- يجب بلع الدواء مع الماء. عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات عن سحق أو مضغ القرص.
- يجب تناول الدواء قبل وجبة الطعام.
- إذا شعرت بأن تأثير الدواء أضعف مما ينبغي أو أقوى مما ينبغي، فلا تغير المقدار الدوائي من تلقاء نفسك، إستشر الطبيب.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر
إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. قد تظهر الأعراض التالية: الشعور بعدم راحة أو إرتجاف، تصلب العضلات، الشعور بنعاس أو ميل للنوم الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الوعي.

إذا نسيت تناول الدواء
إذا نسيت تناول مقداراً دوائياً من الدواء، فيجب تناوله حال تذكرك بذلك. لكن إذا قد حان تقريباً موعد تناول المقدار الدوائي التالي، فقم بتفويت المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء
واصل تناول **برايد**، إلى أن يرشدك طبيبك بالتوقف. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إذا تتوقف، فإن مرضك قد يعود أو يتفاقم. لا يجوز التوقف عن تناول **برايد** بشكل مفاجئ، إلا إذا تلقيت تعليمات واضحة من طبيبك. إن التوقف المفاجئ عن الإستعمال قد يؤدي إلى أعراض فطام مثل:
- غثيان أو تقيؤ.
- تعرّق.
- صعوبات في النوم أو الشعور بقلة راحة.
- تصلب العضلات أو حركات جسم شاذة.
- من الجائز عودة أعراض مرضك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية
كما بكل دواء، إن إستعمال **برايد** قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن الإستعمال بـ برايد والتوجه حالاً للطبيب أو للمستشفى إذا:
- كنت تعاني من سخونة مرتفعة، تعرق، تصلب العضلات، نبض سريع، التنفس بسرعة والشعور بإرتباك، نعاس أو عصبية. هذه يمكن أن تكون أعراضاً لعرض جانبي خطير لكنه نادر يسمى متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (neuroleptic malignant syndrome)، وهو إختلاط قد يكون مميتاً.
- لديك نظم قلب شاذ، سريع جداً أو آلام في الصدر، التي قد تؤدي إلى حدوث نوبة قلبية أو إضطراب في القلب الذي يشكل خطراً على الحياة.
- كنت تعاني من آلام أو إنتفاخ في الرجلين، آلام في الصدر أو صعوبات في التنفس. هذه قد تكون أعراضاً لخثرات دموية.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل:
- كنت تعاني من رد فعل تحسسي. العلامات قد تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنتفاخ في الشفتين، في الوجه، الحنجرة أو اللسان.
- قاسيت من إختلاج (نوبة صرع).

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 مستعمل:
- كنت تعاني من تلوثات أكثر تواتراً من المعتاد. قد يحدث هذا بسبب إضطراب في الدم المسمى قلة المحببات أو إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات).
- كنت تعاني من تلوثات أكثر تواتراً مثل سخونة، قشعريرة شديدة، ألم في الحنجرة أو قرحات في الفم. هذه قد تكون علامات لمشكلة في الدم تسمى قلة الكريات البيض.

يجب التوجه للطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مستعملين:
- إرتجاف، تصلب أو تقلصات عضلية، تباطؤ في الحركات، إفراز كثير للعاب أكثر من المعتاد أو الشعور بعدم راحة.

أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين:
- حركات لا إرادية، خاصة للذراعين والرجلين (بالإمكان تقليل هذه الأعراض وذلك إذا يخفض الطبيب الجرعة الدوائية من **برايد** أو يوصف لك دواء إضافي).

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل:
- حركات لا إرادية، خاصة للسان أو الوجه.

أعراض جانبية إضافية تشمل:

أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين:
- صعوبات في النوم (أرق)، الشعور بقلق أو عصبية.
- الشعور بنعاس أو بميل للنوم.
- إمساك، غثيان أو تقيؤ، جفاف في الفم.
- زيادة في الوزن.
- إنتاج شاذ للحليب في الثدي لدى الرجال والنساء، ألم في الثديين.
- توقف الدورة الشهرية.
- تضخم الثديين لدى الرجال.
- صعوبة بلوغ أو الحفاظ على إنتصاب القضيب الذكري أو في قذف السائل المنوي.
- الشعور بدوار (الذي قد ينجم عن إنخفاض ضغط الدم).

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل:
- تباطؤ في نظم القلب.
- إرتفاع السكر في الدم (hyperglycemia).
- إرتفاع ضغط الدم.
- صعوبة التبول.
- الشعور بإرتباك.
- إحتقان في الأنف.
- مشاكل في الكبد.
- قلة العظم (انخفاض كثافة معادن العظام).
- هشاشة العظام، عندما تميل عظامك إلى أن تصبح أكثر تعرضاً للكسر.
- يتطور لديك إلتهاب رئوي نتيجة إستنشاق الطعام، السوائل، اللعاب أو الإفرازات من الأنف (إلتهاب رئوي إستنشاقي).
- إضطرابات في الدم مثل فرط الدهون الثلاثية في الدم (نسب مرتفعة من الدهون الثلاثية في الدم) وفرط كوليستيرول الدم (نسب مرتفعة من الكوليسترول في دمك).

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 مستعمل:
- شرى (hives).
- إنتفاخ تحت الجلد (وذمة وعائية).
- نقص صوديوم الدم (نسب منخفضة لصوديوم الدم لديك).
- الشعور بوعكة، إرتباك أو ضعف عام، غثيان، فقدان الشهية للطعام، الشعور بعصبية. يمكن أن ينجم ذلك عن مرض يسمى متلازمة الإفراز غير الملائم للهورمون المضاد لإدرار البول (SIADH).
- ورم حميد للغدة النخامية (مثل ورم پرولاكتيني).

أعراض جانبية شيوعها غير معروف (أعراض شيوعها لم يحدد بعد):
- متلازمة تململ الساقين (الشعور بإنزعاج في الرجلين الذي يتم تخفيفه مؤقتاً بواسطة الحركة حيث أن أعراضها تتفاقم في نهاية اليوم).
- ضرر لنسيج الكبد.
- تزايد حساسية الجلد للشمس وللضوء فوق البنفسجي.
- سقوطات نتيجة قلة التوازن، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى كسور.
- إنحلال العضلات المخططة (تفكك العضلات المرتبط لألم في العضلات).
- نسب مرتفعة للكرياتينين فوسفوكيناز (فحص دم يشير إلى ضرر في العضل).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
https://sideeffects.health.gov.il
بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم م.ض.".

5) كيفية تخزين الدواء؟
- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

6) معلومات إضافية
يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:
Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Sodium starch glycolate, Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium stearate, Coating blend (white).
يحتوي كل قرص من **برايد 100** على 22.7 ملغ لكتوز مونوهيدرات.
يحتوي كل قرص من **برايد 400** على 90.8 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
برايد معبأ ضمن لويحات (بليسترات) داخل علبة كرتون.
تحتوي العلبة بداخلها 5، 7، 10 ، 14 ، 15 ، 20 أو 30 قرصاً.
من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.
برايد 100 عبارة عن أقراص مطلية مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، لونها أبيض، مع خط للشطر من جانب واحد.
برايد 400 عبارة عن أقراص مطلية بيضوية، محدبة من كلا الجانبين، لونها أبيض، مع خط للشطر من جانب واحد.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض.، ص.ب. 16545 ، تل أبيب، 6116401.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، پارك الصناعة "ماڤو كرمل".

تم إعدادها في آب 2024.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
برايد 100: 155 40 34398 01
برايد 400: 155 41 34416 01

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

لمزيد من المعلومات حول المستحضر والنشرات المحدّثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، قوموا بمسح الكود التالي:
For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:
برايد Pride 100
برايد Pride 400

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني: info@unipharm.co.il
أو على هاتف رقم 03-6135050 .
To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: info@unipharm.co.il or by telephone: 03-6135050.

unipharm אוניפארם