

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
גלפניקול תמיסה וטרינרי, תמיסה למתן במי שתיה לתרנגולות, המכילה פלורפניקול 10%

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון
Florfenicol 10% w/v
לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר- ראו בסעיף 13 "מידע נוסף"

3. למה מיועדת התרופה
לטיפול בזיהומים חיידקיים הרגישים לפלורפניקול בתרנגולות.
קבוצה תרפויטית: תכשיר אנטיביוטי, מקבוצת ה Amphenicols, בעל פעילות רחבת טווח
נגד חיידקים גראם-חיוביים וגראם שליליים.

4. התוויות נגד
אין להשתמש בתרנגולות המטילות ביצי מאכל.
אין לתת לעופות רבייה, התכשיר עלול לגרום לתמותת עוברים וירידה חדה בבקיעה.
אין להשתמש במקרה של רגישות יתר לחומר הפעיל (פלורפניקול).

5. תופעות לוואי
ירידה בצריכת המזון והמים נצפו לאחר שימוש וכן לשלשת רכה (שלשול) אשר נעלמו עם
הפסקת הטיפול.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,
או ע"י כניסה לקישור : [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. חיות מטרה: תרנגולות

7. מינון ואופן המתן
30 מ"ג/ק"ג משקל גוף בנתינה מרוכזת במי השתייה ל 6-8 שעות למשך 3-5 ימים, או על
פי המלצות הרופא הווטרינר המטפל.

8. אופן השימוש בתכשיר
למתן במי השתייה לפי ההוראות בסעיף 7.

9. זמן המתנה- זמן המתנה לשחיטה לבשר: 7 ימים

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
- מחקרי מעבדה עם החומר הבלתי פעיל אן-מתיל-פירולידון (N-methyl pyrrolidone) אשר
בוצעו בחולדות ובארנבות הראו עדות להשפעות רעילות שלו על העובר. על כן הטיפול

בתכשיר לא ינתן על ידי נשים בהריון או נשים החושבות שהן בהריון. כאשר אישה בגיל הפוריות מטפלת בתכשיר, עליה להשתמש בצידוד מגן אישי הכולל כפפות.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : מתחת ל 25°C
- חיי מדף לאחר מיהול במי שתייה: 24 שעות

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר ווטרינרי רפואי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר ווטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם
Propylene glycol, n-methylpyrrolidone
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה- תמיסה צלולה חסרת צבע עד צהבהבה
- גודלי האריזות : 500 מ"ל, 1 ליטר, ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

יצרן ובעל הרישום: ביוואק בע"מ, רחוב האילן 30, אור עקיבא, 3060000

נערך באפריל 2025

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות :

149-46-33423-00