

Вам выдали эту карточку, так как вы уже проходите или вам предстоит лечение препаратом Элрексфио.

Вы должны всегда иметь эту карточку при себе и **предъявлять ее** любому медицинскому работнику, который занимается вашим лечением, а также при обращении в больницу.

Имя пациента: _____

ברטיס זה ניתן לך מכיוון שכבר קיבלת או תקבלי טיפול עם אלרקספיו.

יש לשאת ברטיס זה בכל עת. **הצג ברטיס זה** לכל איש צוות רפואי המעורב בטיפולך, ובעת הגעתך לבית החולים.

שם המטופל: _____



Важная информация о безопасности для пациентов, которые проходят лечение препаратом Элрексфио

Элрексфио может вызывать побочные эффекты, в том числе тяжелые и опасные для жизни, включая синдром высвобождения цитокинов (CRS) - тяжелую иммунную реакцию, которую могут вызывать различные факторы и препараты. Кроме того, Элрексфио может повлиять на нервную систему и вызвать синдром нейротоксичности, связанный с иммунными эффекторными клетками (ICANS).



מידע בטיחותי חשוב למטופלים המקבלים טיפול עם אלרקספיו

אלרקספיו עלולה לגרום לתופעות לוואי אשר עשויות להיות חמורות ומסכנות חיים, כגון תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS), תגובה חיסונית חמורה אשר יכולה להיגרם על ידי גורמים שונים ומגוון תרופות. בנוסף, אלרקספיו עלולה להשפיע על מערכת העצבים, ולגרום לתסמונת רעילות עצבית הקשורה לתאי חיסון אפקטורים (ICANS).

Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, если у вас возникнет **любой** из следующих симптомов:

Синдром высвобождения цитокинов (CRS)	Синдром нейротоксичности, ассоциированной с иммунными эффекторными клетками (ICANS).
<ul style="list-style-type: none"> Повышенная температура (38°C и выше) Затрудненное дыхание Озноб Головная боль Низкое артериальное давление Головокружение Учащенный пульс Высокий уровень печеночных ферментов в крови 	<ul style="list-style-type: none"> Спутанность сознания Ощущение пониженной активности внимания или сонливость Ощущение дезориентации Ослабленное сознание Судороги Затруднения в речи и письме Нарушения памяти Мышечная слабость Онемение или потеря чувствительности

Во время лечения препаратом Элрексфио всегда советуйтесь со своим врачом перед тем, как принимать другие препараты.

Важно: Вас могут попросить оставаться вблизи медучреждения на протяжении первых 48 часов после введения каждой из двух первых доз Элрексфио, чтобы ваш врач мог ежедневно наблюдать за вашими симптомами. Если у вас возникнет **любой** из симптомов, описанных в данной карточке, незамедлительно свяжитесь со своим врачом или обратитесь за неотложной медицинской помощью! Здесь указаны не все возможные побочные эффекты Элрексфио. Сообщите своему врачу, если у вас имеются какие-либо побочные эффекты, которые вас беспокоят или которые не проходят.

פנה מייד לעזרה רפואית אם אתה חווה כל אחד מהתסמינים הבאים:

תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS)	תסמונת רעילות עצבית הקשורה לתאי חיסון אפקטורים (ICANS)
<ul style="list-style-type: none"> חום (38°C ומעלה) קושי בנשימה צמרמורות נאב ראש לחץ דם נמוך סחרחורת זופק מהיר רמות גבוהות של אנזימי כבד בדם 	<ul style="list-style-type: none"> בלבול תחושת ירידה בערנות או ישנוניות הרגשה של חוסר התמצאות ירידה בהכרה פרנוסיה קושי בדיבור או בכתיבה פגיעה בזיכרון חולשת שרירים תחושת נימול או אובדן תחושה

תמיד שאל את הרופא שלך לגבי נטילת תרופות אחרות בזמן שאתה נוטל אלרקספיו.

חשוב לזכור: ייתכן שתבקש להישאר בקרבת מוסד רפואי כדי שהרופא שלך יוכל לעקוב אחר הסימנים והתסמינים מדי יום במשך 48 שעות לאחר מתן כל אחת משתי המנות הראשונות של אלרקספיו. אם הנך חווה תסמין **בלשה** מאלו הרשומים בברטיס זה התקשר לרופא שלך או פנה לקבלת עזרה רפואית דחופה באופן מיידי! אלו לא כל תופעות הלוואי האפשריות של אלרקספיו. ספר לרופא שלך אם יש לך תופעת לוואי כלשהי שמטרידה אותך או שאינה חולפת.

