

תמנח هذه البطاقة لأنك قد حصلت أو سوف تحصل على العلاج بإلركسفيو.

يجب حمل هذه البطاقة معك على الدوام. ابرز هذه البطاقة لكل جهة طبية تشارك في علاجك، وعند وصولك المستشفى.
اسم المتعالج: _____

כרטיס זה ניתן לך מכיוון שכבר קיבלת או תקבלי טיפול עם אלרקספיו.

יש לשאת כרטיס זה בכל עת. **הצג כרטיס זה לכל איש צוות רפואי המעורב בטיפולך**, ובעת הגעתך לבית החולים.
שם המטופל: _____

معلومات سلامة مهمة للمتعالجين الذين يحصلون على العلاج بواسطة إلركسفيو



إلركسفيو قد يسبب أعراضاً جانبية قد تكون خطيرة ومهددة للحياة، مثل متلازمة إفراز السيروتونين (CRS)، وهي رد فعل مناعي حاد يمكن أن يحدث بسبب عوامل مختلفة وعدد من الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر إلركسفيو على الجهاز العصبي، مما يسبب متلازمة السمية العصبية المرتبطة بالخلايا المناعية الفعالة (ICANS).

מידע בטיחותי חשוב למטופלים המקבלים טיפול עם אלרקספיו



אלרקספיו עלולה לגרום לתופעות לוואי אשר עשויות להיות חמורות ומסכנות חיים, כגון תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS), תגובה חיסונית חמורה אשר יכולה להיגרם על ידי גורמים שונים ומגוון תרופות. בנוסף, אלרקספיו עלולה להשפיע על מערכת העצבים, ולגרום לתסמונת רעילות עצבית הקשורה לתאי חיסון אפקטורים (ICANS).

توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية:

متلازمة تسريح السيروتونين (CRS)	متلازمة السمية العصبية المرتبطة بخلايا المناعة الفعالة (ICANS)
<ul style="list-style-type: none"> حمى (38°C وما فوق) صعوبات في التنفس قشعريرة صداع ضغط دم منخفض دوخة نبض سريع مستويات مرتفعة من أنزيمات الكبد في الدم 	<ul style="list-style-type: none"> ارتباك شعور بانخفاض اليقظة أو نعاس شعور بالتوهان تدني الوعي اختلاجات صعوبات في النطق أو الكتابة المس بالذاكرة وهن العضلات شعور بالتنميل أو فقدان الاحساس
<p>اسأل دوما طبيبك بخصوص تناول أدوية أخرى بينما تتناول إلركسفيو.</p>	

פנה מייד לעזרה רפואית אם אתה חווה כל אחד מהתסמינים הבאים:

תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS)	תסמונת רעילות עצבית הקשורה לתאי חיסון אפקטורים (ICANS)
<ul style="list-style-type: none"> חום (38°C ומעלה) קושי בנשימה צמרמורות נאב ראש לחץ דם נמוך סחרחורת זופק מהיר רמות גבוהות של אנזימי כבד בדם 	<ul style="list-style-type: none"> בלבול תחושת ירידה בערנות או ישנוניות הרגשה של חוסר התמצאות ירידה בהכרה פרוסים קושי בדיבור או בכתיבה פיגעה בזיכרון חולשת שרירים תחושת נימול או אובדן תחושה
<p>תמיד שאל את הרופא שלך לגבי נטילת תרופות אחרות בזמן שאתה נוטל אלרקספיו.</p>	

من المهم التذكّر: قد يُطلب منك البقاء بالقرب من مؤسسة طبية لكي يتمكن طبيبك من متابعة العلامات والأعراض يوميًا لمدة 48 ساعة بعد إعطاء كل من الجرعتين الأوليتين من "إلركسفيو".
إذا شعرت بأي عرض من الأعراض المذكورة في هذه البطاقة، اتصل بطبيبك أو اطلب مساعدة طبية طارئة على الفور! هذه ليست كل الأعراض الجانبية المحتملة لـ"إلركسفيو". أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي عرض جانبي يزعجك أو لا يزول.

חשוב לזכור: ייתכן שתתבקש להישאר בקרבת מוסד רפואי כדי שהרופא שלך יוכל לעקוב אחר הסימנים והתסמינים מדי יום במשך 48 שעות לאחר מתן כל אחת משתי המנות הראשונות של אלרקספיו. אם הכך חווה תסמין **בלשה** מאלו הרשומים בכרטיס זה התקשר לרופא שלך או פנה לקבלת עזרה רפואית דחופה באופן מיידי! אלו לא כל תופעות הלוואי האפשריות של אלרקספיו. ספר לרופא שלך אם יש לך תופעת לוואי כלשהי שמטרידה אותך או שאינה חולפת.



לطاقم الطبي

معلومات أمان هامة يجب أن تعرفها: قد يتسبب العلاج بـ"الريكسفيو" في متلازمة إفراز السيروتونينات (CRS) أو سمية عصبية، بما في ذلك متلازمة عصبية مرتبطة بخلايا مناعية فعّالة (ICANS) بدرجة خطيرة قد تهدد الحياة. CRS قد يشمل عدد من أجهزة الجسم.



למזיד מן המעומות יגבג התמען פי הנשרה ללטיבג.

עבור הצוות הרפואי

מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת: טיפול באלרקספיו עלול לגרום לתסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) או לרעילות נוירולוגית, כולל תסמונת עצבית הקשורה לתאי חיסון אפקטורים (ICANS) בדרגת חומרה מסכנת חיים. CRS עשויה לערב מספר מערכות גוף.



למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא.

הזה המעלג קד חסל עלו רלרקספיו.

אסמ הטללל המעלג: _____

רקמ הלטף הטללל המעלג: _____

רקמ הלטף בעד סלטת העמל: _____

אסמ המסטרף: _____

מועלד חקנ רלרקספיו:



מועד הגרעה התדרגלע الأولی: _____

מועד הגרעה התדרגלע الثانیة: _____

الجرعة الكاملة الأولی: _____

מטופל זה קיבל אלרקספיו.


שם הרופא המטפל: _____

מספר טלפון של הרופא המטפל: _____

מספר טלפון אחרי שעות העבודה: _____

שם בית החולים: _____

תארכי הזרקות אלרקספיו:



תאריך המנה ההדרגתית הראשונה: _____

תאריך המנה ההדרגתית השניה: _____

המנה המלאה הראשונה: _____

לلتבג על האערעש הגנבג

למזיד מן המעומות יגבג התמען פי הנשרה ללמסטרף.

ללמזיד מן המעומות הטללע ימען התוגה לו פלזר ישראל עלו ברלד הלכטרונל

Medical.information@pfizer.com

מן הממען תבגלג זרורה השכעה ען האערעש הגנבגלע מן כלל בוובת התבגלג ען

האערעש הגנבגלע המוגדע עלו השכעה הרללללע פי מועף זרורה השכעה:

www.health.gov.il או עבר תסכף הרללל:

https://sideeffects.health.gov.il

ימען התבגלג ען האערעש הגנבגלע אכענל לשרכה פלזר ען טרלף ברלד הלכטרונל:

isr.aereporting@pfizer.com

מן אכל סהולע ותהוין הרעה, תמען סלעגה הזש הנשרה בסלעגה המזכר. עלו הרע מן זלכ, פלן הדווע מלכסס לכלל הגנללל.

תמ המסדקע עלו הזש הלטקת ומכטוהמ מן קבל זרורה השכעה פי שבלט 2025.

Version 2.0

דלדווח תופעות לוואי

למידע נוסף, יש לעיין בעלון לצרכן.

למידע רפואי נוסף ניתן לפנות לפייזר ישראל בדואר אלקטרונל

Medical.information@pfizer.com

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל

לדלדווח תופעות לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות:

www.health.gov.il או על ידי כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il

ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לפייזר במלל:

isr.aereporting@pfizer.com

לשם הפשטות ולהקלת הרקלעה כרטלס זה נוסח בלשון זכר. על אף

זאת, התרופה מלועדת לבני שני המללל.

כרטלס זה ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות בפברוור 2025

Version 2.0

Developed by



Developed by

