

סטרפסילס® אורנג' עם ויטמין C 100 מ"ג לכסניות למציצה

החומרים הפעילים וריכוזם:

כל לכסנית מכילה:

ויטמין C (חומצה אסקורבית וסודיום אסקורבאט)

100 מ"ג

Vitamin C (as sodium ascorbate and ascorbic acid) 100.0 mg

2,4-דיכלורובנזיל אלכוהול 1.2 מ"ג

(2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg)

אמילמתקרוסול 0.6 מ"ג

(Amylmetacresol 0.6 mg)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, ראה גם סעיף 6. ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.

התרופה מיועדת למבוגרים וילידים מעל גיל 6 שנים. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

סטרפסילס אורנג' עם ויטמין C 100 מ"ג משמש להקלה על כאבי גרון אצל מבוגרים וילדים.

קבוצה תרפויטית: אנטיספטי.

התכשיר מכיל שני חומרים פעילים בעלי פעולה אנטיספטית, חומרים אלו משמשים להקלה בתסמינים של זיהומי הפה והגרון הקוטלים חיידקים המעורבים בזיהומי הפה והגרון. מציצת הלכסנית מאפשרת לחומרים הפעילים לפעול באזור הכואב וכן לסכך ולהרגיע אותו. דבר זה מסייע להקלת הכאב ואי הנוחות בזיהומי פה וגרון. בנוסף, התכשיר מכיל חומצה אסקורבית שהינה מקור לויטמין C אשר יכול להועיל במהלך זיהום בו רמות הויטמין C ככל הנראה יורדות.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה רשימה מלאה של המרכיבים הבלתי פעילים בסעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בסטרפסילס אורנג' עם ויטמין C 100 מ"ג, ספר לרופא אם:
- אתה סובל מבעיות אחרות בגרון

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 שנים בשל סכנת חנק.

הריון והנקה

יש להיוועץ ברופא טרם השימוש בתכשיר זה אם את חושבת שאת בהריון, את בהריון או מניקה.
יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- תרופה זו מכילה סוכרוז (1.44 גרם/לכסנית) וגלוקוז (0.97 גרם/לכסנית). יש להתחשב בכך בקרב מטופלים הסובלים מסוכרת. אם נאמר לך ע"י הרופא כי יש לך חוסר סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתכשיר.
- תרופה זו מכילה Sunset yellow (E110) ו-Ponceau 4R (E124) העלולים לגרום לתגובה אלרגית.
- תרופה זו מכילה רמות נמוכות מאוד של גלוטן (מעמילן חיטה). התרופה נחשבת 'ללא גלוטן' ולא סביר שהתרופה תגרום לבעיות בחולי צליאק. לכסנית אחת של מכילה לא יותר מ-19.36 מיקרוגרם של גלוטן. **אין לקחת תרופה אם הנך סובל מאלרגיה לגלוטן** (מצב השונה ממחלת צליאק).
- תרופה זו מכילה 3 מ"ג של פרופילן גליקול בכל לכסנית.
- תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נטרן במנה, הנחשבת כ-'ללא נטרן'.
- תרופה זו מכילה מרכיב ריח הכולל Citral, Citronellol, d-Limonene, Geraniol ו-Linalool העלולים לגרום לתגובות אלרגיות.
- התרופה מכילה 0.124ppm גופרית דו חמצנית (E220) (הנמצאת בגלוקוז נוזלי) בכל לכסנית - אשר לעיתים רחוקות עלול לגרום לתגובות אלרגיות או לעווית הסימפונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. יש להוציא לכסנית אחת מהבסליסטר (אריזת האלומיניום), למקמה בתוך הפה ולאפשר לה להתמוסס באיטיות. יש להכניס את הבליסטר חזרה לקרטון האריזה. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים: לכסנית אחת למציצה כל 2-3 שעות. אין להשתמש ביותר מ-10 לכסניות ביממה (24 שעות). 10 לכסניות מכילות 1000 מ"ג של ויטמין C, שהוא המינון המקסימלי היומי.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל שש שנים. יש לזכור כי ילדים קטנים עלולים להיחנק מהלכסנית.

משך הטיפול

לשימוש קצר טווח. יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר ולזמן הקצר ביותר על מנת להקל על התסמינים.
עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש:

יש למצוץ הלכסנית לאט, על מנת שתתמוסס לאט בפה. אין ללעוס או לשבור את הלכסנית.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עשוי לחוש אי נוחות בבטן. אל תמשיך להשתמש בתכשיר והיוועץ ברופא או ברוקח. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. **אם שכחת ליטול את התרופה** בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפסילס אורנג' עם ויטמין סי 100 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם - מופיעה תגובה אלרגית (רגישות-יתר) לתרופה כגון עקצוץ, תחושת צריבה ו/או אי נוחות בפה, קשיי נשימה, נפיחות בפנים, בצוואר בלשון או בגרון, ופריחה (תגובה אלרגית חריפה).
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח של תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
 - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאינן עוד בשימוש. צעדים אלו יעזרו לך להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם: Liquid sucrose, Liquid glucose (containing wheat starch – (containing gluten), Sulphites- Sulphur Dioxide (E220)), Tartaric acid, Blood Orange PHL 105288 (containing Citral, Citronellol, d-Limonene, Geraniol and Linalool), propylene glycol, Levomenthol, Sunset yellow (E110), Ponceau 4R (E124) (containing Sodium),.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: לכסנית עגולה בצבע כתום, עם סמל המותג מוטבע על שני הצדדים.

שם בעל הרישום וכתובתו: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, רח' הנגר 6, הוד השרון
4527704. דוא"ל: ConsumerHealth_IL@reckitt.com
שם היצרן וכתובתו:
רכיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם, אנגליה.

נערך באפריל 2025.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
066-22-25662-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.