

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**טולטרודין אי.אר. מדומי 2 מ"ג**

כל כמוסה בשחרור מושהה מכילה:  
טולטרודין טרטרט 2 מ"ג 2 mg toltrodine tartrate

**טולטרודין אי.אר. מדומי 4 מ"ג**

כל כמוסה בשחרור מושהה מכילה:  
טולטרודין טרטרט 4 מ"ג 4 mg toltrodine tartrate

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**1. למה מיועדת התרופה?**

לטיפול במצבי פעילות יתר של שלפוחית השתן המתבטאים בדחיפות ותכיפות במתן שתן או אי שליטה במתן שתן.

**קבוצה תרפויטית:** אנטגוניסט לרצפטור המוסקריני.

**2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- יש לך קשיים בריקון שלפוחית השתן (נקרא גם "אצירת שתן").
- הקיבה שלך מתרוקנת לאט (נקרא גם "אצירת קיבה").
- יש לך בעיה בעיניים הנקראת "גלאוקומה צרת זווית בלתי מבוקרת".
- אתה רגיש לתרופות אשר מכילות את החומר פסוטרודין.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול בטולטרודין אי.אר. מדומי ספר לרופא אם:**

- יש לך בעיה בקיבה או בעיות עיכול.
- יש לך קושי בריקון שלפוחית השתן שלך או יש לך זרימת שתן חלשה.
- יש לך בעיה בעיניים הנקראת "גלאוקומה צרת זווית".
- יש לך בעיות כבד.
- יש לך בעיות כליות.
- אתה סובל ממחלה שנקראת מיאסטניה גרביס.
- יש לך או למישהו מבני המשפחה בעיה נדירה בלב הנקראת "הארכת מקטע QT" (תסמונת QT מוארך).
- את בהיריון או מיניקה, מתכננת להיכנס להיריון או להיניק - ראי סעיף "היריון והנקה".

**ילדים ומתבגרים**

לא קיים מידע לגבי יעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים.

**אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות**

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

תרופות אחרות עלולות להשפיע על האופן בו הגוף שלך מתמודד עם טולטרודין אי.אר. מדומי. הרופא שלך עשוי

לרשום מינון נמוך יותר אם אתה לוקח:

- תרופות מסוימות לזיהומים בפטריות כגון קטוקונאזול, איטראקונאזול, מיקונאזול.
  - תרופות מסוימות לזיהומים חיידקיים כגון קלריתרומיצין.
  - תרופות מסוימות לטיפול בזיהום HIV כגון ריטונאביר, סאקווינאביר, אטאזנאביר.
- עליך להכיר את התרופות שאתה נוטל. שמור את רשימת התרופות כדי שתוכל להראות לרופא או לרוקח בכל פעם שאתה מקבל תרופה חדשה.

### **שימוש בתרופה ומזון**

ניתן ליטול את הכמוסה עם או בלי אוכל.

### **היריון, הנקה ופוריות**

אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מתכננת הריון, יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו. לא ידוע אם טולטרודין אי.אר. מדומי עלול לפגוע בעובר שלך.

אם את מיניקה או מתכננת להיניק יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו. לא ידוע אם טולטרודין אי.אר. מדומי עובר לחלב אם והאם יכול לפגוע בתינוק.

### **נהיגה ושימוש במכונות**

אין לנהוג, להפעיל מכונות או לבצע פעילויות מסוכנות אחרות עד אשר תדע איך טולטרודין אי.אר. מדומי משפיעה עליך. לתרופות אנטי מוסקריניות, כגון טולטרודין אי.אר. מדומי, עלולות להיות תופעות לוואי כגון ראייה מטושטשת, סחרחורת או נמנום.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים בתרופה**

הכמוסה מכילה סוכרוז - אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול.

## **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

**המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. אל תשנה את המינון אלא אם כן נאמר לך לעשות זאת על ידי הרופא שלך.**

### **המינון המקובל בדרך כלל הוא:**

כמוסה אחת פעם ביום עם כוס מים. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה מאחר שמדובר במנגנון של שחרור מושהה. ספר לרופא אם אינך יכול לבלוע כמוסות. ניתן ליטול את הכמוסה עם או בלי אוכל. יש ליטול את הכמוסה באותה השעה מידי יום.

### **אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה**, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול את התרופה**

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד**, קח את המנה הבאה ביום למחרת. אל תיטול 2 מנות של התרופה באותו היום.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בטולטרודין אי.אר. מדומי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש בטולטרודין אי.אר. מדומי ולפנות לקבלת עזרה רפואית באופן מיידי אם אתה חווה את התסמינים הבאים:**

טולטרודין אי.אר. מדומי עשוי לגרום לתגובות אלרגיות אשר עלולות להיות חמורות. התסמינים לתגובה אלרגית חמורה יכולים לכלול התנפחות הפנים, השפתיים, הגרון או הלשון, קשיי נשימה, חסימה של דרכי הנשימה העליונות או נפילה בלחץ הדם.

#### תופעות לוואי השכיחות ביותר הן:

- יובש בפה
- כאב ראש
- עצירות
- כאב בטן

#### תופעות לוואי נוספות

סחרחורת, קשיי עיכול, עייפות, יובש בעין, טשטוש ראייה, ישנוניות, חרדה, דלקת של מערות האף (סינוסיטיס), כאב במתן שתן.

תגובה אלרגית קשה (אנפילקסיס) ובצקת תת עורית, דפיקות לב מהירות (טכיקרדיה), דפיקות לב חזקות (פלפיטציות), בצקת פריפריית (בצקת בגפיים), שלשול, בלבול, חוסר התמצאות במרחב, שיבוש בזיכרון, הזיות.

ישנם דיווחים על החמרה של תסמינים של דמנציה (כגון בלבול, חוסר התמצאות במרחב, אשליות) לאחר התחלת טיפול עם טולטרודין אי.אר. מדומי במטופלים אשר נוטלים מעכבי כולינאסטראז לטיפול בדמנציה.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית מתחת ל-25°C.

#### 6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

*Capsule contents:* sugar spheres, ethylcellulose dispersion Type B, hydroxypropylmethyl cellulose, talc.

*Capsule shell:* gelatin, water, sodium lauryl sulfate.

*Printing ink:* shellac (E904), dehydrated alcohol (E1510), isopropyl alcohol, butyl alcohol, propylene glycol (E1520), strong ammonia solution (E527), purified water, potassium hydroxide (E525), titanium dioxide (E171).

*Colourants:*

2 mg: titanium dioxide(E171), iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), FD & C Blue 1(E133)

4 mg: titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172), FD & C Blue 1 (E133)

כל כמסה של טולטרודין אי.אר. מדומי 2 מ"ג מכילה 54.44 מ"ג סוכר.

כל כמסה של טולטרודין אי.אר. מדומי 4 מ"ג מכילה 108.88 מ"ג סוכר.

#### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טולטרודין אי.אר. מדומי 2 מ"ג – כמסה בצבע כחול-ירוק עם הדפסה "L 32" ו-"2" בצבע לבן.  
טולטרודין אי.אר. מדומי 4 מ"ג – כמסה בצבע כחול עם הדפסה "L 33" ו-"4" בצבע לבן.

כל אריזה מכילה 28 כמוסות.

**בעל הרישום וכתובתו:**

מדומי פארמה בע"מ, ת.ד. 742, גבעתיים, 5310602, ישראל.

**שם היצרן וכתובתו:**

Macleods Pharmaceuticals Limited  
Block-N2, Village Theda,  
Post Office Lodhimajra,  
Tehsil Baddi, Distt. Solan,  
Himachal Pradesh-174 101,  
India

עלון זה נערך באפריל 2025 .

**מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

טולטרודין אי.אר. מדומי 2 מ"ג: 174-90-36958-99

טולטרודין אי.אר. מדומי 4 מ"ג: 174-91-36959-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.