

Инструкция по применению препарата в соответствии с «Положением о фармацевтах (Препараты)» - 1986
Лекарство продается без рецепта врача

Карбосилан **Капсулы**

Состав активных веществ:

Каждая синяя капсула (действующая в желудке) содержит:

Активированный уголь 140 мг	activated charcoal 140 mg
Симетикон 45 мг	simethicone 45 mg

Каждая красная капсула (действующая в кишечнике) содержит:

Активированный уголь 140 мг	activated charcoal 140 mg
Симетикон 45 мг	simethicone 45 mg

Неактивные вещества и аллергены: см. раздел 6 «Дополнительная информация».

Прежде чем начать применение препарата, внимательно прочтите инструкцию до конца.

Инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Необходимо принимать данный препарат согласно указаниям, приведенным в пункте дозировки в настоящей инструкции. Если вам потребуется дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом. Обратитесь к врачу, если ваше состояние не улучшилось или усугубилось в течение 10 дней.

1. Для чего предназначен данный препарат?

Для устранения скопления газов в пищеварительном тракте. Для симптоматического лечения болей в животе, вызванных скоплением газов. Облегчает ощущение распирания и вздутия в животе, облегчает выведение газов из организма.

Терапевтическая группа: препараты против метеоризма/адсорбенты.

2. Перед применением препарата

Не следует принимать препарат:

- Если вы страдаете аллергией на активные вещества/активные вещества препарата или на любой из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате (см. раздел 6).

Особые предостережения в связи с приемом препарата

Если вы принимаете другие медицинские препараты, вам следует принимать Карбосилан в капсулах через определенный промежуток времени после приема других препаратов (если возможно, более двух часов).

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед тем, как принимать Карбосилан в капсулах.

Дети и подростки

Препарат не предназначен для детей моложе 6 лет из-за опасности удушья.

Мехлекарственные взаимодействия/реакции
Если вы принимаете (или в последнее время принимали) другие препараты, включая

препараты, продаваемые без рецепта врача, или пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Данный препарат может уменьшить всасываемость других лекарств, поэтому следует соблюдать определенный промежуток времени (если возможно, более двух часов) между приемом этого препарата и других лекарств.

Прием препарата и питание

Следует принимать препарат до еды.

Беременность и грудное вскармливание

Необходимо посоветоваться с врачом по поводу использования этого препарата, если вы беременны.

Если вы узнали, что беременны в процессе лечения препаратом, проконсультируйтесь с врачом, т.к. только врач может решить, есть ли необходимость продолжать лечение.

Препарат можно применять во время грудного вскармливания.

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны или планируете забеременеть, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед приемом препарата.

3. Как принимать препарат?

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если вы не уверены в отношении дозировки и способа применения препарата.

Рекомендуемая дозировка препарата при отсутствии иного указания от врача:

Следует принимать синюю капсулу вместе с красной капсулой три раза в день перед едой. Не разжевывать, следует глотать капсулы целиком, запивая водой.

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

В случае передозировки препарата

Высокие дозы препарата могут окрасить кал в темный цвет. Немедленно обратитесь к врачу или фармацевту.

Если вы забыли принять препарат

В таком случае не следует принимать двойную дозу препарата в качестве компенсации.

Не принимайте лекарства в темноте! Необходимо проверять этикетку препарата и его дозировку при каждом приеме. Если вы носите очки, наденьте их перед приемом лекарства.

Если у вас возникли дополнительные вопросы относительно приема препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

4. Побочные явления

Как и в случае с любым другим препаратом, у некоторых людей прием препарата Карбосилан в капсулах может вызывать побочные явления. Не пугайтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, вы не испытаете ни одно из них.

- Возможное окрашивание кала в более темный цвет.
- Сообщалось о случаях аллергических реакций (крапивница, общая аллергическая реакция) после приема Карбосилана в капсулах.
- Сообщалось о случаях нарушения пищеварения в желудке и кишечнике (боли,

рвота, дискомфорт, запор или понос) после приема Карбосилана в капсулах.

При появлении побочного явления, а также если какое-либо из побочных явлений усугубляется или если вы страдаете побочным явлением, не указанным в данной инструкции, вам следует проконсультироваться с врачом.

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщение о побочных эффектах от лекарств», которая находится на интернет-сайте Министерства здравоохранения (www.health.gov.au), чтобы перейти на электронный бланк сообщения о побочных явлениях, или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.au/>

или же отправить сообщение по электронной почте: safety@trima.co.nz

5. Как хранить препарат?

- Не травите! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и (или) младенцев (и вне поля их зрения). Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.

- Не следует принимать препарат после истечения его срока годности (exp. date), указанного на упаковке/ блистере. Срок годности препарата оканчивается в последний день указанного на упаковке месяца.

- **Условия хранения:** следует хранить препарат при температуре ниже 25°C.

6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ данный препарат содержит следующие компоненты:

Синяя капсула (действует в желудке): gelatin, sorbitan oleate, polysorbate 80, titanium dioxide, indigotin.

Красная капсула (действует в кишечнике): gelatin, sorbitan oleate, cellulose acetate phthalate, polysorbate 80, diethyl phthalate, erythrosine, titanium dioxide, indigotin.

Внешний вид препарата и содержимое упаковки:

В упаковке 48 капсул (24 дозы) или 60 капсул (30 доз).

Каждая доза содержит 2 капсулы: одну красную и одну синюю.

Обе капсулы содержат черный порошок.

Название и адрес компании-производителя: Лаборатория «Гримберг», проспект Жорж Помпиду 44, 92300, Леваллау-Перре, Франция.
Владелец регистрации и его адрес: Трима Ташер Рефуа Исраэлиим Маабарот ЛТД, Маабарот 4023000, Израиль.

Данная инструкция отредактирована в октябре 2024 г.

Регистрационный номер препарата в государственном реестре лекарственных препаратов/ Министерства здравоохранения: 134-82-21600-07.

1024G
P00001465

1283180
PIL-1024-05