

עלון לצרכן לפי תקנות הרקוחים (תכשירים)

התשפ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קרבוסילין כמוסות

חומרים פעילים:

כל כמוסה כחולה (פועלת בקיבה) מכילה:

פחם פעיל 140 מ"ג
activated charcoal 140 mg
סימטיקון 45 מ"ג
simethicone 45 mg

כל כמוסה אדומה (פועלת במעינים) מכילה:

פחם פעיל 140 מ"ג
activated charcoal 140 mg
סימטיקון 45 מ"ג
simethicone 45 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון זה סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינזן בעלון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם אינך מרגיש שיפור במצבך או אם אתה מרגיש גרוע יותר לאחר 10 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

נגד הצטברות גזים במערכת העיכול. לטיפול סימפטומטי בכאבי בטן ששקורם בהצטברות גזים ולהקלה בהרגשת מלאות ונפיחות ובפליטת גזים. **קבוצה תרופוטיקה:** נוגד גזים/סופו ומעינים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גרש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים האחרים שמכילה התרופה כמפורט בפרק 6.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אם אתה מקבל טיפול רפואי אחר, קח קרבוסילין כמוסות במרווח זמן מנטילת תרופות אחרות (יותר משעתיים, אם ניתן).

שוחח עם הרופא או הרוקח לפני שתיקח קרבוסילין כמוסות.

ילדים ומתבגרים
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 בשל סכנת חנק.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

תרופה זו יכולה להפחית את הספיגה של תרופות אחרות, ולכן יש ליטול אותן במרווח זמן מתרופה זו (יותר משעתיים, אם ניתן).

שימוש בתרופה וזמן
יש ליטול תרופה זו לפני הארוחות.

הריון והנקה

חובה להיוועץ ברופא לגבי השימוש בתרופה זו בהריון. אין גילית בשאת בהריון במהלך הטיפול, היועצי ברופא, מפני שרק רופא יכול להחליט אם יש הכרח להמשיך בטיפול.

ניתן לתת תרופה זו במהלך ההנקה.

אם את בהריון או מיניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להרות, עליך להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן השימוש בתרופה.

מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מהרופא:
יש לקחת כמוסה כחולה עם כמוסה אדומה 3 פעמים ביום לפני הארוחות.
אין ללעוס, יש בלועו את הכמוסות בלמחות עם מים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נשלת מינון הרמה

שימשי במנות גבוהות יכול לגרום לצואה כהה. צור קשר מיד עם הרופא או הרוקח.

אם שכחת ליטול את התרופה

אין ליטול מנה נוספת כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אין ליטול תרופות בחושה! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים עם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקרבוסילין כמוסות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מפיא אחת מהן.

- ייתכן שישו צבע הצואה לצבע כהה יותר.
- דווחו מקרים של תגובות אלרגיות (סרפדת, תגובה אלרגית כללית) לאחר מתן קרבוסילין כמוסות.
- דווחו מקרים של הפרעות עיכול (קיבה ומעינים) (כאב, הקאה, אי-נוחות, עצירות או שלשול) לאחר מתן קרבוסילין כמוסות.

אם הפיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לרווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) הפננה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ידי

כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>
ניתן לדווח גם לדוא"ר: safety@trima.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה/הבליסטר. תאריך התפוגה מתייחס ליום התיגונות של אות חודש.
- תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים בתרופה מכילה גם: כמוסה כחולה (פועלת בקיבה):

gelatin, sorbitan oleate, polysorbate 80, titanium dioxide, indigotin.

כמוסה אדומה (פועלת במעינים):

gelatin, sorbitan oleate, cellulose acetate phthalate, polysorbate 80, diethyl phthalate, erythrosine, titanium dioxide, indigotin.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אריזה של 48 כמוסות (24 מנות) או 60 כמוסות (30 מנות).

כל מנה מכילה 2 כמוסות: אחת אדומה ואחת כחולה. שתי הכמוסות מכילות אבקה שחורה.

שם היצרן וכתובת: מעבדות גרימברג, שד' ז'ור'ר מפמידו 44, 92300, אלבלואה-פרה, צרפת.
בעל הרישום וכתובת: תרומה תוצרי רפואה ישראלים מעבדות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.

נערך באוקטובר 2024.

מספר רישום התרופה בפקס התרופות המלכתית משרד הבריאות: 07-21600-134-82.

לשם הפשוטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.