

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**  
**התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד**

**אזלסטיין-פוס**  
תרסיס לאף, תמיסה

**חומר פעיל**

אזלסטיין הידרוכלוריד 0.1% w/v

(azelastine hydrochloride 0.1% w/v)

לחיצת תרסיס אחת (0.14 מ"ל) מכילה 0.14 מ"ג של החומר הפעיל אזלסטיין הידרוכלוריד.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 6 "מידע נוסף"

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**1. למה מיועדת התרופה?**

אזלסטיין-פוס נועד לטיפול בנזלת אלרגית עונתית או שנתית, במבוגרים וילדים בני 6 ומעלה.

**קבוצה תרפויטית:**

אנטי היסטמין דור שני, פוטנטי, סלקטיבי.

אזלסטיין-פוס נועד לטיפול באלרגיות המופיעות בעונות מסוימות של השנה, לדוגמה אלרגיה לאבקנים הנקראת קדחת השחת. כמו כן, אזלסטיין-פוס נועד לטיפול באלרגיות המופיעות כל השנה, לדוגמה אלרגיה לקרדית אבק הבית או אלרגיה לפרוות חתולים או כלבים.

התרופה פועלת על ידי מניעת האפקט של היסטמין המופרש בגוף כחלק מתגובה אלרגית.

לרוב, האלרגיה תגרום לנזלת, התעטשויות, גרד או אף סתום. אזלסטיין-פוס יכול להקל את התסמינים האלו.

**2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (azelastine hydrochloride) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 'מידע נוסף').

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש באזלסטיין-פוס.

**ילדים ומתבגרים**

תרופה זו לא מיועדת לילדים מתחת לגיל 6.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** עד כה לא דווח על תגובות בין תרופתיות עם תרופות אחרות.

**היריון והנקה**

אם את בהיריון, מניקה, חושבת כי את בהיריון או מתכננת היריון, יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש.

**נהיגה ושימוש במכונות**

לאזלסטיין-פוס אין השפעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.


המינון המקובל בדרך כלל הוא:

ריסוס אחד בכל נחיר, פעמיים ביום (בבוקר ובערב).

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

## כיצד להשתמש בתרסיס אזלסטיין-פוס

1. ראשית יש לקנח את האף
2. יש להסיר את כיסוי המגן
3. לפני השימוש הראשון יש ללחוץ כמה פעמים על המשאבה עד לקבלת תרסיס אחיד (בדרך כלל 1-2 פעמים)
4. יש לרסס פעם אחת בכל נחיר כשהראש זקוף. אין להטות את הראש לאחור
5. יש לנגב את המשאבה ולהחזיר את כיסוי המגן



**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**, לא צפויים תסמינים, פנה לרופא אם אתה מודאג.  
**אם בטעות בלעת מן התרופה, או אם ילד בלע מן התרופה**, פנה מייד לרופא או לחדר המיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם בטעות נכנס לך **אזלסטיין-פוס** לעיניים, שטוף אותן בהרבה מים. ייתכן כי תחוש עקצוץ בעיניים לזמן מה.

**אם שכחת ליטול את התרופה** בזמן המיועד, טול את המנה ברגע שנזכרת ולאחר מכן, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אל תיטול מנה כפולה על מנת לפצות על זו שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה **בכל פעם** שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או רוקח.

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באזלסטיין-פוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- טעם לא נעים בפה המורגש במיוחד אם אתה מטה את ראשך אחורה בעת השימוש. במקרים נדירים הטעם הלא נעים בפה עלול לגרום לבחילה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000:

- גירוי של רירית האף (עקצוץ וגרד), עיטוש ודימום מהאף.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:

- תגובות של רגישות יתר כגון פריחה, גרד, אורטיקריה (סרפדת, חרלת).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא.

## דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית והתווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C, אין לשמור בקירור או במקפיא.
- ניתן להשתמש במשך 6 חודשים לאחר הפתיחה.

**6. מידע נוסף**

• נוסף על מרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Sodium chloride, disodium phosphate dodecahydrate, hypromellose, disodium edetate, citric acid, purified water

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אזלסטין-פוס הוא תרסיס צלול וחסר צבע בבקבוק פלסטיק רב-מנתי לבן המכיל 10 מ"ל תמיסה.

• בעל הרישום וכתובתו: קיומא בע"מ, רחוב החורש 33, כפר שמריהו 46910

• שם היצרן וכתובתו:

Ursapharm Arzneimittel GMBH, Industriestrasse D - 66129 Saarbrucken, Germany

• נערך במרץ 2025.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 178-33-37376-99

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.