

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

(يسبق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط)

وزن الجسم	لعلاج الإنفلونزا:	لمنع الإنفلونزا:
أقل من 15 كغم	30 ملغ مرتين في اليوم	جرعة لمدة 10 أيام علاج
أكثر من 15 كغم وحتى 23 كغم	45 ملغ مرتين في اليوم	45 ملغ مرة واحدة في اليوم
أكثر من 23 كغم وحتى 40 كغم	60 ملغ مرتين في اليوم	60 ملغ مرة واحدة في اليوم
أكثر من 40 كغم	75 ملغ مرتين في اليوم	75 ملغ مرة واحدة في اليوم

يمكن التوصل إلى جرعة 75 ملغ عبر تناول كبسولة واحدة مقدارها 30 ملغ سوية مع كبسولة مقدارها 45 ملغ.

### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا كنت غير قادر على ابتلاع كبسولات تاميفلو، يمكن تحضير سائل من كبسولات تاميفلو، انظر نهاية النشرة "تحضير سائل من كبسولات تاميفلو في البيت".

إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ، عليك التوقف عن تناول تاميفلو والاتصال فوراً بالصيدلي أو الطبيب. في معظم الحالات التي تم فيها تناول جرعة مفرطة لم يتم الإبلاغ عن أية أعراض جانبية. عندما تم الإبلاغ عن أعراض جانبية، كانت الأعراض شبيهة بتلك التي تم الإبلاغ عنها عند تناول جرعات عادية وكما يرد تفصيلها في البند "الأعراض الجانبية".

تم الإبلاغ عن حالات فرط الجرعة بوتيرة أعلى عندما تم إعطاء تاميفلو للأطفال مقارنة بالبالغين والمراهقين. يجب توخي الحذر عند تحضير تاميفلو على شكل سائل للأطفال وعندما يتناول الأطفال الدواء.

إذا تناولت جرعة أعلى أو إذا ابتلع الطفل عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء، يُمنع تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسية. يجب استشارة الطبيب.

### إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تحدث أعراض الإنفلونزا عند إيقاف العلاج بتاميفلو. ولكن إذا توقفت عن تناول الدواء في وقت أبكر مما أوصى به لك الطبيب، فقد تحدث أعراض الإنفلونزا مجدداً. يجب المداومة على العلاج تبعاً لتوصية الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلماً تحقق من الملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال تاميفلو أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرح عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها. قد يحدث الكثير من الأعراض الجانبية المفضلة أذناه بسبب الإنفلونزا أيضاً.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية بشكل نادر منذ بدء تسويق أوسيلتاميفير. يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا عانيت من أحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:

- ردود فعل تحسسية: ردود فعل تحسسية خطيرة، مع تورم الوجه والجلد، طفح حاك، ضغط دم منخفض وصعوبة في التنفس
- اضطرابات في الكبد (التهاب الكبد الخاطف (fulminant hepatitis)، مشكلة في أداء الكبد ويرقان): اصفرار الجلد وبياض العينين، تغيير لون البراز، تغييرات في السلوك
- وئمة وعائية عصبية: تورم مفاجئ وخطير في الجلد، لا سيما في منطقة الرأس والعنق بما في ذلك العينين واللسان مع صعوبات في التنفس
- متلازمة ستيفنس جونسون وتقرن الأنسجة الغنومة الشبكية (Toxic epidermal necrolysis/Stevens-Johnson syndrome): ردود فعل تحسسية خطيرة قد تشكل خطراً على الحياة، التهاب خطير في الجزء الخارجي من الجلد وأحياناً في الجزء الداخلي من الجلد أيضاً، في البداية يكون مصحوباً بحمى، ألم في الحنجرع وتعب، طفح جلدي يوزي إلى بثرات، تقشر وسقوط أجزاء واسعة من الجلد مع إمكانية لحدوث صعوبات في التنفس وضغط دم منخفض
- نزيف في الجهاز الهضمي: نزيف متواصل من الأمعاء الغليظة أو بصق الدم
- اضطرابات نفسية عصبية، كما يتم تفصيلها لاحقاً.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً (شائعة جداً وشائعة) التي تم الإبلاغ عنها عند استعمال تاميفلو هي الشعور بالإعياء (غثيان وحالات تقيؤ)، ألم في البطن، اضطراب في المعدة، صداع وآلم. تحدث هذه الأعراض بالأخص بعد تناول الجرعة الأولى من الدواء وتزول غالباً عند متابعة العلاج. تكون وتيرة هذه الأعراض قليلة إذا تم تناول الدواء مع الطعام.

**أعراض جانبية نادرة ولكنها خطيرة (قد تؤثر في حتى متعالج واحد من بين 1000 مستعمل):** يجب التوجه لتلقي علاج طبي فوراً خلال العلاج بتاميفلو تم الإبلاغ عن حالات نادرة تشتمل على تشنجات وهديان، بما في ذلك تغيير في مستوى الوعي

- ارتباك، سلوك استثنائي
- آو هاه، هوس، عدم الهدوء (اهتياج)، قلق، كوابيس
- تم الإبلاغ عن الأعراض المذكورة أعلاه تحديداً لدى الأطفال والمراهقين في أحيان كثيرة بدأت بشكل مفاجئ وميرت بسرعة. انتبهت بعض الحالات بالحق الضرر الذاتي وكان جزء منها فتاكاً. تم الإبلاغ أيضاً عن حالات نفسية عصبية مثل هذه لدى متعالجين لديهم إنفلونزا ولم يتلقوا تاميفلو.
- يجب متابعة التغييرات في السلوك المذكورة أعلاه بدقة، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين.

إذا اختبرت الأعراض المذكورة أعلاه، لا سيما لدى الشبان، يجب التوجه لتلقي مساعدة طبية في أسرع وقت.

### البالغون والمراهقون (فوق سن 13 عاماً)

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر في أكثر من متعالج واحد من بين 10):

- صداع
- غثيان

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر في حتى متعالج واحد من بين 10):

- التهاب القصبات الوبائية (bronchitis)
- قروح برد
- سعال
- دوام
- حمى
- ألم

- ألم في الأطراف
- سيلان الأنف
- صعوبات في النوم
- ألم في الحنجرة
- ألم في البطن
- تعب
- شعور بامتلاء البطن العلوية
- حالات عدوى في المجاري التنفسية العلوية (في الأنف، الحنجرة، والجيوب الأنفية)
- اضطراب في المعدة
- حالات تقيؤ

أعراض جانبية ليست شائعة (قد تؤثر في حتى متعالج واحد من بين 100):

- ردود فعل تحسسية
- تغيير في الوعي
- اختلاج
- اضطرابات في وتيرة نبض القلب
- اضطرابات متتلة خطيرة في أداء الكبد
- ردود فعل جلدية (التهاب الجلد، طفح أحمر وحاك، تقشر الجلد)

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر في حتى متعالج واحد من بين 1000):

- تعداد منخفض من الصفائح الدموية (thrombocytopenia)
- اضطرابات في الروية

تاميفلو	تاميفلو	تاميفلو
30 ملغ	45 ملغ	75 ملغ
كبسولات	كبسولات	كبسولات

تحتوي كل كبسولة على: أوسيلتاميفير 30 ملغ  
oseltamivir 30 mg

تحتوي كل كبسولة على: أوسيلتاميفير 45 ملغ  
oseltamivir 45 mg

تحتوي كل كبسولة على: أوسيلتاميفير 75 ملغ  
oseltamivir 75 mg

\*للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الحساسية، انظر الفصل 2 "قبل استعمال الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موزجة عن الدواء، إن كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الطبية وحالتهم.

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

تاميفلو معد لعلاج مرض الإنفلونزا لدى البالغين والأطفال فوق عمر سنة الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا طوال فترة زمنية لا تتعدى يومين.

تاميفلو معد لمنع مرض الإنفلونزا لدى البالغين والأطفال فوق عمر سنة.

تاميفلو كبسولات 75 ملغ معده للبالغين والأطفال الذين يزنون أكثر من 40 كغم فقط. تاميفلو كبسولات 30 ملغ و45-ملغ معده للبالغين والأطفال بدءاً من عمر سنة وما فوق.

### المجموعة العلاجية:

يحتوي تاميفلو على المادة الفعالة أوسيلتاميفير وهو ينتمي إلى مجموعة أدوية مضادة للفيروسات تدعى "مثبطات نويزامينيداز". تمنع هذه الأدوية فيروس الإنفلونزا من الانتشار في الجسم وتساعد على تخفيف أو منع أعراض العدوى بفيروس الإنفلونزا. الإنفلونزا هي عدوى يسببها فيروس. تشتمل أعراض الإنفلونزا غالباً على ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ (أكثر من 37.8°C)، سعال، سيلان أو انسداد الأنف، صداع، ألم في العضلات وتعب شديد. قد تسبب حالات عدوى أخرى هذه الأعراض أيضاً. تحدث عدوى الإنفلونزا بشكل فعلي فقط خلال انتشار العدوى السنوية (وباء) عندما تنتشر فيروسات الإنفلونزا في المجتمع. في الفترات التي لا يحدث فيها انتشار الإنفلونزا، قد تسبب أنواع مختلفة من الأمراض أعراضاً شبيهة بالإنفلونزا.

### 2. قبل استعمال الدواء

#### يُمنع استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (لديك حساسية) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6 - "معلومات إضافية").

#### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

- إذا كنت تعاني من الحساسية لأيٍّ دواءٍ آخرى
- إذا كنت تعاني من خلل في أداء الكلى، فيحتمل أن تكون هناك حاجة إلى ملازمة الجرعة
- إذا كانت لديك حالة طبية خطيرة، يمكن أن تتطلب المكوث في المستشفى فوراً
- إذا كان جهازك المناعي في خطر
- إذا كنت تعاني من مرض قلب مزمن أو مرض تنفسي مزمن

خلال العلاج بتاميفلو، عليك الإبلاغ الطبيب في أسرع وقت ممكن في حال اختبرت تغيرات في السلوك أو في المزاج (حالات نفسية عصبية) لا سيما لدى الأطفال أو البالغين. قد تكون هذه علامات تدل على أعراض جانبية نادرة ولكنها خطيرة.

**تاميفلو هو ليس لقاحاً للإنفلونزا.** إنه معدٌ لعلاج العدوى، أو منع انتشار فيروس الإنفلونزا. يوفر لك اللقاح أجساماً مضادة للفيروس. لا يغير تاميفلو نجاعة لقاح الإنفلونزا، وقد يوصي لك الطبيب بتلقي كليهما.

#### تاميفلو والأدوية الأخرى

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها الأدوية وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- كلوربرومايد (معدٌ لعلاج السكرى)
- ميثوتريكسات (يستخدم من بين أمور أخرى لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي)
- فينيلبيتازول (يستخدم لعلاج الآلام والالتهاب)
- برونيديد (يستخدم لعلاج القرقس [Gout])

#### استعمال تاميفلو والغذاء

يجب ابتلاع الكبسولات كاملة مع الماء. لا يجوز شطر أو مضغ الكبسولات. يمكن تناول الدواء مع أو دون طعام. مع ذلك، قد يقل تناول الدواء مع الطعام احتمال الشعور بالإعياء (غثيان، حالات تقيؤ).

#### الحمل، الإرضاع والخصوبة

**الحمل:** يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت حاملاً، تظنين أنك حامل أو تخطين للحمل لكي يستطيع أن يقرر فيما إذا كان تاميفلو هو الدواء الملائم لك.

#### الإرضاع:

إن تأثيرات تاميفلو على الرُّضِع غير معروفة. يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت مرضعة لكي يستطيع أن يقرر فيما إذا كان تاميفلو هو الدواء الملائم لك.

#### الإخصاب:

استناداً إلى الأبحاث ما قبل السريرية، ليست هناك أدلة تشير إلى أن تاميفلو يؤثر في الإخصاب لدى الرجال أو النساء.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

#### السياسة واستعمال الماكينات

لا يؤثر استعمال هذا الدواء في القدرة على سيطرة مركبة أو تشغيل الماكينات.

#### معلومات مهمة عن قسم من مركبات تاميفلو

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليلون من الصوديوم (23 ملغ) في كل كبسولة، لهذا يعتبر "خالياً من الصوديوم".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دامتاً حسب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن طريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحدداهما الطبيب فقط. يجب تناول تاميفلو في أسرع وقت ممكن، خلال يومين من ظهور أعراض الإنفلونزا.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

**لعلاج الإنفلونزا** يجب تناول جرعتين في اليوم. إن تناول جرعة في الصباح وجرعة في المساء يكون مريحاً غالباً. من المهم إكمال أيام العلاج الخمسة حتى إذا بدأت تشعر بتحسن.

البالغون الذين يعانون من انخفاض في أداء جهاز المناعة، فإن إفراز فيروس الإنفلونزا من الجسم يكون أطول مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من انخفاض في أداء جهاز المناعة، وقد يكون هذا الإفراز أقل عند العلاج لمدة 10 أيام.

**لمنع الإصابة بالإنفلونزا** أو بعد التعرض لشخص مصاب بعدوى الإنفلونزا، يجب تناول جرعة واحدة مرة في اليوم طوال 10 أيام. يوصى بتناول الدواء في ساعات الصباح مع وجبة الإفطار.

في حالات خاصة، مثلاً عند انتشار الإنفلونزا في المجتمع أو لدى متعالجين يعانون من ضعف جهاز المناعة، يمكن متابعة العلاج بتاميفلو حتى 12-6 أسبوعاً.

تُحدد الجرعة الموصى بها وفق وزن المتعالج. يجب تناول الكمية التي وصفها لك الطبيب.

#### البالغون والمراهقون بدءاً من سن 13 عاماً:

وزن الجسم	لعلاج الإنفلونزا:	لمنع الإنفلونزا:
أكثر من 40 كغم	75 ملغ مرتين في اليوم	جرعة لمدة 10 أيام علاج
أقل من 40 كغم	75 ملغ مرة واحدة في اليوم	75 ملغ مرة واحدة في اليوم

يمكن التوصل إلى جرعة 75 ملغ عبر تناول كبسولة واحدة مقدارها 30 ملغ سوية مع كبسولة مقدارها 45 ملغ.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر في أكثر من مُتعالج واحد من بين 10):

- سعال
- احتقان في الأنف
- حالات تقيؤ

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر في حتى مُتعالج واحد من بين 10):

- التهاب المتئمة (احمرار العينين وإفرازات أو ألم في العين)
- التهاب الأذن واضطرابات أخرى في الأذنين
- صداع
- غثيان

- سيلان الأنف
- ألم في البطن
- شعور بامتلاء البطن العلوية
- اضطراب في المعدة

أعراض جانبية ليست شائعة (قد تؤثر في حتى مُتعالج واحد من بين 100):

- التهاب الجلد
- اضطراب في طيلة الأذن

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب. على الرغم من ذلك إذا عانيت أنت أو طفلك بشكل متكرر أو تفاقمت أعراض الإنفلونزا أو إذا استمر ارتفاع الحرارة يجب التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى استمارات على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد والأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة أعلى من 25°C. يجب استشارة الصيدلي حول طريقة التخلص من الأدوية التي لا تستعملها، وذلك من أجل حماية جودة البيئة.

## 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

ROCHE 30, croscarmellose sodium, sodium stearyl fumarate, gelatin, titanium dioxide, iron oxide yellow, iron oxide red, iron oxide black, printing ink.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

كبسولات تاميفلو 30 ملغ لوها أصفر فاتح غير شفاف وعليها الختم "ROCHE 30" mg بالأزرق.

كبسولات تاميفلو 45 ملغ لوها رمادي غير شفاف وعليها الختم "ROCHE 45 mg" بالأزرق.

كبسولات تاميفلو 75 ملغ لوها رمادي غير شفاف وأصفر فاتح غير شفاف وعليها الختم "ROCHE 75 mg" بالأزرق.

تسوّق الكبسولات في عبوات لويحات (بليستر)، تحتوي على 10 كبسولات.

## معلومات لمستخدم الدواء

للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في بلع كبسولات، بما في ذلك أولاد صغار جداً، يمكن تحضير سائل من كبسولات تاميفلو في الصيدلية (انظر المعلومات المتوفرة في النشرة للطبيب). تحضير المستحضر الصيدلاني هو المفضل.

إذا كان تحضير المستحضر الصيدلاني غير متوفر يمكن تحضير سائل من الكبسولات في البيت.

الجرعة متشابهة بالنسبة للعلاج والوقاية من الإنفلونزا. الفرق هو في وتيرة إعطائها.

تحضير سائل من كبسولات تاميفلو في البيت

إذا كان في حوزتك الكبسولة الملامنة للجرعة المطلوبة، افتح الكبسولة واخلط محتوياتها داخل ملعقة صغيرة واحدة (أو أقل) من منتج غذائي محلي ملائم.

لتحضير الجرعة الملامنة، ستحتاج الأغراض التالية:

- كبسولة أو كبسولتان بالجرعة الملامنة وفقاً للجرعة المطلوبة المحددة بحسب الوزن
- مقص حاد
- وعاء عميق صغير

• ملعقة صغيرة (5 مل)

• ماء

• طعم محلي لإخفاء طعم المسحوق المر مثل: شراب شوكولاتة أو كرز، زينة الحلويات مثل صلصة الكراميل أو الشوكولاتة. أو ممكن تحضير ماء سكر من خلال خلط ملعقة صغيرة من الماء مع ثلاثة أرباع (3/4) ملعقة صغيرة من السكر.

• مرحلة 1: تأكد من أنّ الجرعة صحيحة

• لمعرفة الكمية الصحيحة للاستهلاك، يجب العثور على وزن المتعالج بحسب الجزء الأيسر من القائمة الظاهرة أدناه. انظر في العمود الأيمن من أجل معرفة عدد الكبسولات التي يجب إعطائها للمتعالج لجرعة واحدة. الكمية متشابهة بالنسبة للعلاج والوقاية من الإنفلونزا.


وزن الجسم	جرعة تاميفلو	عدد الكبسولات
حتى 15 كغم	30 ملغ	كبسولة واحدة من تاميفلو 30 ملغ
15 كغم حتى 23 كغم	45 ملغ	كبسولة واحدة من تاميفلو 45 ملغ
23 كغم حتى 40 كغم	60 ملغ	كيسولتان 30 ملغ
أكثر من 40 كغم	75 ملغ	كبسولة واحدة 75 ملغ

مهم!

- يجب استعمال كبسولات 30 ملغ فقط من أجل تحضير جرعات 30 ملغ و- 60 ملغ. لا تحاول تحضير جرعة تاميفلو 45 ملغ أو 75 ملغ بواسطة استعمال محتويات كبسولة بمقدار 30 ملغ. يجب استعمال حجم الكبسولة الملائم.
- يجب استعمال كبسولات 45 ملغ فقط من أجل تحضير جرعة 45 ملغ. لا تحاول تحضير جرعة تاميفلو 30 ملغ، 60 ملغ أو 75 ملغ بواسطة استعمال محتويات كبسولة بمقدار 45 ملغ. يجب استعمال حجم الكبسولة الملائم.
- يجب استعمال كبسولة 75 ملغ فقط من أجل تحضير جرعة 75 ملغ. لا تحاول تحضير جرعة تاميفلو 75 ملغ بواسطة استعمال محتويات كبسولة بمقدار 30 ملغ أو 45 ملغ. يجب استعمال حجم الكبسولة الملائم.

• مرحلة 2: اسكب المسحوق داخل الوعاء

- امسك الكبسولة ذات المقادير الدوائية الملائمة بصورة مستقيمة فوق الوعاء وقص بحذر طرف الكبسولة المستدير بواسطة المقص.
- اسكب المسحوق داخل الوعاء. يجب التعامل بحذر مع المسحوق لأنه قد يسبّب تهيجاً في الجلد وفي العينين.



• مرحلة 3: تمّ بتخلية المسحوق وإعطاء الجرعة الملامنة

- أضف كمية صغيرة - ليس أكثر من ملعقة صغيرة واحدة - من طعم محلي للمسحوق
- اخلط الخليط جيداً.



• قدم فوراً كل محتويات الوعاء للمتعالج.

- في حالة بقاء خليط في الوعاء، يجب غسل الوعاء بكمية قليلة من الماء وإعطائها للمتعالج ليشرهها.
- يجب تكرار العملية في كل مرة تحتاج فيها إلى إعطاء الدواء.

صاحب التسجيل وعنوانه: شركة روش الصيدلانية (إسرائيل)، م.د.، هحاراش 6، ص.ب. 6391، هود هشارون 4524079

المنتج: هوفمان لاه روش م.د.، بازل، سويسرا

تمّ تحريرها في شباط 2025

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

تاميفلو 30 ملغ: 138.02.31733

تاميفلو 45 ملغ: 138.03.31734

تاميفلو 75 ملغ: 118.79.29952

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.