

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

بريزيما محلول

التريكيب:

تحتوي كل 5 ملل من **بريزيما محلول** على:

فلوأوكسيتين (على شكل هيدروكلورايد) 20 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في الدواء، انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الأدوية المصفاة للإكتئاب (Antidepressants)، تزيد من **خضورة** **إحدر** **النشرة** **ببمعن** **تحسين** **حالتها** **قبل** **استعمالك** **لدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الأدوية المصفاة للإكتئاب (Antidepressants)، تزيد من **خضورة** **إحدر** **النشرة** **ببمعن** **تحسين** **حالتها** **قبل** **استعمالك** **لدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الكبار:

- إضطراب الوسواس القسري (OCD).
- التهام العصبي (bulimia nervosa)، يُعطى فلوأوكسيتين كعلاج مكمل للعلاج النفسي من أجل تقليل نوبات الشرقة الخارجة عن السيطرة وإضطراب التطهير.
- الأطفال والمراهقون من عمر 8 سنوات وما فوق:**
- نوبة متوسطة حتى خطيرة لإكتئاب كبير، إذا لم يستجيب الإكتئاب لعلاج نفسي مكوّن من 4-6 جلسات. يجب اقتراح أدوية مضادة لإكتئاب لطفل أو لشخص شاب يعاني من إكتئاب متوسط حتى شديد فقط بمشاركة علاج نفسي متزامن.
- الفصيلة العلاجية:** يحتوي **بريزيما محلول** 20 ملغ لكل 5 ملل على المادة الفعالة فلوأوكسيتين (**Fluoxetine**) وينتمي إلى فصيلة الأدوية المضادة للإكتئاب المسماة مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRI) المضادة للإكتئاب.

كيف يعمل الدواء؟

توجد مادة السيروتونين في دماغ كل إنسان. لدى الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب أو إضطراب الوسواس القسري تكون نسبة السيروتونين أخفض مما هو عليه لدى الأشخاص الذين لا يعانون من تلك الحالات. إن آلية العمل المضبوطة لـ **بريزيما محلول** ومثبطات **SSRI** غير معروفة بأكسليا لكنها تساعد على رفع نسب السيروتونين في الدماغ. إن معالجة تلك الحالات يسبب كل الشعور بشكل أفضل، إذا لم تتم معالجة تلك الحالات، فإن حالتك لن تتغير، لا بل قد تتفاقم وتصبح أصعب للعلاج.

يجب أن يستمر العلاج لمدة أسابيع أو أشهر وذلك لضمان عدم معاناتك من الأعراض.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساسا (ألرجي) لـ فلوأوكسيتين (**Fluoxetine**) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (6 "معلومات إضافية"). إذا تطور لديك طفح أو ردود فعل تحسسية أخرى (مثل حكة، إرتجاف، إنتفاخ الشفتين أو الوهج أو ضيق التنفس) توقف فوراً عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى طبيبك.
- كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (**MAOIs**) غير عكوسة وغير إنتقائية - إن إستعمال هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** قد يسبب حالات تشبه خطراً على حياتك (مثل أدوية علاج الإكتئاب: نيلاميد، إبيرونازيد، موديمييد، فينيلزين، تريتانسيلوسيرين، إيزوكاربازين، ثلوكستانون وإينزوليد (مضاد حيوي)).

يجب الإنتظار 14 يوماً منذ إنتهاء العلاج بمثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOI**) حتى بدء العلاج بهذا الدواء.
لا يجوز بدء علاج بالأدوية المضادة للإكتئاب من نوع مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) إذا لم تمر 5 أسابيع على الأقل منذ التوقف عن إستعمال **بريزيما محلول**. إذا إستعملت **بريزيما محلول** لفترة طويلة أو إذا كان المقاد الوثائي كبير يجب بشكل خاص، وسوف يدرس الطبيب فيما إذا كان يتوجب عليك الإنتظار لفترة أكثر من 5 أسابيع قبل بدء العلاج بـ **MAOIs**.

على الرغم من ذلك، فإن العلاج بـ فلوأوكسيتين (**Fluoxetine**) يمكن أن يبدأ بعد يوم منذ لحظة التوقف عن العلاج ببعض **MAOIs** العكوسة، مثل: إينزوليد، موكلوبيمييد وميتيل تيونينيوم (أزرق الميتيلين).

- كنت تتناول ميتوبرولول (علاج قصور القلب) - إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** يزيد من خطورة حدوث تباطؤ في نظم القلب.

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في الدواء، انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

- كنت تعاني من مشاكل في القلب.
- كنت تعاني من ظهور سحابة، تصلب العضلات أو رجفان في العضلات، تغير في الحالة النفسية مثل لثبات، هياج، قلة هوية؛ ذلك هوية؛ ذلك قد تعاني من حالة تسمى "متلازمة السيروتونين" أو "المتلازمة العصبية الخبيثة". هذه المتلازمة نادرة جداً لكنها قد تسبب حالات تشكل خطراً على الحياة. توجه فوراً إلى الطبيب، من الجائز أن يحتاج الأمر إيقاف العلاج بالدواء.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الواس/حوس خفيف؛ إذا كنت تقاسي من نوبة حوس، توجه فوراً إلى الطبيب، من الجائز أن يحتاج الأمر إيقاف العلاج بالدواء.
- عانيت في الماضي من إرتزة، ظهور كدمات أو إرتزة غير عادية، التي من شأنها أن تتأثر من الدواء، أو إذا كنت حاملاً.
- كنت تتعالج بأدوية معينة لدم (انظر الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تعاني من الصرع أو من إختلاجات. إذا كنت تقاسي من نوبة إختلاجات أو كانت هناك زيادة في وتيرة الإختلاجات توجه فوراً إلى الطبيب، من الجائز أن يحتاج الأمر إيقاف العلاج بالدواء.
- كنت تتلقى علاجاً بالصدمات الكهربائية (ECT).
- كنت تتلقى علاجاً بـ تاموكسيفين (دواء لعلاج سرطان الثدي) (انظر الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تعاني من شعور بعدم الراحة، وعدم القدرة على الجلوس أو الوقوف متصبّبا (قلق الجلوس). إن زيادة المقدار الدوائي من **بريزيما محلول** قد يؤدي لتفاقم هذه الأعراض.
- كنت تستعمل دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- كنت تستعمل دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- كنت تستعمل دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- كنت تستعمل دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- كنت تستعمل دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- كنت تستعمل دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)

- كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، **إحدر** **الطبيب** **أو** **للصيدي** **عن** **ذلك**؛ لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** مع:
- مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) التي يستعمل بعضها لعلاج الإكتئاب. لا يجوز إستعمال مثبطات مونوأمين أوكسيداز، غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) سوية مع **بريزيما محلول** خوفاً من رد فعل خطير لا بل مميت ("متلازمة السيروتونين") التي قد تحدث (انظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا")؛ يجب بدء العلاج بـ **بريزيما محلول** بعد أسبوعين على الأقل منذ التوقف عن إستعمال دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOI** (مثل تريتانسيلوسيرين). يجب الإنتظار 5 أسابيع على الأقل منذ التوقف عن إستعمال **بريزيما محلول** قبل بدء العلاج بمثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- سوف يدرس الطبيب فيما إذا كان يتوجب الإنتظار فترة زمنية أطول من 5 أسابيع قبل بدء العلاج بـ **MAOIs** وذلك إذا إستعملت **بريزيما محلول** لفترة طويلة أو إذا كان المقادير الدوائي الذي إستعملته كبيراً. يجب الأدوية من فصيلة **MAOIs** من نوع **أ** (مثل: موكلوبيمييد، إينزوليد، ميتيل تيونينوم، كلوراييد الأزرق الميتيلين) من نوع **ب** (سيليجيلين) يمكن تناولها أثناء إستعمال **بريزيما محلول** بشرط أن يفحصك الطبيب أو أوقات مقاربة أكثر.
- ميتوبرولول (علاج قصور القلب؛ إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** يزيد من خطورة تباطؤ نظم القلب.
- كنت تستعمل دواء من الإدمان على الكحول. ممنوع أن تستهلك الكحول خلال فترة إستعمال **بريزيما محلول**.
- كنت تستعمل دواء من متلازمة وراثية نادرة في إطارها تعاني من قلة تحمل للفركتوز، خلل في إمتصاص الجلوكوز - جلاكتوز أو من سوء إمتصاص سوكراز - إيزومالتاز.
- كنت تستعمل دواء من فصيلة **MAOIs** (مثل حكة، إرتجاف، إنتفاخ الشفتين أو الوهج أو ضيق التنفس) توقف فوراً عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى طبيبك.
- كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (**MAOIs**) غير عكوسة وغير إنتقائية - إن إستعمال هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** قد يسبب حالات تشبه خطراً على حياتك (مثل أدوية علاج الإكتئاب: نيلاميد، إبيرونازيد، موديمييد، فينيلزين، تريتانسيلوسيرين، إيزوكاربازين، ثلوكستانون وإينزوليد (مضاد حيوي)).

الضرر البالدات. قد تتفاقم هذه الحالة في بداية العلاج بمضادات الإكتئاب وذلك لأن تأثير هذه الأدوية يبدأ بعد حوالي أسبوعين أو أكثر منذ بدء الإستعمال.

الأفكار الإنتحارية تكون أكثر شيوعاً إذا:

- كانت لديك في الماضي أفكار حول إحراق الضرر بالذات.
- كنت شاباً بالغاً، فقد أدبت المستعليات من الأبحاث السريرية إن هناك زيادة في إحتمال حدوث سلوك إنتحاري لدى كبار عمرهم أقل من 25 سنة والذين يعانون من حالات نفسية مختلفة وعولجوا بأدوية مضادة للإكتئاب. إذا ظهرت **أفكار إنتحارية** أو **أفكار حول إحراق الضرر بالذات توجه إلى الطبيب أو إلى المستشفى فوراً**.
- يوصى بإعلام قريب عائلة أو صديق مقرب** بأنك تعاني من الإكتئاب أو تقاسي من اضطرابات القلق واطلب منهم قراءة هذه النشرة. اطلب منهم أن ييلفوك فيما إذا لاحظوا تفاقم في الإكتئاب أو اضطرابات القلق الذي أو إذا كانوا قلقين من التغيرات في تصرفاتك.

الأطفال **والمراهقون**

إن المتعالجون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة معرضون لخطورة زائدة للمعاناة من أعراض جانبية، مثل محاولة الإنتحار، أفكار إنتحارية وعادية(خاصة عوانية، سلوك معارض ثلاثية الحلقة، أدوية لعلاج التلوث الجرثومي (مثل: سفارلوفاكسسين، موكسيفلوفاكسسين، إريثروميسين IV، فنتاميدين)، أدوية لعلاج الملاريا، الأخص هالوفانترين أو مضادات الهرماتين (ستيميزول، ميزولانسول). إن تناول هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** يمكن أن يزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

مضادات التحثر (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة)، قد تغير **بريزيما محلول** من تأثير هذه الأدوية في الدم، في حال بدء أو إنتهاء العلاج بـ **بريزيما محلول** أثناء، يشفك لك طبيبك **بريزيما محلول**، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، بمشاركة علاج نفسي، لأنه قد قرر أن تلك في مصلحتك، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، ووصف لك طبيبك **بريزيما محلول**، ورغببت مناقشة ذلك، فيرجى منك مراجعة طبيبك. إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، فعليك إعلام طبيبك إذا تطورت أو تفاقت إحدى الأعراض المتعلقة بأعلى خلال تناول **بريزيما محلول**.

- لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** لدى أطفال دون عمر 8 سنوات.
- التداخلات/التفاعلات بين الأدوية
- لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** لدى أطفال دون عمر 8 سنوات.

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدر **الطبيب** **أو** **للصيدي** **عن** **ذلك**؛ لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** مع:

- مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) التي يستعمل بعضها لعلاج الإكتئاب. لا يجوز إستعمال مثبطات مونوأمين أوكسيداز، غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) سوية مع **بريزيما محلول** خوفاً من رد فعل خطير لا بل مميت ("متلازمة السيروتونين") التي قد تحدث (انظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا")؛ يجب بدء العلاج بـ **بريزيما محلول** بعد أسبوعين على الأقل منذ التوقف عن إستعمال دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOI** (مثل تريتانسيلوسيرين). يجب الإنتظار 5 أسابيع على الأقل منذ التوقف عن إستعمال **بريزيما محلول** قبل بدء العلاج بمثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- سوف يدرس الطبيب فيما إذا كان يتوجب الإنتظار فترة زمنية أطول من 5 أسابيع قبل بدء العلاج بـ **MAOIs** وذلك إذا إستعملت **بريزيما محلول** لفترة طويلة أو إذا كان المقادير الدوائي الذي إستعملته كبيراً. يجب الأدوية من فصيلة **MAOIs** من نوع **أ** (مثل: موكلوبيمييد، إينزوليد، ميتيل تيونينوم، كلوراييد الأزرق الميتيلين) من نوع **ب** (سيليجيلين) يمكن تناولها أثناء إستعمال **بريزيما محلول** بشرط أن يفحصك الطبيب أو أوقات مقاربة أكثر.
- ميتوبرولول (علاج قصور القلب؛ إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** يزيد من خطورة تباطؤ نظم القلب.
- كنت تستعمل دواء من الإدمان على الكحول. ممنوع أن تستهلك الكحول خلال فترة إستعمال **بريزيما محلول**.
- كنت تستعمل دواء من متلازمة وراثية نادرة في إطارها تعاني من قلة تحمل للفركتوز، خلل في إمتصاص الجلوكوز - جلاكتوز أو من سوء إمتصاص سوكراز - إيزومالتاز.
- كنت تستعمل دواء من فصيلة **MAOIs** (مثل حكة، إرتجاف، إنتفاخ الشفتين أو الوهج أو ضيق التنفس) توقف فوراً عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى طبيبك.
- كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (**MAOIs**) غير عكوسة وغير إنتقائية - إن إستعمال هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** قد يسبب أعراض لثلال الحول الوظيفي الجنسي. في حالات معينة إستمرت تلك الأعراض بعد إيقاف العلاج.
- أفكار حول الإحترار وتفاقم الإكتئاب**

إذا كنت تشعر بإحتمال و/أو تعاني من اضطرابات القلق فإنك قد تفكر أحياناً بإحراق

بمثاقول مستعدي أخفض من الأدوية من فصيلة **MAOI-A**.

- ميكورتازين (دواء لعلاج الحساسية)؛ إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** قد يزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

● مينيوتينين (علاج الصرع)؛ قد يُغير **بريزيما محلول** من نسبة الدواء في الدم. من الجائز أن يبدأ الطبيب العلاج بـ فينيوتينين بخدر شديد ويدرس إجراء مراقبة حثيثة لوصفك.

- أدوية ترفع من نسبة السيروتونين مثل: ليتيوم، سيليجيلين، مستحضرات تحتوي على نبات هيبيريكوم (St. John's Wort)، ترامادول (تسكين الألام)، أدوية تحتوي قشعريرة/رجفان، ضعف العضلات، بكاء مستمر وضعويات في الرضاعة وفي النوم.
- بريزيما محلول** قد تؤدي لزيادة وتيرة حدوث متلازمة السيروتونين. من الجائز أن يقوم الطبيب بإجراء فحوص مراقبة في أوقات متقاربة أكثر.

أدوية التي قد تؤثر على نظم القلب مثل مضادات الالتهبية من فصيلة **IA** و- **III**، أدوية مضادة للذهان (مثل: مشتقات فينوتيازين، بيموزيد، هالوبيريديول)، مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة، أدوية لعلاج التلوث الجرثومي (مثل: سفارلوفاكسسين، موكسيفلوفاكسسين، إريثروميسين IV، فنتاميدين)، أدوية لعلاج الملاريا، الأخص هالوفانترين أو مضادات الهرماتين (ستيميزول، ميزولانسول). إن تناول هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** يمكن أن يزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

مضادات التحثر (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة)، قد تغير **بريزيما محلول** من تأثير هذه الأدوية في الدم، في حال بدء أو إنتهاء العلاج بـ **بريزيما محلول** أثناء، يشفك لك طبيبك **بريزيما محلول**، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، بمشاركة علاج نفسي، لأنه قد قرر أن تلك في مصلحتك، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، ووصف لك طبيبك **بريزيما محلول**، ورغببت مناقشة ذلك، فيرجى منك مراجعة طبيبك. إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، فعليك إعلام طبيبك إذا تطورت أو تفاقت إحدى الأعراض المتعلقة بأعلى خلال تناول **بريزيما محلول**.

مضادات الإتهاب (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة)، قد تغير **بريزيما محلول** من تأثير هذه الأدوية في الدم، في حال بدء أو إنتهاء العلاج بـ **بريزيما محلول** أثناء، يشفك لك طبيبك **بريزيما محلول**، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، بمشاركة علاج نفسي، لأنه قد قرر أن تلك في مصلحتك، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، ووصف لك طبيبك **بريزيما محلول**، ورغببت مناقشة ذلك، فيرجى منك مراجعة طبيبك. إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، فعليك إعلام طبيبك إذا تطورت أو تفاقت إحدى الأعراض المتعلقة بأعلى خلال تناول **بريزيما محلول**.

- لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** لدى أطفال دون عمر 8 سنوات.
- التداخلات/التفاعلات بين الأدوية
- لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** لدى أطفال دون عمر 8 سنوات.

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدر **الطبيب** **أو** **للصيدي** **عن** **ذلك**؛ لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** مع:

- مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) التي يستعمل بعضها لعلاج الإكتئاب. لا يجوز إستعمال مثبطات مونوأمين أوكسيداز، غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) سوية مع **بريزيما محلول** خوفاً من رد فعل خطير لا بل مميت ("متلازمة السيروتونين") التي قد تحدث (انظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا")؛ يجب بدء العلاج بـ **بريزيما محلول** بعد أسبوعين على الأقل منذ التوقف عن إستعمال دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOI** (مثل تريتانسيلوسيرين). يجب الإنتظار 5 أسابيع على الأقل منذ التوقف عن إستعمال **بريزيما محلول** قبل بدء العلاج بمثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- سوف يدرس الطبيب فيما إذا كان يتوجب الإنتظار فترة زمنية أطول من 5 أسابيع قبل بدء العلاج بـ **MAOIs** وذلك إذا إستعملت **بريزيما محلول** لفترة طويلة أو إذا كان المقادير الدوائي الذي إستعملته كبيراً. يجب الأدوية من فصيلة **MAOIs** من نوع **أ** (مثل: موكلوبيمييد، إينزوليد، ميتيل تيونينوم، كلوراييد الأزرق الميتيلين) من نوع **ب** (سيليجيلين) يمكن تناولها أثناء إستعمال **بريزيما محلول** بشرط أن يفحصك الطبيب أو أوقات مقاربة أكثر.
- ميتوبرولول (علاج قصور القلب؛ إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** يزيد من خطورة تباطؤ نظم القلب.
- كنت تستعمل دواء من الإدمان على الكحول. ممنوع أن تستهلك الكحول خلال فترة إستعمال **بريزيما محلول**.
- كنت تستعمل دواء من متلازمة وراثية نادرة في إطارها تعاني من قلة تحمل للفركتوز، خلل في إمتصاص الجلوكوز - جلاكتوز أو من سوء إمتصاص سوكراز - إيزومالتاز.
- كنت تستعمل دواء من فصيلة **MAOIs** (مثل حكة، إرتجاف، إنتفاخ الشفتين أو الوهج أو ضيق التنفس) توقف فوراً عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى طبيبك.
- كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (**MAOIs**) غير عكوسة وغير إنتقائية - إن إستعمال هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** قد يسبب أعراض لثلال الحول الوظيفي الجنسي. في حالات معينة إستمرت تلك الأعراض بعد إيقاف العلاج.
- أفكار حول الإحترار وتفاقم الإكتئاب**

إذا كنت تشعر بإحتمال و/أو تعاني من اضطرابات القلق فإنك قد تفكر أحياناً بإحراق

بمثاقول مستعدي أخفض من الأدوية من فصيلة **MAOI-A**.
● ميكورتازين (دواء لعلاج الحساسية)؛ إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** قد يزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

● مينيوتينين (علاج الصرع)؛ قد يُغير **بريزيما محلول** من نسبة الدواء في الدم. من الجائز أن يبدأ الطبيب العلاج بـ فينيوتينين بخدر شديد ويدرس إجراء مراقبة حثيثة لوصفك.

- أدوية ترفع من نسبة السيروتونين مثل: ليتيوم، سيليجيلين، مستحضرات تحتوي على نبات هيبيريكوم (St. John's Wort)، ترامادول (تسكين الألام)، أدوية تحتوي قشعريرة/رجفان، ضعف العضلات، بكاء مستمر وضعويات في الرضاعة وفي النوم.
- بريزيما محلول** قد تؤدي لزيادة وتيرة حدوث متلازمة السيروتونين. من الجائز أن يقوم الطبيب بإجراء فحوص مراقبة في أوقات متقاربة أكثر.

أدوية التي قد تؤثر على نظم القلب مثل مضادات الالتهبية من فصيلة **IA** و- **III**، أدوية مضادة للذهان (مثل: مشتقات فينوتيازين، بيموزيد، هالوبيريديول)، مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة، أدوية لعلاج التلوث الجرثومي (مثل: سفارلوفاكسسين، موكسيفلوفاكسسين، إريثروميسين IV، فنتاميدين)، أدوية لعلاج الملاريا، الأخص هالوفانترين أو مضادات الهرماتين (ستيميزول، ميزولانسول). إن تناول هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** يمكن أن يزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

مضادات التحثر (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة)، قد تغير **بريزيما محلول** من تأثير هذه الأدوية في الدم، في حال بدء أو إنتهاء العلاج بـ **بريزيما محلول** أثناء، يشفك لك طبيبك **بريزيما محلول**، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، بمشاركة علاج نفسي، لأنه قد قرر أن تلك في مصلحتك، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، ووصف لك طبيبك **بريزيما محلول**، ورغببت مناقشة ذلك، فيرجى منك مراجعة طبيبك. إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، فعليك إعلام طبيبك إذا تطورت أو تفاقت إحدى الأعراض المتعلقة بأعلى خلال تناول **بريزيما محلول**.

مضادات الإتهاب (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة)، قد تغير **بريزيما محلول** من تأثير هذه الأدوية في الدم، في حال بدء أو إنتهاء العلاج بـ **بريزيما محلول** أثناء، يشفك لك طبيبك **بريزيما محلول**، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، بمشاركة علاج نفسي، لأنه قد قرر أن تلك في مصلحتك، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، ووصف لك طبيبك **بريزيما محلول**، ورغببت مناقشة ذلك، فيرجى منك مراجعة طبيبك. إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، فعليك إعلام طبيبك إذا تطورت أو تفاقت إحدى الأعراض المتعلقة بأعلى خلال تناول **بريزيما محلول**.

- لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** لدى أطفال دون عمر 8 سنوات.
- التداخلات/التفاعلات بين الأدوية
- لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** لدى أطفال دون عمر 8 سنوات.

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدر **الطبيب** **أو** **للصيدي** **عن** **ذلك**؛ لا يجوز إستعمال **بريزيما محلول** مع:

- مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) التي يستعمل بعضها لعلاج الإكتئاب. لا يجوز إستعمال مثبطات مونوأمين أوكسيداز، غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**) سوية مع **بريزيما محلول** خوفاً من رد فعل خطير لا بل مميت ("متلازمة السيروتونين") التي قد تحدث (انظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا")؛ يجب بدء العلاج بـ **بريزيما محلول** بعد أسبوعين على الأقل منذ التوقف عن إستعمال دواء من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOI** (مثل تريتانسيلوسيرين). يجب الإنتظار 5 أسابيع على الأقل منذ التوقف عن إستعمال **بريزيما محلول** قبل بدء العلاج بمثبطات مونوأمين أوكسيداز غير العكوسة، إلا الإنتقائية (**MAOIs**)
- سوف يدرس الطبيب فيما إذا كان يتوجب الإنتظار فترة زمنية أطول من 5 أسابيع قبل بدء العلاج بـ **MAOIs** وذلك إذا إستعملت **بريزيما محلول** لفترة طويلة أو إذا كان المقادير الدوائي الذي إستعملته كبيراً. يجب الأدوية من فصيلة **MAOIs** من نوع **أ** (مثل: موكلوبيمييد، إينزوليد، ميتيل تيونينوم، كلوراييد الأزرق الميتيلين) من نوع **ب** (سيليجيلين) يمكن تناولها أثناء إستعمال **بريزيما محلول** بشرط أن يفحصك الطبيب أو أوقات مقاربة أكثر.
- ميتوبرولول (علاج قصور القلب؛ إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** يزيد من خطورة تباطؤ نظم القلب.
- كنت تستعمل دواء من الإدمان على الكحول. ممنوع أن تستهلك الكحول خلال فترة إستعمال **بريزيما محلول**.
- كنت تستعمل دواء من متلازمة وراثية نادرة في إطارها تعاني من قلة تحمل للفركتوز، خلل في إمتصاص الجلوكوز - جلاكتوز أو من سوء إمتصاص سوكراز - إيزومالتاز.
- كنت تستعمل دواء من فصيلة **MAOIs** (مثل حكة، إرتجاف، إنتفاخ الشفتين أو الوهج أو ضيق التنفس) توقف فوراً عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى طبيبك.
- كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (**MAOIs**) غير عكوسة وغير إنتقائية - إن إستعمال هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** قد يسبب أعراض لثلال الحول الوظيفي الجنسي. في حالات معينة إستمرت تلك الأعراض بعد إيقاف العلاج.
- أفكار حول الإحترار وتفاقم الإكتئاب**

إذا كنت تشعر بإحتمال و/أو تعاني من اضطرابات القلق فإنك قد تفكر أحياناً بإحراق

بمثاقول مستعدي أخفض من الأدوية من فصيلة **MAOI-A**.
● ميكورتازين (دواء لعلاج الحساسية)؛ إن تناوله سوية مع **بريزيما محلول** قد يزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

● مينيوتينين (علاج الصرع)؛ قد يُغير **بريزيما محلول** من نسبة الدواء في الدم. من الجائز أن يبدأ الطبيب العلاج بـ فينيوتينين بخدر شديد ويدرس إجراء مراقبة حثيثة لوصفك.

أدوية ترفع من نسبة السيروتونين مثل: ليتيوم، سيليجيلين، مستحضرات تحتوي على نبات هيبيريكوم (St. John's Wort)، ترامادول (تسكين الألام)، أدوية تحتوي قشعريرة/رجفان، ضعف العضلات، بكاء مستمر وضعويات في الرضاعة وفي النوم.

● **بريزيما محلول** قد تؤدي لزيادة وتيرة حدوث متلازمة السيروتونين. من الجائز أن يقوم الطبيب بإجراء فحوص مراقبة في أوقات متقاربة أكثر.

أدوية التي قد تؤثر على نظم القلب مثل مضادات الالتهبية من فصيلة **IA** و- **III**، أدوية مضادة للذهان (مثل: مشتقات فينوتيازين، بيموزيد، هالوبيريديول)، مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة، أدوية لعلاج التلوث الجرثومي (مثل: سفارلوفاكسسين، موكسيفلوفاكسسين، إريثروميسين IV، فنتاميدين)، أدوية لعلاج الملاريا، الأخص هالوفانترين أو مضادات الهرماتين (ستيميزول، ميزولانسول). إن تناول هذه الأدوية سوية مع **بريزيما محلول** يمكن أن يزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

مضادات التحثر (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة)، قد تغير **بريزيما محلول** من تأثير هذه الأدوية في الدم، في حال بدء أو إنتهاء العلاج بـ **بريزيما محلول** أثناء، يشفك لك طبيبك **بريزيما محلول**، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، بمشاركة علاج نفسي، لأنه قد قرر أن تلك في مصلحتك، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، ووصف لك طبيبك **بريزيما محلول**، ورغببت مناقشة ذلك، فيرجى منك مراجعة طبيبك. إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، فعليك إعلام طبيبك إذا تطورت أو تفاقت إحدى الأعراض المتعلقة بأعلى خلال تناول **بريزيما محلول**.

مضادات الإتهاب (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة)، قد تغير **بريزيما محلول** من تأثير هذه الأدوية في الدم، في حال بدء أو إنتهاء العلاج بـ **بريزيما محلول** أثناء، يشفك لك طبيبك **بريزيما محلول**، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، بمشاركة علاج نفسي، لأنه قد قرر أن تلك في مصلحتك، إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، ووصف لك طبيبك **بريزيما محلول**، ورغببت مناقشة ذلك، فيرجى منك مراجعة طبيبك. إذا كنت تبلغ من العمر دون 18 سنة، فعليك إعلام طبيبك إذا تطورت أو تفاقت إحدى الأعراض المتعلقة بأعلى خلال تناول **بريزيما محلول**.

وأن يبدو أرق اللون. تظهر هذه الأعراض عادة خلال **24** ساعة الأولى بعد الولادة. إذا ظهر أي عرض من تلك الأعراض لدى رضيعك، أو إذا كنت قلقة لصحة رضيعك، فعليك التوجه فوراً إلى الطبيب.

يُفضل عدم إستعمال **بريزيما محلول** خلال الحمل إلا إذا كانت الفائدة من الإستعمال تزيد عن المخاطر المحتملة من الأبحاث السريرية إن ذلك، عليك أنت وطبيبك التقررير بالتوقف عن إستعمال **بريزيما محلول** بشكل تدريجي عندما تكوني حاملاً أو عندما تخططين للحمل.

يجب التنصفر بخدر عند إستعمال الدواء خلال الحمل، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل وقبل الولادة وذلك لأنه يُبلَع من حودن الأعراض التالية لدى الرضع حديثي الولادة: هياج، قشعريرة/رجفان، ضعف العضلات، بكاء مستمر وضعويات في الرضاعة وفي النوم.

إذا كنت تستعملين **بريزيما محلول** قريباً من نهاية فترة الحمل، فقد تكون هناك خطورة أكبر لحدوث زُفٍّ مهليي شديد بعد مدة قصيرة من الولادة، خاصة إذا وُجدت لديك سابقة لأزفة. عليك إبلاغ الطبيب بأنك تستعملين **بريزيما محلول** لكي يكون بإمكانه تقديم الإستشارة لك.

مضادات التحثر (مثل وارفارين)، مضادات الإتهاب الستيرويدية (NSAID) (مثل إيبوبروفين، نيكوفانيك)، إسبرين وأدوية إضافية يمكنها تسببع الدم (بما في ذلك كلوراييد، يستعمل لعلاج إضطرابات نفسية