



**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986** התרופה משוקת על פי מרשם רבילב

## פריזמה/פריזמה פורטה טבליות

**הרכב:**

כל טבליה של **פריזמה** מכילה:

בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs), מאחר שעלויות פלואוקסטין (כהידרוכלוריד) 20 מ"ג

פלואוקסטין (כהידרוכלוריד) 60 מ"ג

כל טבליה של **פריזמה פורטה** מכילה: פלואוקסטין (כהידרוכלוריד) 60 מ"ג

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה טעיף 6 "מידע נוסף"

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם שתשמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו הרופא לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי צמחם הפוראי דומה.

**תרופות נוגדות דיכאון (Antidepressants) מעלות את הסיכון להתנהגות ולמחשבות אובדניות בילדים, במתבגרים ובמבוגרים צעירים.** עם חגילת הילדים בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים והקבוצה לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון: החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה. אם הליים שינויים כגון אלה, יש לפנות מייד לרופא.

- למה מיעודת התרופה?**

**פריזמה/פריזמה פורטה** מיעדת לטיפול ב:

- מבוגרים:**
- אפירודת דיכאון מג'רויות.
- אפירודת כפייתית טורדנית (OCD).
- בולמוס אכילה (בולימיה נרבהה); פלואוקסטין ניתנת כטיפול משלים לפסיכותרפיה לצורך הפחתה של התקפי זליה בלתי נשלטים והפרעת התרודה.

**ילדים ומתבגרים מגיל 8 ומעלה:**

אפירודה בינונית עד חמורה של דיכאון מג'רוי. אם הדיכאון לא הגבי לטיפול פסיכולוגי של 4-6 מפגשים. לילד או לאדם צעיר עם דיכאון בינוני עד חמור יש להציע תרופות נוגדות דיכאון רק בשילוב עם טיפול פסיכולוגי הניתן במקביל.

**קבוצה תרופיסית: פריזמה/פריזמה פורטה** שייכת לקבוצת תרופות אנטי-דיכאויות מסוג מעכבים סלקטיביים של קליטה חוזרת של סרוטונין (SSRI).

**כיצד פריזמה/פריזמה פורטה פורטה נבדנת:**

במחול של כל אחד מצוי חומר המכונה סרוטונין. אצל אנשים שסובלים מדיכאון, המהפרעה טורדנית כפייתית או מבולימיה נרבהה יש רמת סרוטונין נמוכות יותר בהתאמה לאנשים אחרים. אופן הפעולה של **פריזמה/פריזמה פורטה** של תכשירי SSRI אחרים הוא ברור במלואו, אך הם עשויים לסייע באמצעות העלאת הרמה של סרוטונין במוח.

טיפול בהפרעות אלו הוא חשוב בכדי לעזור לך בשיפור מצבך. אם ההפרעה אינה משופרת, היא עלולה שלא לחלוף זליה עלולה להפוך לחמורה יותר ולקשח יותר לטיפול.

ייתכן כי תחזיק לטיפול במשך מספר שבועות או חודשים על מנת להבטיח כי התסמינים שלך חלפו.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם אתה:**

- רגיש (אלרגי) לפלואוקסטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שאחלה התרופה (מפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף").
- אם אתה סובל מחלת פריחה או תגובות אלרגיות אחרות (כגון גרד, נפיחות בשפתיים או בפיים או קוצר נשימה).**
- הפסק מייד את נטילת הטבליות ופנה לרופא באופן מיידי.**

נטול תרופות אחרות הידועות כמעכבי מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs), מאחר שעלויות להתרחש תגובות חמורות ואף קטלניות (למשל, איפרוניאזיד המשמש לטיפול בדיכאון).

יש להחליף בטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה** אך ורק בחלוף שבועיים לאחר הפסקת הטיפול ב-MAOI בלתי הפיך שאינו סלקטיבי.

**אין לטילול** כל MAOI בלתי הפיך שאינו סלקטיבי במשך לפחות 5 שבועות לאחר הפסקת נטילת **פריזמה/פריזמה פורטה**. אם **פריזמה/פריזמה פורטה** פורטה ארוכה הוא במינון גבוה, על הרופא לשקול מרווח זמן ארוך יותר.

נטול מופרולול (טיפול באי-ספיקת לב), מאחר שקיים סיכון מוגבר לזרע קשקע הלב שלך (לראיטי מדי.

**אזהרות וכתובות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה ספר לרופא אם אחד המצבים הבאים לרונטי לבג'ך:**

בעיות לב.

הופעת חום, נוקשות שרירים או רעד, שינויים במצבך הנפשי כגון בלבול, עצבנות וסערת רוחות קצונית; ייתכן כי אתה סובל מ"תסמונת סרוטונין" או מ"תסמונת נירולפטית ממאירה". אף על פי שתסמונת זו מתרחשת לעיתים נדירות, היא עלולה להוביל למצבים שליליים הליים מסכני חיים. **פנה לרופא באופן מיידי** מאחר שיתכן כי יש צורך בהפסקת הטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה**.

- מגיה כעת או בעבר; אם אתה סובל מאירוע מאני. פנה לרופא באופן מיידי מאחר שיתכן כי יש צורך בהפסקת הטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה**.
- היסטוריה של הפרעות דמם או הופעת חבורות או דימום חריג, או אם את בהיריון (ראי בסעיף 2 "היריון הנקה ופוריות").
- טיפול מתמשך בתרופות המדלדלות את הדם (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות").
- אפילפסיה או פרכוסים. אם אתה סובל מפרכוס או מבחין בעלייה בחיריות הפרכוסים, פנה לרופא באופן מיידי. ייתכן שיש צורך בהפסקת הטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה**.
- תכשירים מסוימים (למשל חשמל (שוק חשמלי).
- טיפול מתמשך ב-ECT (טיפול במשך חשמל (שוק חשמלי)).
- טיפול מתמשך בטמוקסיפן (הטיפול בטרופן שד) (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות").

מתחיל לחשו חוסר מנוחה ואיני יכול לשבת או לעמוד ללא תחוה לחמור יותר. העלאת המינון של **פריזמה/פריזמה פורטה** עלולה להחמיר זאת.

סוכרת (לקחי כדורים). הטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה** אינו מסייע לטיפול בגלוקוז (סוכרת).

בעיות כבד (ייתכן כי הרופא יצטרך להתאים את המינון שלך).

קצב לב איטי במנוחה הוא או ידוע לך שאחת עלול לסבול מחסור במלח כתוצאה מהשילוב והקאות באופן חמור מומשך, או שימוש בשתנים.

- טיפול מתמשך במשנים, במיוחד אם אתה קשיש.
- גלאוקומה (לחץ תוך-עיני מוגבר).

**מחשבות על התאבדות והחמרת הדיכאון או הפרעות חרדה** אם אתה סובל מדיכאון ו/ או מהפרעות חרדה, אתה עלול לעיתים לסבול ממחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות. תופעה זו עלולה להיות מוגברת כאשר מחחילים לראשונה

טיפול בנוגדי דיכאון. מאחר שלכל התרופות הללו נדרש זמן על מנת להתחיל לפעול, בדרך כלל שבועיים אך לעיתים פרק זמן ממושך יותר. יותר סביר שכבועים כן:

- אם סבלת בעבר מחשבות על התאבדות או פגיעה עצמית.
- אם אתה סובל בגורג צעיר. מידע מניסויים קליניים הראה כיסוון מוגבר להתנהגות אובדנית במבוגרים עם הפרעות פסיכיאטריות בני פחות מ-25 שנים אשר טולו בנוגד דיכאון. אם אתה סובל ממחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות בכל זמן, **פנה מייד אל הרופא או לבית חולים.**

**ייתכן כי יעזור לך אם תספר לכן משפחה או לחבר קרוב** שאתה סובל מדיכאון או מהפרעת חרדה ותבקש מהם לקרוא עלון זה. אתה יכול לבקש מהם לייצע אותך אם הם חושבים שהדיכאון או החרדה שלך מחמירים, או אם הם מודאגים לגבי שנייהם בהתנהגותך.

**ילדים ומתבגרים מגיל 8 עד 18**

מטופלים מתחת לגיל 18 נמצאים בסיכון מוגבר לסבול מתופעות תרופה זו עם פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הסיכון לשינויים בפעילות החשמלית של הלב.

פניטאיין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), מאחר שפריזמה פורטה **פורטה** עלולה להגביר את הרמת של פניטאיין (הטיפול ב**פריזמה פורטה** רק לטיפול באפירודת דיכאון מצורפת בינונית זו).

על ממורות (בשילוב עם טיפול פסיכולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע מוגבל בנוגע לבטיחות ארוכת הטוח של פריזמה/פריזמה פורטה לגבי גידלה, התבגרות וההתפתחות הרגשית, ההתנהגותית בקבוצת גיל זו. למרות זאת, אם אתה מתחת לגיל 18, ייתכן כי הרופא שלך ירשום לך פריזמה/פריזמה פורטה לטיפול באפירודת דיכאון מג'רויות בעת מוירות עד חמורות, בשילוב עם טיפול פסיכולוגי. ייתכן שתפגוש את הרופא שלך או אחד מהתסמינים המפורטים לעיל מתפתח או מחמיר בעת נטילת פריזמה/פריזמה פורטה.

**אין להשתמש בפריזמה/פריזמה פורטה בילדים מתחת לגיל 8.**

**הפרעות בתפקוד המיני**

תרופות כמו **פריזמה/פריזמה פורטה** (שנקראות SSRI) עלולות לגרום לתסמינים של תפקוד מיני לקוי (ראה טעיף 4 "תופעות לוואי").

במקרים מסוימים, התסמינים הללו נמשכו לאחר הפסקת הטיפול.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרנה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**אין לטילול פריזמה/פריזמה פורטה עם:**

- תכשירים מסוימים מסוג מעכבי מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs), שחלקם משמשים לטיפול בדיכאון. אין להשתמש ב-MAOIs בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים עם **פריזמה/פריזמה פורטה** מאחר שעלויות להתרחש תגובות חמורות או אף קטלניות (תסמונת סרוטונין) (ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם אתה") אפשר להתחיל בטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה** אך ורק בחלוף שבועיים לאחר הפסקת הטיפול ב-MAOI בלתי הפיך שאינו סלקטיבי (לדוגמה טריפטרילינולין (transylcypromine)).

**אין לטילול** כל מעכב מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיך שאינו סלקטיבי במשך לפחות 5 שבועות לאחר הפסקת נטילת **פריזמה/פריזמה פורטה**. אם **פריזמה/פריזמה פורטה** פורטה ארוכה הוא במינון גבוה, ייתכן כי הרופא יצטרך לשקול מרווח זמן ממושך יותר (5-7 שבועות).

מטופרולול (Metoprolol), כאשר הוא משמש לטיפול באי-ספיקת לב; קיים סיכון מוגבר לכך שקצב הלב שלך יהפוך לאיטי מדי.

**פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להשפיע על אופן הפעולה של התרופות הבאות (תגובה):**

- טמוקסיפן (Tamoxifen, משמש לטיפול בסרטן השד); מאחר שפריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הרמת של התרופה זו בדם, עלול להוביל להפחתה אפשרית בהשפעת טמוקסיפן. ייתכן כי הרופא יצטרך לשקול ירשום של טיפול אחר נוגד דיכאון.

מעכבי מונואמיין אוקסידאז (MAOI-A) לרבות מוקלובמיד (linezolid), לינוליד (linezolid, תרופה אנטיביוטי) ומתיל תיוניניום כלוריד (methylthionium chloride, תרופה המשמשת לטיפול במטהמגולובינמיה כתוצאה מחשיפה לתרופה או לחומר כימי).

בשל הסיכון לתגובות חמורות או אף קטלניות (תסמונת סרוטונין). ניתן להתחיל בטיפול בפלואוקסטין ביום שלאחר הפסקת הטיפול ב-MAOIs הפיכים, אך ייתכן כי הרופא ירצה לעקוב אחרך בקפידה ולהשתמש במינון נמוך יותר של התרופה ה-MAOI.

- מקוויטאזין (mequitazine, לטיפול באלרגיות), מאחר שנטילת תרופה זו עם **פריזמה/פריזמה פורטה** עלולה להגביר את הסיכון לשינויים בפעילות החשמלית של הלב.
- פניטאיין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), מאחר שפריזמה פורטה **פורטה** עלולה להגביר את הרמת של פניטאיין (הטיפול ב**פריזמה פורטה** רק לטיפול באפירודת דיכאון מצורפת בינונית זו).
- על ממורות (בשילוב עם טיפול פסיכולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע מוגבל בנוגע לבטיחות ארוכת הטוח של תרופה זו עם פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הסיכון לשינויים בפעילות החשמלית של הלב.

פניטאיין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), מאחר שפריזמה פורטה **פורטה** עלולה להגביר את הרמת של פניטאיין (הטיפול ב**פריזמה פורטה** רק לטיפול באפירודת דיכאון מצורפת בינונית זו).

על ממורות (בשילוב עם טיפול פסיכולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע מוגבל בנוגע לבטיחות ארוכת הטוח של פריזמה/פריזמה פורטה לגבי גידלה, התבגרות וההתפתחות הרגשית, ההתנהגותית בקבוצת גיל זו. למרות זאת, אם אתה מתחת לגיל 18, ייתכן כי הרופא שלך ירשום לך פריזמה/פריזמה פורטה לטיפול באפירודת דיכאון מג'רויות בעת מוירות עד חמורות, בשילוב עם טיפול פסיכולוגי. ייתכן שתפגוש את הרופא שלך או אחד מהתסמינים המפורטים לעיל מתפתח או מחמיר בעת נטילת פריזמה/פריזמה פורטה.

**אין להשתמש בפריזמה/פריזמה פורטה בילדים מתחת לגיל 8.**

**הפרעות בתפקוד המיני**

תרופות כמו **פריזמה/פריזמה פורטה** (שנקראות SSRI) עלולות לגרום לתסמינים של תפקוד מיני לקוי (ראה טעיף 4 "תופעות לוואי").

במקרים מסוימים, התסמינים הללו נמשכו לאחר הפסקת הטיפול.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרנה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**אין לטילול פריזמה/פריזמה פורטה עם:**

- תכשירים מסוימים מסוג מעכבי מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs), שחלקם משמשים לטיפול בדיכאון. אין להשתמש ב-MAOIs בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים עם **פריזמה/פריזמה פורטה** מאחר שעלויות להתרחש תגובות חמורות או אף קטלניות (תסמונת סרוטונין) (ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם אתה") אפשר להתחיל בטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה** אך ורק בחלוף שבועיים לאחר הפסקת הטיפול ב-MAOI בלתי הפיך שאינו סלקטיבי (לדוגמה טריפטרילינולין (transylcypromine)).

**אין לטילול** כל מעכב מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיך שאינו סלקטיבי במשך לפחות 5 שבועות לאחר הפסקת נטילת **פריזמה/פריזמה פורטה**. אם **פריזמה/פריזמה פורטה** פורטה ארוכה הוא במינון גבוה, ייתכן כי הרופא יצטרך לשקול מרווח זמן ממושך יותר (5-7 שבועות).

מטופרולול (Metoprolol), כאשר הוא משמש לטיפול באי-ספיקת לב; קיים סיכון מוגבר לכך שקצב הלב שלך יהפוך לאיטי מדי.

**פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להשפיע על אופן הפעולה של התרופות הבאות (תגובה):**

(bupropion), מפלוקווין (mefloquine) או כלורוקווין (chloroquine), משמשות לטיפול במלריה), טרמדול (tramadol), משמשות לטיפול בכאב חמור) או תרופות אנטי-פסיכוטיות כגון נופתיאזינים (phenothiazines) או בטרופרונטי (butyrophenyl), מאחר ש**פריזמה/פריזמה פורטה** עלולה להגביר את הסיכון לפרכוסים בעת נטילה עם תרופות אלו.

● פלקאיניד (flecainide), פרופאפנון (propafenone), נביבולול (nebiivolol) או אנקאיניד (encainide, לטיפול

בבעיות לב), קארבאמאזפין (carbamazepine, לטיפול באפילפסיה), אטמוקסטיין (atomoxetine) או נוגדי דיכאון טריפזיליים (לדוגמה אימפרמיין (imipramine), דספרמיין (desipramine) ואמיטרפטיילין (amitriptyline) או ריספרידון (risperidone), לטיפול בסכיזופרניה). מאחר ש**פריזמה/פריזמה פורטה** עלולה להגביר את רמות התרופות הללו בדם,

ייתכן כי הרופא יצטרך להפחית את רמות המינון שלהן בעת מתן מעכבי מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs), מאחר שנטילת תרופה זו עם פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הסיכון לשינויים בפעילות החשמלית של הלב.

פניטאיין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), מאחר שפריזמה פורטה **פורטה** עלולה להגביר את הרמת של פניטאיין (הטיפול ב**פריזמה פורטה** רק לטיפול באפירודת דיכאון מצורפת בינונית זו).

על ממורות (בשילוב עם טיפול פסיכולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע מוגבל בנוגע לבטיחות ארוכת הטוח של תרופה זו עם פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הסיכון לשינויים בפעילות החשמלית של הלב.

פניטאיין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), מאחר שפריזמה פורטה **פורטה** עלולה להגביר את הרמת של פניטאיין (הטיפול ב**פריזמה פורטה** רק לטיפול באפירודת דיכאון מצורפת בינונית זו).

על ממורות (בשילוב עם טיפול פסיכולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע מוגבל בנוגע לבטיחות ארוכת הטוח של פריזמה/פריזמה פורטה לגבי גידלה, התבגרות וההתפתחות הרגשית, ההתנהגותית בקבוצת גיל זו. למרות זאת, אם אתה מתחת לגיל 18, ייתכן כי הרופא שלך ירשום לך פריזמה/פריזמה פורטה לטיפול באפירודת דיכאון מג'רויות בעת מוירות עד חמורות, בשילוב עם טיפול פסיכולוגי. ייתכן שתפגוש את הרופא שלך או אחד מהתסמינים המפורטים לעיל מתפתח או מחמיר בעת נטילת פריזמה/פריזמה פורטה.

**אין להשתמש בפריזמה/פריזמה פורטה בילדים מתחת לגיל 8.**

**הפרעות בתפקוד המיני**

תרופות כמו **פריזמה/פריזמה פורטה** (שנקראות SSRI) עלולות לגרום לתסמינים של תפקוד מיני לקוי (ראה טעיף 4 "תופעות לוואי").

במקרים מסוימים, התסמינים הללו נמשכו לאחר הפסקת הטיפול.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרנה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**אין לטילול פריזמה/פריזמה פורטה עם:**

- תכשירים מסוימים מסוג מעכבי מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs), שחלקם משמשים לטיפול בדיכאון. אין להשתמש ב-MAOIs בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים עם **פריזמה/פריזמה פורטה** מאחר שעלויות להתרחש תגובות חמורות או אף קטלניות (תסמונת סרוטונין) (ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם אתה") אפשר להתחיל בטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה** אך ורק בחלוף שבועיים לאחר הפסקת הטיפול ב-MAOI בלתי הפיך שאינו סלקטיבי (לדוגמה טריפטרילינולין (transylcypromine)).

**אין לטילול** כל מעכב מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיך שאינו סלקטיבי במשך לפחות 5 שבועות לאחר הפסקת נטילת **פריזמה/פריזמה פורטה**. אם **פריזמה/פריזמה פורטה** פורטה ארוכה הוא במינון גבוה, ייתכן כי הרופא יצטרך לשקול מרווח זמן ממושך יותר (5-7 שבועות).

מטופרולול (Metoprolol), כאשר הוא משמש לטיפול באי-ספיקת לב; קיים סיכון מוגבר לכך שקצב הלב שלך יהפוך לאיטי מדי.

**פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להשפיע על אופן הפעולה של התרופות הבאות (תגובה):**

פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הסיכון לתופעות לוואי כגון דיכאון, הפרעות תנועה, הפרעות תפקודיות, כגון **פריזמה/פריזמה פורטה** עלולות להשפיע על השיפוט או הקואורדינציה שלך. אין לנהוג או להשתמש במכוונת עד אשר תדע כיצד **פריזמה/פריזמה פורטה** משפיע עליך.

● פלקאיניד (flecainide), פרופאפנון (propafenone), נביבולול (nebiivolol) או אנקאיניד (encainide, לטיפול

בבעיות לב), קארבאמאזפין (carbamazepine, לטיפול באפילפסיה), אטמוקסטיין (atomoxetine) או נוגדי דיכאון טריפזיליים (לדוגמה אימפרמיין (imipramine), דספרמיין (desipramine) ואמיטרפטיילין (amitriptyline) או ריספרידון (risperidone), לטיפול בסכיזופרניה). מאחר ש**פריזמה/פריזמה פורטה** עלולה להגביר את רמות התרופות הללו בדם,

ייתכן כי הרופא יצטרך להפחית את רמות המינון שלהן בעת מתן מעכבי מונואמיין אוקסידאז בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs), מאחר שנטילת תרופה זו עם פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הסיכון לשינויים בפעילות החשמלית של הלב.

פניטאיין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), מאחר שפריזמה פורטה **פורטה** עלולה להגביר את הרמת של פניטאיין (הטיפול ב**פריזמה פורטה** רק לטיפול באפירודת דיכאון מצורפת בינונית זו).

על ממורות (בשילוב עם טיפול פסיכולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע מוגבל בנוגע לבטיחות ארוכת הטוח של תרופה זו עם פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגביר את הסיכון לשינויים בפעילות החשמלית של הלב.

פניטאיין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), מאחר שפריזמה פורטה **פורטה** עלולה להגביר את הרמת של פניטאיין (הטיפול ב**פריזמה פורטה** רק לטיפול באפירודת דיכאון מצורפת בינונית זו).

על ממורות (בשילוב עם טיפול פסיכולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע מוגבל בנוגע לבטיחות ארוכת הטוח של פריזמה/פריזמה פורטה לגבי גידלה, התבגרות וההתפתחות הרגשית, ההתנהגותית בקבוצת גיל זו. למרות זאת, אם אתה מתחת לגיל 18, ייתכן כי הרופא שלך ירשום לך פריזמה/פריזמה פורטה לטיפול באפירודת דיכאון מג'רויות בעת מוירות עד חמורות, בשילוב עם טיפול פסיכולוגי. ייתכן שתפגוש את הרופא שלך או אחד מהתסמינים המפורטים לעיל מתפתח או מחמיר בעת נטילת פריזמה/פריזמה פורטה.

**אין להשתמש בפריזמה/פריזמה פורטה בילדים מתחת לגיל 8.**

**הפרעות בתפקוד המיני**

תרופות כמו **פריזמה/פריזמה פורטה** (שנקראות SSRI) עלולות לגרום לתסמינים של תפקוד מיני לקוי (ראה טעיף 4 "תופעות לוואי").

במקרים מסוימים, התסמינים הללו נמשכו לאחר הפסקת הטיפול.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**