

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - **1986**

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

بريزيما/ بريزما فورته أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص من بريزما على:

فلوأوكسيتين (كهيدروكلوريد) 20 ملغ

فلوoxetine (as HCl) 20 mg

يحتوي كل قرص من بريزما فورته على:

فلوأوكسيتين (كهيدروكلوريد) 60 ملغ

Fluoxetine (as HCl) 60 mg

لقائمة الدواء غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ المنشرة تبمنن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه المنشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج موجزة عن الدواء. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

تزيد الأدوية المضادة للإكتئاب (Antidepressants) من خطورة حدوث سلوك وأفكار انتحارية لدى الأطفال، المراهقين والشباب. مع بداية العلاج بالدواء، يتوجب على المتعالجين من كافة الأعمار وعلى أقرانهم متابعة التغيرات السلوكية مثل: تفاقم الإكتئاب، أفكار انتحارية، عدوانية وما شابه. يجب التوجه للطبيب فوراً، في حال طرأ مثل هذه التغيرات.

(1) لأي غرض مُخصّص الدواء؟

بريزيما/ بريزما فورته مُخصّص لعلاج:

الكبد:

- نوبات الإكتئاب الكبرى.

• **إضطراب الوسواس القهري (OCD)**
• **نهم الطعام (النهام العصائبي):** يتم إعتاد فلوأوكسيتين كعلاج مكمل للحلاج النفسي بغرض تقليل نوبات النهام الخارجة عن السيطرة واضطراب التطهير (التفريع).

أطفال ومراهقين من عمر 8 سنوات وما فوق:

- نوبة متوسطة حتى شديدة من الإكتئاب الكبير. إذا لم يستجيب الإكتئاب لعلاج متواصل من ECT (معالجة بالصدمات الكهربائية) (صدمة كهربائية)).
- علاج متواصل من الإكتئاب مع مقارئة بالأشخاص الآخرين. إن طريقة عمل نفسكي الإكتئاب متوسط حتى شديد أودية مضادة للإكتئاب فقط بمشاركة علاج نفسي الذي يقدم بالترامز إن ذلك.

الفصيلة العلاجية: بريزما/ بريزما فورته ينتمي لفصيلة الأدوية المضادة للإكتئاب من نوع مضطبات إعادة إمتصاص السيروتونين الإنتقائية (SSRI).

كيف يعمل **بريزيما/ بريزما فورته**:

تتوفر في دماغ كل شخص مادة تسمى سيروتونين. يوجد لدى الأشخاص الذين يعانون من إكتئاب، من إضطراب وسواسي قهري أو نهام عصائبي نسب منخفضة أكثر من السيروتونين مقارنة بالأشخاص الآخرين. إن طريقة عمل **بريزيما/ بريزما فورته** هي إستحداث SSRI أخرى غير واضحة تماماً، لكنها قد تساعد من خلال رفع نسبة السيروتونين في الدماغ.

من المهم علاج هذه الإضطرابات للمساعدة على تحسين حالتك. إذا لم يتم علاج الإضطراب، قد لا يزول وقد يصبح شديداً أكثر وصعباً أكثر للعلاج.

- جلوكوما (إنتفاخ الضغط داخل العين).
- مشاكل في الإبصار بعدات البؤل، خصوصاً إذا كنت مسناً.

لديك.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت:

- حساساً (ألرجي) لـ فلوأوكسيتين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6 "معلومات إضافية"). إذا تطور لديك طفح أو ودود فعل تحسسية أخرى (مثل حكة، إنتفاخ في الشفتين أو الوجع أو ضيق في التنفس)، توقف فوراً عن تناول الأقراص وتوجه إلى الطبيب بشكل فوري.

- تتناول أودية أخرى تعرف كمثبطات مونوأمين أوكسيداز غير القابلة للعكس وغير الإنتقائية (MAOIs). نظراً لأنه قد تحصل ردود فعل خطيرة وحتى يجب بدء العلاج بـ **بريزيما/ بريزما فورته** فقط بعد مرور أسبوعين من التوقف عن العلاج بـ MAOI غير القابلة للعكس وغير الإنتقائية.

لا يجوز تناول أي من MAOI غير القابلة للعكس وغير الإنتقائية لمدة 5 أسابيع على الأقل بعد التوقف عن تناول **بريزيما/ بريزما فورته**. إذا وُصف **بريزيما/ بريزما فورته** لفترة طويلة و/ أو بمقدار دوائي مرتفع، على الطبيب التفكير في إعطائه فاصل زمني أطول.

- تتناول ميتوبرولول (لعلاج قصور القلب)، نظرا لوجود خطورة زائدة بأن يصبح نظم القلب لديك بطيئا عن الحد.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ بريزما/ بريزما فورته إحد للطبيب إذا كانت تخضع إحدى الحالات التالية:

مشاكل قلبية.

• **ظهور سخونة،** تصلب العضلات أو إرتجاج، تغيرات في حالتك النفسية مثل الإرتباك، العصبية والهيجان المفرط؛ من الجائز أنك تعاني من "متلازمة السيروتونين" أو من "المتلازمة العصبية الخبيثة". رغم أن هذه المتلازمة تحدث في أحيان نادرة، إلا أنها قد تسبب حالات تشكل خطراً على الحياة؛ توجه إلى الطبيب بشكل فوري لأنه من الجائز أن هناك حاجة إلى إيقاف العلاج بـ **بريزيما/ بريزما فورته**.

- **هوس حالياً أو سابقاً:** إذا كنت تعاني من حالة من الهوس، توجه إلى الطبيب بشكل فوري لأنه من الجائز أن هناك حاجة إلى إيقاف العلاج بـ **بريزيما/ بريزما فورته**.

- **سابقة من إضطرابات النزيف** أو ظهور كدمات أو نزف شاذ، أو إذا كنت حاملأ (أنظري الفقرة 2 "الحمل الإرضاع والخصوبة").

- **سابقة من إضطرابات النزيف** أو ظهور كدمات أو نزف شاذ، أو إذا كنت حاملأ (أنظري الفقرة 2 "الحمل الإرضاع والخصوبة").

• **علاج متواصل بأودية مميعة للدم** (أنظر الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية")

• **صرع أو إختلاجات.** إذا كنت تعاني من إختلاج أو لاحظت إرتفاعاً في وتيرة الإختلاجات، توجه إلى الطبيب بشكل فوري. من الجائز أن هناك حاجة إلى إيقاف العلاج بـ **بريزيما/ بريزما فورته**.

• **علاج متواصل مع ECT** (معالجة بالصدمات الكهربائية) (صدمة كهربائية)).

• **علاج متواصل بأموكسيسيفلين (المستعمل لعلاج سرطان الثدي)** (أنظر الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

• **تبدأ بالشعور بعدم راحة وعدم القدرة على الجلوس أو الوقوف دون حركة** (akathisia). قد تؤدي زيادة المقدار الدوائي من **بريزيما/ بريزما فورته** إلى تفاقم ذلك.

- **سكري (من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى ملامعة المقدار الدوائي** للإنتسولين أو علاج آخر مضاد للبول).
- **مشاكل في الكبد** (من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى ملامعة المقدار الدوائي لدى).
- **يعدّ نظم القلب أثناء الراحة و/ أو إذا كنت تعرف أنك قد تعاني من نقص** الأملح نتيجة حالات الإسهال والتقيؤات بشكل شديد ومتواصل، أو من إستعمال مدرات البول.
- **علاج معدرات البؤل،** خصوصاً إذا كنت مسناً.
- **جلوكوما (إنتفاخ الضغط داخل العين).**

أفكار انتحارية وتفاقم الإكتئاب أو إضطرابات القلق إذا كنت تعاني من إكتئاب و/أو من إضطرابات القلق. قد تعاني أحياناً من أفكار حول إلحاق الضرر بنفسك أو الانتحار. قد يتزايد هذا العرض عندما تبدأ لأول مرة العلاج بمضادات الإكتئاب، لأن كافة هذه الأدوية تحتاج إلى فترة زمنية كي تبدأ بالعمل،

يصف علاجاً آخرأ مضاد للإكتئاب.

- **مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOI-A)** بما في ذلك موكلوبيميدي (moclobemide)، لينيزوليد (linezolid)، دواء مضاد حيوي) وكلوبريد (amitriptyline)، ديسيميامين (desipramine) وأمترينبتيلين (amitriptyline) أو ريسيريديون (risperidone)، (المعروف أيضاً باسم أزرق الميثيلين، وهو دواء يستعمل لعلاج ميثيميوغلوبينية الدم (methemoglobinemia) نتيجة التعرض لدواء أو لعادة كيميائية)، بسبب خطورة حدوث ردود فعل خطيرة أو حتى مميتة (متلازمة السيروتونين).

إنما كنت تعاني من أفكار لإلحاق الضرر بنفسك أو أفكار انتحارية في أي وقت كان، **توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى المستشفى.** يمكن بدء العلاج بفلوأوكسيتين بعد يوم من إيقاف العلاج بمثبطات MAOIs القابلة للعكس، ولكن قد يرغب الطبيب في متابعتك بعناية واستعمال مقدار دوائي منخفض أكثر من أودية MAOI-A.

- **ميكليتازين (mequitazine).** علاج الحساسيات). لأن تناول هذا الدواء مع **بريزيما/ بريزما فورته** قد يزيد من خطورة حدوث تغيريات في نشاط القلب الكهربائي.

- **فينيتوئين (phenytoin):**لعلاج الصرع)، بما أن **بريزيما/ بريزما فورته** قد يغيّر نسب هذا الدواء في الدم، فمن الجائز أن يحتاج الطبيب إلى بدء العلاج بـ فينييتوئين بحدز كبير وإجراء فحوصات متابعة عند إعطائه مع **بريزيما/ بريزما فورته**.

• **ليثيوم (lithium) سيليجيلين (selegiline)،** هيبيريكوم (St. John's wort)، ترامادول (tramadol)، مسكن (الم)، تريبتانات (مثل مشقات الشيفنة) وترينبتان (tryptophan). هناك خطورة زائدة لحدوث متلازمة السيروتونين المعتدلة، عند تناول هذه الأدوية مع **بريزيما/ بريزما فورته** من الجائز أن يجري الطبيب فحوصات متابعة في أحيان قريبة أكثر.

• **بالإضافة إلى ذلك،** تتوفر فقط معلومات محدودة حول السلامة على المدى الطويل لـ **بريزيما/ بريزما فورته** فيما يتعلق بالتمو، والنضج، والتطور النفسي، العاطفي والسلوكي لهذه الفئة العمرية. ومع ذلك، إذا كنت دون عمر 18 سنة، قد يصف لك الطبيب **بريزيما/ بريزما فورته** للعلاج بالاضافة إلى ذلك، ولا يجوز إستعمال هذا الدواء لعلاج حالات أخرى.

• **تؤذي أودية مثل بريزما/ بريزما فورته (تسمى SSRI)** إلى أعراض خلل الأداء الجنسي (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية")، من ذلك، عدم إستمرار في السابق من **بريزيما/ بريزما فورته** لكي يتمكننا من تقديم الإستشارة لك.

• **مضادات التخثر** (والفارين (warfarin))، مضادات الإنتهاب غير الستيروئيدية - NSAID (مثل إيبوبروفين (ibuprofen)، ديكلوفيناك (diclofenac)، أسبيردين وأودية أخرى نادرة على تسببع الدم) بما في ذلك كلوزابين (clozapine) المستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة).

- قد يغيّر **بريزيما/ بريزما فورته** تأثير هذه الأودية على الدم. إذا بدأت أو توقفت عن العلاج بـ **بريزيما/ بريزما فورته** عندما تتناول وارفارين، من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات متابعة لملامعة المقدار الدوائي لمضادات التخثر وفحصك في أحيان قريبة أكثر.

- **سيبروهيبتادين (cyproheptadine).** المستعمل من أجل أن يقلل من تأثير **بريزيما/ بريزما فورته**.

• **أودية تخفض نسب الصوديوم** في الدم) بما في ذلك أودية تزيد التبول، ديسموبريسين (desmopressin)، كارامازيبين (carbamazepine) وأوكسكاربازيبين (oxcarbazepine). لا هذه الأودية قد تزيد من خطورة حدوث إنخفاض نسبة الصوديوم مما ينبغي في مثل أثناء تناولها

• **سوية مع بريزما/ بريزما فورته.**

- **مضادات الإكتئاب** مثل مضادات إكتئاب ثلاثية الحلقة، مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين الإنتقائية (SSRIs) الأخرى أو بوبريدون (bupropion) (المستعمل مع **بريزيما/ بريزما فورته** لتقليل أعراض الإكتئاب)، (mefloquine) أو كراورودين (chloroquine) (لعلاج الملاريا)، (Metoprolol) عندما يستعمل لعلاج قصور القلب؛ لأن هناك خطورة زائدة أن يصبح نظم القلب لديك بطيئا عن الحد.

قد يؤثر **بريزيما/ بريزما فورته** على طريقة عمل الأدوية التالية (تفاعل):

- **بوتيروفينونات** (butyrophenones)، لأن **بريزيما/ بريزما فورته** قد يزيد خطورة حدوث إختلاجات عند تناول هذه الأدوية.
- **ليكليتانين (flecainide)**، بروپافيونون (propafenone)، نيبيفغول (nebivolol) أو إينكانيد (encaïnide) (لعلاج مشاكل القلب)، كاربامازيبين (carbamazepine) لعلاج الصرع)، أتوموكسيتين

(atomoxetine) أو مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة (مثلاً إيميپرامين (imipramine)، ديسيميامين (desipramine) وأمترينبتيلين (amitriptyline) أو ريسيريديون (risperidone)، (المعروف أيضاً: **بريزيما فورته** قد يغيّر نسب هذه الأودية في الدم، من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى خفض مقاردها الدوائي عند إعطائها مع **بريزيما/ بريزما فورته**.

• **نوبات الإكتئاب الكبرى** - المقدار الدوائي الإعتيادي هو 20 ملغ في اليوم.

قد يغيّر الطبيب المقدار الدوائي وفق الحاجة خلال 3-4 أسابيع من بدء العلاج. قد يتم عند الحاجة رفع المقدار الدوائي تدريجياً حتى حد أقصى مقداره 60 ملغ في اليوم. يجب رفع المقدار الدوائي بحدز، لضمان إعطاء تقبؤ، إرتجاج، صراع.

يبدء العلاج بالدواء. هذا الأمر إعتيادي لأنه عادة لا يحصل تحسن إلا بعد مضي عدة أسابيع منذ بدء العلاج. يجب علاج المتعالجين الذين يعانون من إكتئاب لمدة 6 أشهر على الأقل.

• **الشربة المرضي العصبي (Bulimia nervosa)** - المقدار الدوائي الإعتيادي هو 60 ملغ في اليوم.

• **إضطراب الوسواس القهري (OCD)** - المقدار الدوائي الإعتيادي هو 20 ملغ في اليوم. قد يغيّر الطبيب المقدار الدوائي وفق الحاجة بعد أسبوعين من العلاج. قد يتم رفع المقدار الدوائي تدريجياً حتى حد أقصى مقداره 60 ملغ في اليوم. إذا لم يطرأ تحسن خلال 10 أسابيع، سيقرر الطبيب في إستبدال العلاج.

• **الشره المرضي العصبي (Bulimia nervosa)** - المقدار الدوائي الإعتيادي هو 60 ملغ في اليوم.

• **إضطراب الوسواس القهري (OCD)** - المقدار الدوائي الإعتيادي هو 20 ملغ في اليوم. قد يغيّر الطبيب المقدار الدوائي وفق الحاجة بعد أسبوعين من العلاج. قد يتم رفع المقدار الدوائي تدريجياً حتى حد أقصى مقداره 60 ملغ في اليوم. إذا لم يطرأ تحسن خلال 10 أسابيع، سيقرر الطبيب في إستبدال العلاج.

• **الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين من عمر 8 حتى 18 سنة** الذين يعانون من إكتئاب:

يجب بدء العلاج والخصوع لمراقبة من قبل الطبيب المختص. المقدار الدوائي الإبتدائي هو 10 يوم/فلوأوكسيتين (ك هيدروكلوريد) الذي يعطى على شكل محلول عبر الفم (هناك دواء آخر الذي يتوفر على شكل محلول). من الجائز أن يرفع المقدار الدوائي من 1-2 أسابيع. المقدار الدوائي إلى 20 ملغ/يوم.

يجب رفع المقدار الدوائي بحدز لضمان تفكيك أخفض مقدار دوائي ناجع. قد يحتاج العلاج إلى وزن منخفض إلى مقادير دوائية منخفضة أكثر. إذا حدثت إستجابة مرضية لسلاج، سيفحص الطبيب مدى الحاجة إلى الإستمرار العلاج بما يزيد عن 6 أشهر. إذا لم يحصل تحسن خلال 9 أشهر، فمن شأن الإعتيادي لا يزيد عادة عن 40 ملغ. المقدار الدوائي الأعظمي هو 60 ملغ في اليوم.

• **إضطرابات في وظائف الكبد** - إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو كنت تستعمل أودية أخرى قد تؤثر على **بريزيما/ بريزما فورته**، فمن الجائز أن يقرر الطبيب وصف مقداراً دوائياً أقل، أو قد يوصيك بتناول **بريزيما/ بريزما فورته** مرة كل يومين.

• **إضطرابات في وظائف الكبد** - إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو كنت تستعمل أودية أخرى قد تؤثر على **بريزيما/ بريزما فورته**، فمن الجائز أن يقرر الطبيب وصف مقداراً دوائياً أقل، أو قد يوصيك بتناول **بريزيما/ بريزما فورته** مرة كل يومين.

• **لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به!**

يجب بلع الأقراص مع الماء.

• **لا يجوز تناول المقدار الدوائي الموصى به!**

يجب تناول الدواء في وقت محدد، مع شرب الماء. إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو كنت تستعمل أودية أخرى قد تؤثر على **بريزيما/ بريزما فورته**، فمن الجائز أن يقرر الطبيب وصف مقداراً دوائياً أقل، أو قد يوصيك بتناول **بريزيما/ بريزما فورته** مرة كل يومين.

• **لا يجوز تناول هذا الدواء في الوقت المخصص** في الإبحاث على الحيوانات، تبين أن فلوأوكسيتين يقلل جودة العمني. من ناحية نظرية، يمكن لهذا الأمر أن يؤثر على الخصوبة، لكن حتى الآن لم يشاهد تأثير على الخصوبة لدى البشر.

• **السياقة وإستعمال الماكينات**

قد تؤثر الأدوية النفسية مثل **بريزيما/ بريزما/ بريزما فورته** في الحكم على الأمور أو التنسيق لدى، لا يجوز لك سياقة مركبة أو تشغيل ماكينات حتى تعرف كيف يؤثر **بريزيما/ بريزما فورته** عليك.

(3) كيفية إستعمال الدواء

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

• **إذا توقفت عن تناول الدواء**

- **لا تتوقف عن تناول بريزما/ بريزما فورته** دون إستشارة الطبيب أولاً، حتى لو بدأت تشعر بتحسن شعورك. من المهم أن تستمر في تناول الدواء الخاص بك.

- **احرص على تجنب حالة حصول نقص في الأقراص** لديك.

إذا توقفت عن تناول **بريزيما/ بريزما فورته**، قد تلحظ ظهور الأعراض التالية (أعراض الفطام): دوام، إحساس بوخز مثل الدبابيس والإبر، إضطرابات في النوم (أحلام تبدو واقعية للغاية، كوابيس ليلية، عدم القدرة على النوم)، شعور بعدم الراحة أو هيجان، إرهاق غير عادي أو ضعف، شعور بالقلق، غثيان/تقيؤ، إرتجاج، صراع.

يكتشف معظم الناس أن جميع الأعراض المتعلقة بالتوقف عن تناول **بريزما/ بريزما فورته** تكون طفيفة وتزول خلال عدة أسابيع. إذا كنت تعاني من أعراض عند توقفك عن العلاج، توجه للطبيب.

• **عند توقف عن العلاج بـ بريزما/ بريزما فورته**، سيساعدك الطبيب على تقليل المقدار الدوائي ببطء على مدى أسبوع أو أسبوعين - وهذا من المفترض أن يساعد على تقليل احتمالية ظهور أعراض الفطام.

• **أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 من بين 10,000 مستعمل):** يزيد من خطر التعرض للزئبق أو الكدمات؛ إنخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء؛ سلوك متهور غير نموذجي؛ هلوسة؛ الشعور بهيجان؛ نوبات هلح؛ إرتباك؛ تآتأ؛ عدوانية؛ إختلاجات؛ إتهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)؛ إنتفاخ سريع للأسنة حول العنق، الوجه، الكفم و/ أو الحنجرة؛ ألم في الأنابيب الذي ينقل الطعام أو الماء إلى المعدة؛ إتهاب الكبد؛ مشاكل رئوية؛ حساسية لضوء الشمس؛ ألم في العضلات؛ مشاكل في التبول؛ إنتاج الحليب.

• **شعوب غير معروف (أعراض شبيهها لم يحدث بعد):**

• **نزف شديد من الإضطراب** بعد توقف قصير بعد الولادة (postpartum hemorrhage). أنظري الفقرة 2 "الحمل الإرضاع والخصوبة".

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **الاستفراع أو نزول معظم هذه الأعراض الجانبية** مع التقدم في العلاج.

• **لدى الأطفال والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **قلب سريعة وغير منتظمة، تورؤة، نتأوب:** صعوبات في الهضم، تقيؤات؛ جفاف الفم؛ طفح؛ شرى، حكة؛ تورؤ مفرط؛ ألم في المعامل؛ تبول متكرر أكثر؛ نزف مههلي مجهول السبب؛ تورؤ بالبرص أو القشرية.

• **أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 من بين 1,000 مستعمل):**

• **شعور بالإنتفصال عن الذات:** تفكير غريب؛ مزاج مرتفع بشكل شاذ؛ إضطرابات (أعراض الفطام)؛ دوام، إحساس بوخز مثل الدبابيس والإبر، إضطرابات في النوم (أحلام تبدو واقعية للغاية، كوابيس ليلية، عدم القدرة على النوم)، شعور بعدم الراحة أو هيجان، إرهاق غير عادي أو ضعف، شعور بالقلق، غثيان/تقيؤ، إرتجاج، صراع.

يكتشف معظم الناس أن جميع الأعراض المتعلقة بالتوقف عن تناول **بريزما/ بريزما فورته** تكون طفيفة وتزول خلال عدة أسابيع. إذا كنت تعاني من أعراض عند توقفك عن العلاج، توجه للطبيب.

• **عند توقف عن العلاج بـ بريزما/ بريزما فورته**، سيساعدك الطبيب على تقليل المقدار الدوائي ببطء على مدى أسبوع أو أسبوعين - وهذا من المفترض أن يساعد على تقليل احتمالية ظهور أعراض الفطام.

• **أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 من بين 10,000 مستعمل):** يزيد من خطر التعرض للزئبق أو الكدمات؛ إنخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء؛ سلوك متهور غير نموذجي؛ هلوسة؛ الشعور بهيجان؛ نوبات هلح؛ إرتباك؛ تآتأ؛ عدوانية؛ إختلاجات؛ إتهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)؛ إنتفاخ سريع للأسنة حول العنق، الوجه، الكفم و/ أو الحنجرة؛ ألم في الأنابيب الذي ينقل الطعام أو الماء إلى المعدة؛ إتهاب الكبد؛ مشاكل رئوية؛ حساسية لضوء الشمس؛ ألم في العضلات؛ مشاكل في التبول؛ إنتاج الحليب.

• **شعوب غير معروف (أعراض شبيهها لم يحدث بعد):**

• **نزف شديد من الإضطراب** بعد توقف قصير بعد الولادة (postpartum hemorrhage). أنظري الفقرة 2 "الحمل الإرضاع والخصوبة".

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **الاستفراع أو نزول معظم هذه الأعراض الجانبية** مع التقدم في العلاج.

• **لدى الأطفال والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى الإضطراع والمرهقين (8-18 سنة)** - بالإضافة للأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أعلاه، قد يبطن **بريزيما/ بريزما فورته** وتيرة النمو أو قد يعرقل الإنضاج الجنسي. إن السلوك المتعلق بالانتحار

• **كسور في العظام** - شهدت خطورة متزايدة لكسور العظام لدى متعالجين يتناولون هذا النوع من الأودية.

• **لدى**