

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصبلة
(مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إيكسفورج 5 ملغ/80 ملغ أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:
أملوديبين (على شكل بيسيلات) 5 ملغ
فالسارتان 80 ملغ

Amlodipine (as besylate) 5mg
Valsartan 80mg

إيكسفورج

5 ملغ/160 ملغ
أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:
أملوديبين (على شكل بيسيلات) 5 ملغ
فالسارتان 160 ملغ

Amlodipine (as besylate) 5mg
Valsartan 160mg

إيكسفورج

10 ملغ/160 ملغ
أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:
أملوديبين (على شكل بيسيلات) 10 ملغ
فالسارتان 160 ملغ

Amlodipine (as besylate) 10mg
Valsartan 160mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج فرط ضغط الدم الأولي.
إيكسفورج مخصص للمصابين الذين يضغط الدم لديهم غير متوازن كما ينعى بواسطة علاج منفرّد.

الفصيلة العلاجية:

من حاجيات قنوات الكالسيوم.
فالسارتان - من مضادات المستقبل أنجيوتنسين II.

تحتوي أقراص إيكسفورج على مركبين إثنين يسميان أملوديبين و- فالفاسارتان. إن هاتين المادتين مخصصتان لعلاج ضغط الدم لدى الكبار، حيث أن العلاج بكل مركب بشكل منفرد لا يؤدي إلى نتائج كافية.

ينتمي أملوديبين إلى فصيلة المواد المسماة "حاجيات قنوات الكالسيوم". يوقف أملوديبين من دخول الكالسيوم إلى جدران الأوعية الدموية، الأمر الذي يمنع تضيق الأوعية الدموية.

ينتمي الفالسارتان إلى فصيلة المواد المسماة "مضادات المستقبل أنجيوتنسين II". أنجيوتنسين II هو عبارة عن مادة ينتجها الجسم ونسب تضيق الأوعية الدموية وبذلك تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يعمل الفالسارتان على حجب تأثير أنجيوتنسين II.

تساعد كلتا المادتين على منع تضيق الأوعية الدموية. نتيجة لذلك، يحدث ارتخاء للأوعية الدموية وينخفض ضغط الدم.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) لـ أملوديبين أو لكل واحد من حاجيات قنوات الكالسيوم الأخرى. من شأن ذلك أن يتجلى بحكة، احمرار الجلد أو صعوبات في التنفس.
- كنت حساساً (البرجي) لـ فالفاسارتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6 "معلومات إضافية"). إذا كنت تعتقد بأنه من شأنك أن تكون حساساً، راجع الطبيب قبل تناول إيكسفورج.

لديك مشاكل خطيرة في الكبد أو مشاكل في الطرق الصفراوية مثل تشعب الصفراء أو إنسداد في جريان الصفراء داخل الكبد.

كنت حاملاً ما بعد الشهر الثالث (يُفضل الإمتناع عن إيكسفورج في بداية الحمل أيضاً، أنظري بند "الحمل والإرضاع").

وجد لديك ضغط دم منخفض بشكل خطير (hypotension).

وجد لديك تضيق في صمام الشريان الأبهر (aortic stenosis) أو صدمة قلبية (cardiogenic shock) - حالة يكون فيها قلب غير قادر على تزويد ما يكفي من الدم للجسم).

كنت تعاني من قصور في القلب بعد نوبة قلبية. وجد لديك سكري أو خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وكنت تتعالج بدواء لخفض ضغط الدم الحاوي على اليوسكيريون.

إذا إنطبق عليك واحداً من تلك البنود، بلِّغ طبيبك من دون أن تتناول إيكسفورج.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ إيكسفورج، إحك للـ طبيبك إذا:

- كنت مريضاً (تقيؤات أو إسهال).
- وجدت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلية.
- إجرت زراعة كلية أو شخص لديك بأنك تعاني من تضيق في شرايين الكلية.
- وجدت لديك مشكلة تؤثر على وظيفة الغدة الكظرية المسماة فرط الألدوستيرونية الأولي (primary hyperaldosteronism).

وجد لديك قصور في القلب أو إجرت في السابق نوبة قلبية. يجب متابعة تعليمات الطبيب بحرص بما يتعلق بالمقدار الدوائي الإبتدائي. من شأن الطبيب أن يفحص أيضاً الأداء الوظيفي لكتيكيت.

أبلغك طبيبك بأنك تعاني من تضيق في فصام القلب (aortic or mitral stenosis)، أو من إنتلال عضلة القلب الضخامي الإنسدادي (obstructive hypertrophic cardiomyopathy).

حصل لديك ذات مرة إنتفاخ خاصة في الوجه والحنجرة أثناء تناول أدوية أخرى (بما في ذلك مثبطات ACE). إذا كنت تقاسي من تلك الأعراض، توقف عن تناول إيكسفورج وراجع طبيبك فوراً، في هذه الحالة، لا يجوز أبداً مراجعة تناول إيكسفورج.

إذا كنت تقاسي من آلام في البطن، غثيان، تقيؤات أو إسهال بعد تناول إيكسفورج، سيقرر طبيبك مدة العلاج. لا تتوقف عن تناول إيكسفورج من تلقاء نفسك.

كنت تتناول واحداً من الأدوية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم:

- مثبطات ACE (مثلاً: إنبالايريل، ليزينوبريل، رامبيرييل)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ذات الصلة بالسكري.
- اليوسكيريون.

الأطفال والمراهقون:

- لا يوصى بإستعمال إيكسفورج لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة:

من الجائز أن يقوم طبيبك بفحص الأداء الوظيفي لكتيكيت، ضغط الدم وكمية الشوارد الكهربائية في دمك (على سبيل المثال البوتاسيوم) بشكل دائم.

أنظر معلومات إضافية في فقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا". إذا إنطبق عليك واحداً من البنود، بلِّغ الطبيب قبل تناول إيكسفورج.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. من الجائز أن يضطر طبيبك إلى تغيير المقدار الدوائي أو إتخاذ وسائل حذر أخرى، وفي حالات معينة من الجائز أن تضطر إلى التوقف عن تناول واحداً من الأدوية. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول أدوية من المجموعات التالية:

مثبطات ACE أو اليوسكيريون (أنظر المعلومات في فقرات "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" و- "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"):

- المدرات البولية (نوع من دواء يزيد من التبول)؛
- ليثيوم، دواء يستعمل لعلاج أنواع معينة من الإكتئاب؛
- المدرات البولية الحافظة للبوتاسيوم، إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على بوتاسيوم أو مواد أخرى التي من شأنها أن ترفع نسب البوتاسيوم؛

- أنواع معينة من مسكنات الألم المسماة مضادات الإتهاب اللا ستيرويدية (NSAIDs) أو مثبطات سيكلو أوكسيجيناز - 2 أيضاً أو الإنتقائية (Cox-2 inhibitors). من شأن الطبيب أيضاً أن يفحص الأداء الوظيفي لكتيكيت؛
- أدوية لعلاج الإختلاجات (مثل كارابامايين، فينوباربيتال، فينيوتين، فوسفينوتين، بريمدون)؛
- الخلاصة النباتية للتهودنة - هيبيريكوم پيرفوراتوم (St. John's wort)

- نيتروجليسرين ومركبات النترات الأخرى، أو الأدوية الأخرى التي تنتمي إلى فصيلة موسعات الأوعية الدموية (vasodilators)؛
- أدوية لعلاج الإيدز HIV/AIDS (مثل ريتونافير، إندينافير، تلفينايفر)؛
- أدوية مستعملة لعلاج التلوثات الفطرية (مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول)؛
- أدوية مستعملة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل ريفامپيسين، إيتروميسين، كلاريثروميسين، تيليثروميسين)؛
- قيراماييل، ديلتيازيم (أدوية للقلب)؛
- سيقفاساتين (دواء يستعمل لخفض نسب الكوليسترول)؛
- دانترولين (تسريب لدرجات حرارة الجسم الشاذة)؛
- تاكروليموس (يُستعمل لمنع رفض عضو مزروع من قبل جهازك المناعي)؛
- أدوية مستعملة للحماية من رفض نسيج مزروع (سيكلوسبورين)؛

إستعمال الدواء والطعام:

لا يجوز إستهلاك الجريب فروت وعصير الجريب فروت أثناء إستعمال إيكسفورج. سبب ذلك لأن الجريب فروت وعصير الجريب فروت قد يرفعان من نسب المركب الفعال أملوديبين في الدم، الأمر الذي قد يزيد من التأثير الخافض لضغط الدم بشكل غير متوقع، بالإمكان تناول إيكسفورج مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع:

الحمل

عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل أو من شأنك أن تصبحي حاملاً. يوصيك طبيبك عادة بالتوقف عن تناول إيكسفورج قبل أن تصبحي حاملاً أو مباشرة عند إكتشافك بأنك حامل. يوصيك بإستعمال دواء آخر عوضاً عن إيكسفورج. لا يوصى بإستعمال إيكسفورج في بداية الحمل (في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل) ولا يجوز إستعماله إذا كنت بعد الشهر الثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً شديداً للجنين في حال إستعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

يلغي طبيبك إذا كنت مرضعة أو تحططين البدء في الإرضاع. تنتقل كميات ضئيلة من أملوديبين إلى حليب الأم. لا يوصى بتناول إيكسفورج أثناء الإرضاع ومن الجائز أن يوصيك طبيبك على علاج آخر إذا كنت ترغبين في الإرضاع، خاصة إذا كان الإرضاع حديث الولادة أو وُلد قبل الأوان.

عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أي إستعمال لدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات:

هذا الدواء قد يسبب الدوار. قد يؤثر هذا الأمر على قدرتك على التركيز. لذلك، إذا كنت لا تعرف كيف سيؤثر الدواء عليك، لا تقم بالسياقة، لا تستعمل الماكينات ولا تقم بإجراء النشاطات الأخرى التي تتطلب التركيز.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. هذا الأمر يساعدهم في الحصول على النتائج المثلى وتقليل خطورة حدوث أعراض جانبية.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج بحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو قرص واحد في اليوم:

- يُفضل تناول الدواء بنفس الساعة من كل يوم.
- يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.

- بالإمكان تناول إيكسيفورج مع أو بدون طعام، لا يجوز تناول إيكسيفورج مع الجريب فروت أو مع عصير الجريب فروت.
- لا توجد معلومات حول سحق/مطهر أو مضغ الأقراص.
من شأن الطبيب أن يقترح مقدارا دوائياً أكبر أو أصغر، وذلك بحسب إستراتيجيتك للعلاج.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إيكسيفورج لدى المسنين (من عمر 65 سنة وما فوق)
يقوم طبيبك بالتحقق من بجزء آخر أثناء رفع المقدار الدوائي، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخبره معك عليه الدواء. قد يتراكم فائض من السوائل في رتيك (وذمة رئوية) حيث يؤدي إلى ضيق في التنفس والذي قد يتطور حتى 24-48 ساعة بعد التناول.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول مقدار دوائي حال تذكرك. بعد ذلك، يجب تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي. لكن، إذا كان تقريبا موعداً تناول المقدار الدوائي القادم، فلا يجوز تناول المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي واستشر الطبيب.
يجب المواظبة على العلاج بحسب توصيات الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

في حال توقفك عن تناول الدواء

إن التوقف عن العلاج بـ إيكسيفورج قد يؤدي لتفاقم مرضك. لا تتوقف عن تناول الدواء إلا بتعليمات الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال إيكسيفورج قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أياً منها.

هناك أعراض جانبية خطيرة تتطلب علاجاً طبياً فوراً:
لقد قاسى قليل من المتعالمين من تلك الأعراض الجانبية الخطيرة.

في حال حدوث أياً من الأعراض التالية، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب:

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل): رد فعل تحسسي مع أعراض مثل طفح، حكة، إنتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان، صعوبات في التنفس، ضغط دم منخفض (الشعور بإغماء، الشعور بدوخة).

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل): وذمة وعائية في الأجزاء: إنتفاخ في الأجزاء الذي يظهر مصحوباً بأعراض مثل آلام في البطن، غثيان، قيؤات وإسهال.

أعراض جانبية أخرى التي من الجائز أن تحدث عند استعمال إيكسيفورج:
أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين): إنفلونزا؛ إسهال؛ آلام في البطن؛ الحنجرة وإنزعاج أثناء البلع؛ صداع؛ إنتفاخ الذراعين؛ احاحي البدن، الرجلين، الكاحلين أو راحتي القدمين؛ ضعف؛ إحمراء والشعور بسخونة في الوجه و/أو في العنق.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل): دوار؛ غثيان وآلم في البطن؛ جفاف في الفم؛ تعاس؛ وخز أو خدر في راحتي البدن أو القدمين؛ قيؤات؛ تسرع نظم القلب بما في ذلك خفقان القلب؛ دوار عند الوقوف؛ سعال؛ إسهال؛ إمساك؛ طفح جلدي؛ إحمراء الجلد؛ إنتفاخ في المفاصل، ألم في الظهر؛ ألم في المفاصل.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل): قلق؛ طنين في الأذنين؛ إغماء؛ التبول أكثر من المعتاد أو الشعور بزيادة الإحاح على التبول؛ عدم القدرة على تحقيق أو المحافظة على الإنتصاب التناسلي؛ الشعور بقل؛ إخفاض ضغط الدم مع أعراض مثل دوار، الشعور بدوخة خفيفة؛ تعرق زائد؛ طفح جلدي بكامل الجسم؛ حكة؛ طفح عضي.

إذا أثرت عليك الأعراض المذكورة أعلاه بصورة شديدة، راجع طبيبك.

الأعراض الجانبية التي بلّغ عنها أثناء استعمال أملوديبين أو فالساراتان المستعملين بشكل منفرد والتي لم تظهر عند استعمال إيكسيفورج أو تظهر بوتيرة أكبر مما هو عليه مع إيكسيفورج:

أملوديبين

راجع الطبيب بشكل فوري إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية النادرة جداً والخطيرة التالية بعد تناول الدواء:

- صفير مفاجئ أثناء التنفس، ألم في الصدر، سيق تنفس أو صعوبات في التنفس.
- إنتفاخ في الجنبين، الوجه أو الشفتين.
- إنتفاخ اللسان والحنجرة التي تسبب صعوبة كبيرة في التنفس.
- أعراض جلدية خطيرة تشمل طفح جلدي شديد، شرى، إحمراء الجلد بكامل الجسم، حكة شديدة، حويصلات، تقشر وإنتفاخ الجلد، التهاب في النسيج المخاطي (Steven-Johnson Syndrome)، نخر البشرة (السمي)، أو ردود فعل تحسسية أخرى.
- إحمشاء عضلة القلب، نظم قلب غير منتظم.
- التهاب البنكرياس الذي قد يسبب آلام شديدة في البطن والظهر التي تتراقق بشعور عام غير جيد.

بلّغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية. إذا سببت لك الأعراض التالية مشاكل أو إذا إستمرت لأكثر من أسبوع، راجع طبيبك:

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين): دوار، تعاس، خفقان القلب (الإحساس بضربات القلب)، تورم، إنتفاخ الكاحلين (وذمة)، ألم في البطن، غثيان.
أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل): تغيرات في الحالة النفسية، قلق، إكتئاب، أرق، رجفة، تغيرات في حاسة المذاق، إغماء، فقدان الإحساس بالألم، اضطرابات في الرؤية، خلل في الرؤية، طنين في الأذنين، إخفاض ضغط الدم، عطاس/رشح في الأنف التي تنجم عن التهاب في نسيج الأنف (التهاب الأنف)، مشاكل في الهضم، قيؤات، فقدان الشعر، تعرق زائد، حكة في الجلد، تغير لون الجلد، اضطراب في التبول، زيادة الحاجة للتبول في الليل، زيادة وتيرة التبول، عدم القدرة على تحقيق

إنتصاب للعضب التناسلي، إنزعاج أو تضخم الشدين لدى الرجال، ألم، الشعور بوعكة، آلام في العضلات، تقلصات عضلية، زيادة أو تناقص الوزن.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل): إرتباك.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل): تناقص عدد خلايا البيضاء، تناقص عدد الصفائح الدموية، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث كدمات شاذة أو النزف بسهولة (تضرر كريات الدم الحمراء)، فائض السكر في الدم (فرط سكر الدم)، إنتفاخ التلته، إنتفاخ التهاب (التهاب المعدة)، أداء وظيفي كبدى شاذ، التهاب الكبد (hepatitis)، إصفرار الجلد (يرقان): إرتفاع إنزيمات الكبد، الأمر الذي قد يؤثر على بعض الفحوص الطبية، زيادة تورم العضلات، التهاب في الأوعية الدموية الذي يترافق أحياناً بطفح جلدي، حساسية للضوء، اضطرابات تتضمن تصلب، رجفان و/أو صعوبات في الحركة.

فالساراتان

أعراض جانبية ذات شيع غير معروف (لا يمكن تقدير البوتيرة من المعطيات المتوفرة): تناقص كريات الدم الحمراء، سخونة، ألم في الحنجرة أو فحرات في الفم ناتجة عن التلوثات؛ نزف أو كدمات عفوية؛ إرتفاع نسب اليوتاسيوم في الدم؛ عدم سلامة نتائج فحوص الكبد؛ تناقص في الأداء الوظيفي الكلوي أو تناقص شديد في الأداء الوظيفي الكلوي؛ إنتفاخ خاصة في الوجه والحنجرة؛ آلام عضلية؛ طفح، بقع بنفسجية - حمراء، سخونة، حكة؛ ردود فعل تحسسية؛ حويصلات في الجلد (أعراض لحالة تسمى Dermatitis bullous).

إذا كنت تشعر بتلك الأعراض، توجه إلى طبيبك فوراً!
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك بالإمكان تبليغ شركة نوفارتيس بواسطة عنوان البريد الإلكتروني التالي: safetydesk.israel@novartis.com

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسليم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنتقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين فوق 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.
- لا يجوز الإستعمال إذا كانت العلبة متضررة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على: إيكسيفورج أقراص مطلية، 5 ملغ/80 ملغ، 5 ملغ/160 ملغ، 10 ملغ/160 ملغ

Microcrystalline cellulose
Crosprovidone, type A
Magnesium stearate
Silica, colloidal anhydrous / Colloidal silicon dioxide

إيكسيفورج 5 ملغ/80 ملغ أقراص مطلية **تركيب الطلاء:**
Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Macrogol 4000
Talc
Iron oxide, yellow (E172)

إيكسيفورج 5 ملغ/160 ملغ أقراص مطلية **تركيب الطلاء:**

Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Macrogol 4000
Talc
Iron oxide, yellow (E172)

إيكسيفورج 10 ملغ/160 ملغ أقراص مطلية **تركيب الطلاء:**

Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Macrogol 4000
Talc
Iron oxide, yellow (E172)
Iron oxide, red (E172)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
إيكسيفورج 5 ملغ/80 ملغ: قرص مطلي مستدير بلون أصفر غامق ذو أطراف مائلة، عليه الطباعة "NVR" من جانب واحد و- "NV" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.

إيكسيفورج 5 ملغ/160 ملغ: قرص مطلي بيضوي بلون أصفر غامق ذو أطراف مائلة، عليه الطباعة "NVR" من جانب واحد و- "ECE" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.

إيكسيفورج 10 ملغ/160 ملغ: قرص مطلي بيضوي بلون أصفر فاتح ذو أطراف مائلة، عليه الطباعة "NVR" من جانب واحد و- "UIC" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض.ب، ص.ب. 7126، تل أبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إيكسيفورج 5 ملغ/80 ملغ: 138 40 31566
إيكسيفورج 5 ملغ/160 ملغ: 138 41 31567
إيكسيفورج 10 ملغ/160 ملغ: 138 42 31568

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في آذار 2025.