

## إيموفان

### أقراص مطلية 7.5 ملغ

التركيب:

يحتوي كل قرص على: زوبيكلون 7.5 ملغ Zopiclone 7.5 mg  
لمعلومات عن المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر:  
أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6  
"معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه  
النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية،  
راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلي. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم  
حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.  
هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

#### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إيموفان مخصص كعلاج قصير الأمد لمشاكل النوم لدى الكبار. لا يجوز  
إستعماله لمدة طويلة. يجب أن يكون العلاج قصيراً قدر الإمكان، لأن  
خطورة حدوث تعلق تزداد مع مواصلة العلاج. يجب إستشارة الطبيب.  
الفصيلة العلاجية: منوم ومخدر من مجموعة سيكلوبيروليينات.

#### 2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لـ زوبيكلون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6) علامات رد الفعل التحسسي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.
- كنت تعاني من مشكلة تسبب ضعف عضلي شديد (وهو عضلي وبيبل).
- كنت تعاني من مشكلة في الأداء الوظيفي للربتين (قصور تنفسي).
- كنت تعاني من مشكلة تتوقف في أعقابها عن التنفس لفترات قصيرة من الزمن أثناء الليل (توقف التنفس أثناء النوم).
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت ما دون عمر 18 سنة. لم تُحدد بعد سلامة ونجاعة إيموفان لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.
- قاسيت في الماضي من السير خلال النوم أو من أي سلوك شاذ آخر (مثل السيقانة، تناول الطعام، إجراء مكالمة هاتفية أو ممارسة علاقات جنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يظا بشكل تام بعد تناول إيموفان.

لا تتناول هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً تنطبق عليك.  
إذا لم تكن واثقا، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول إيموفان.

#### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

##### قبل العلاج بـ إيموفان، إحك طبيبك إذا:

- كنت تعاني من أية مشاكل في الكبد (أنظر أيضاً الفقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا"). من الجائز أن يضطر الطبيب أن يصف لك مقدارا دوائيا مُخفّضا من إيموفان.
- كنت تعاني من أية مشاكل في الكلى. من الجائز أن يضطر الطبيب أن يصف لك مقدارا دوائيا مُخفّضا من إيموفان.
- كنت تعاني من مشاكل بسيطة في التنفس. يقرر الطبيب فيما إذا توجب عليك تلقي إيموفان (أنظر أيضا الفقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا").
- وُجد لديك في الماضي اضطراب نفسي (بما في ذلك إكتئاب واضطراب في الشخصية) أو أسأت إستعمال أو تعلقت بالكحول أو بالمخدرات.
- إستعملت مؤخرا إيموفان أو أدوية أخرى مشابهة لفترة تزيد عن 4 أسابيع.

#### خطورة إساءة الإستعمال والتعلق:

إن إستعمال إيموفان قد يؤدي إلى تطور إساءة الإستعمال و/أو التعلق الجسدي والنفسي. تزداد خطورة التعلق مع المقدار الدوائي ومع مدة العلاج وتكون أكبر عندما يتم إستعمال إيموفان لأكثر من 4 أسابيع، ولدى متعاطييه لديهم سابقة لإضطرابات نفسية و/أو إساءة إستعمال الكحول، المواد غير القانونية أو المخدرات.  
الدواء غير مخصص لمعالجة الإكتئاب.

#### إيموفان والصحة النفسية:

قد يقاسي بعض الأشخاص الذين يتلقون العلاج بـ إيموفان مشاكل في الصحة النفسية مثل أفكار في أشياء غير حقيقية (أوهام)، رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هلوسة)، الشعور بالإرتباك أو بالتوهان (هذيان)، غضب، عصبية، قلق راحة أو إكتئاب.

بالإضافة، لقد أظهرت عدة أبحاث عن وجود خطورة زائدة لأفكار إنتحارية، محاولة الإنتحار والإنتحار لدى المتعاطييين الذين يتناولون أدوية معينة للتهدئة وأدوية لمعالجة مشاكل النوم، بما في ذلك هذا الدواء.

لكن، لم يُحدد فيما إذا نجم ذلك عن الدواء أو من الجائز أن هناك أسباب أخرى. إذا وُجدت لديك أفكار إنتحارية، راجع طبيبك بأسرع ما يمكن لتلقي إستشارة طبية إضافية.

#### إيموفان وتصرفات شاذة:

قد يؤدي إيموفان إلى السير خلال النوم أو إلى سلوك شاذ آخر (مثل السيقانة، تناول الطعام، إجراء مكالمة هاتفية أو ممارسة العلاقات الجنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يظا بشكل تام. في صباح اليوم التالي، من الجائز أن تتذكر بأنك فعلت شيئا خلال الليل. هذه النشاطات من شأنها أن تحدث سواء كنت أو لم تكن تشرب الكحول أو تتناول أدوية أخرى تسبب لك النعاس سوية مع إيموفان. إذا كنت تقاسي من إحدى تلك الأعراض، فتوقف عن العلاج بـ إيموفان فوراً واتصل بالطبيب أو بفرد من الطاقم الطبي الخاص بك.

قبل تناول إيموفان، من المهم التأكد من أنه بإستطاعتك النوم على الأقل 7 حتى 8 ساعات من النوم المتواصل، وذلك لمساعدتك على تقليل خطورة حدوث أعراض جانبية معينة (أنظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية") إذا لم تكن واثقا فيما إذا كانت إحدى الحالات السابقة تنطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول إيموفان.

#### الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

#### الفحوص والمتابعة:

إيموفان قد يُغيّر من نسب إنزيمات الكبد التي تظهر في فحوص الدم. قد يدل هذا الأمر على خلل في الأداء الوظيفي للكبد لديك.  
إذا كنت مقبلا على إجراء فحوص الدم، من المهم إبلاغ طبيبك بأنك تتناول إيموفان.

#### التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، إذا استعملت مؤخرا، أو إذا من شأنك أن تستعمل أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. وذلك لأن إيموفان قد يؤثر على عمل أدوية معينة أخرى. كما أن، بعض الأدوية قد تؤثر على عمل إيموفان. بالأخص إذا كنت تستعمل:

إيموفان قد يزيد من تأثير الأدوية التالية:

- أدوية لمعالجة الأمراض النفسية (الأدوية المضادة للذهان)
- أدوية لمعالجة الإكتئاب
- أدوية لمعالجة داء الصرع (مضادات الإختلاج)
- الأدوية المستعملة في العمليات الجراحية (أدوية التخدير)
- الأدوية المهبطة أو التي تقلل من القلق أو أدوية لمعالجة مشاكل النوم (الأدوية ذات التأثير المنوم)
- أدوية لمعالجة حمى العلف، الطحح، أو الحساسيات الأخرى، التي قد تسبب لك النعاس (مضادات الهيستامين المنومة) مثل كلورفينامين أو بروميتازين
- أدوية معينة لتسكين الألم المتوسط حتى الشديد (مسكنات الألم المخدرة) مثل كودئين، ميتادون، مورفين، أوكسيكودون، بتيدين أو ترامادول

الأدوية التالية قد تزيد من إحتمال حدوث أعراض جانبية إذا تم تناولها سوية مع إيموفان. لتقليل إحتمال حصول ذلك، من الجائز أن يقرر طبيبك على تخفيض المقدار الدوائي من إيموفان الذي تتناوله:

- مضادات حيوية معينة مثل كلاريتروميسين أو إريثروميسين
- أدوية معينة لمعالجة التلوثات الفطرية مثل كيتوكونازول وإيتراكونازول ريتونايفير (من فصيلة مثبثات الـ بروتياز) لمعالجة تلوث HIV
- إن إستعمال إيموفان بالتزامن مع مستحضرات أفبونية المفعول يزيد من خطورة حدوث نعاس، صمويات في التنفس، سبات والوفاة.
- يمكن إستعمال إيموفان بالتزامن مع مستحضرات أفبونية المفعول فقط عندما تكون الخيارات العلاجية الأخرى غير كافية. الرجاء إحك لطبيبك على كافة الأدوية أفبونية المفعول التي تتناولها وإحرص التقيد بتوصيات الطبيب بخصوص المقدار الدوائي.

الأدوية التالية قد تقلل من تأثير إيموفان:

- أدوية معينة لمعالجة الصرع مثل كاربامازيبين، فينوباربيتال أو فينيوتوين
- ريفامبيسين (مضاد حيوي) - لمعالجة التلوثات
- St. John's wort (دواء من منشأ نباتي) - لمعالجة تغيرات الحالة النفسية والإكتئاب

#### إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب الكحول خلال إستعمال إيموفان. الكحول قد يزيد من تأثير إيموفان ويسبب لك نوما عميقا جدا، بحيث تتنفس بشكل غير سليم أو أن تعاني من صعوبة في الإستيقاظ.

#### الحمل والإرضاع:

##### الحمل

لا يوصى بإستعمال إيموفان خلال فترة الحمل. إستشير طبيبك قبل تناول الدواء إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدن بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل.

إذا تم إستعماله خلال فترة الحمل، فهناك خطورة أن يتأثر الجنين من ذلك. لقد أظهرت عدة أبحاث على أنه من الجائز أن تحصل زيادة في خطورة حدوث شق في الشفة والحنك (يسمى أحيانا "شفة الأرنب") لدى المولود.

قد يحدث أيضاً تناقص في الحركة وتغيرات بنظم القلب لدى الجنين بعد تناول إيموفان خلال الثلث الثاني و/أو الثالث من الحمل. إذا تم تناول إيموفان في نهاية الحمل أو خلال الولادة، فقد يبدي رضيعك ضعف في العضلات، تناقص في حرارة الجسم، صعوبة في الإطعام ومشاكل في التنفس (تثبيت تنفسي). في حال تناول هذا الدواء بشكل دائم في مراحل الحمل المتأخرة، فقد يتطور لدى جنينك تعلق جسدي وقد يكون معرضاً لظهوره لتطوير أعراض الفطام مثل عصبية أو رجفان. في مثل هذه الحالة يجب مراقبة المولود بشكل حثيث خلال الفترة التي تلي الولادة.

#### الإرضاع

لا يجوز تناول إيموفان إذا كنت في فترة الرضاعة أو تخططين للإرضاع. وذلك لأن كميات ضئيلة قد تنتقل إلى حليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

#### السياقة وإستعمال الماكينات:

بالمشابه للأدوية الأخرى التي تستعمل لمشاكل النوم، إيموفان قد يؤدي لتباطؤ الأداء الوظيفي السليم للدماغ (تثبيت الجهاز العصبي المركزي). إن خطورة حدوث تضرر نفسي حركي بما في ذلك تضرر القدرة على السياقة، تزداد إذا:

● كنت تقوم بنشاطات تتطلب منك اليقظة خلال 12 ساعة من تناول إيموفان

● كنت تتناول مقداراً دوائياً أكبر من المقدار الدوائي الموصى به من إيموفان

● كنت تتناول إيموفان أثناء تناولك حالياً لدواء آخر يُثبِّط الجهاز العصبي المركزي أو لدواء آخر يرفع من نسب إيموفان في دمك، أو أثناء شرب الكحول

لا يجوز الإنشغال بنشاطات خطيرة التي تتطلب اليقظة التامة، مثل السياقة أو تشغيل الماكينات بعد تناول إيموفان، وخاصة، خلال 12 ساعة التي تلي تناول الدواء.

للحصول على معلومات إضافية حول الأعراض الجانبية المحتملة التي قد تؤثر على قدرتك على السياقة، أنظر الفقرة 4 من هذه النشرة.

#### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي إيموفان على:

● **لكتوز:** يعتبر هذا نوع من السكر. إذا قُبل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه للطبيب قبل بدء استعمال هذا الدواء.

● **صوديوم:** يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومول (23 ملغ) صوديوم في القرص، أي أنه فعلياً "خالٍ من الصوديوم".

● **جلوتين:** يحتوي هذا الدواء فقط على نسب منخفضة جداً من الجلوتين (من نشاء الحنطة) وهناك احتمالية منخفضة جداً بأن يؤدي إلى مشاكل إذا كنت مريض سيلياك (celiac). إذا وُجدت لديك حساسية للحنطة (التي تختلف عن مرض السيلياك)، فلا تتناول هذا الدواء. ● يحتوي قرص واحد ليس أكثر من 6 ميكروغرام جلوتين.

#### 3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب أن يكون العلاج قصيراً ما أمكن وألا يزيد عن 4 أسابيع بما في ذلك مرحلة التوقف عن العلاج.

يجب دائماً إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

#### الكبار:

المقدار الدوائي الإعتيادي هو قرص واحد من إيموفان (7.5 ملغ) حالاً قبل النوم.

#### المسنون:

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو نصف قرص (3.75 ملغ) حالاً قبل النوم. من الجائز أن يقرر الطبيب رفع المقدار الدوائي الخاص بك، إذا تطلب الأمر.

#### الأطفال والمراهقون:

إيموفان غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة. لم يُحدد بعد نجاعة وسلامة إيموفان لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

المتعاملون الذين لديهم مشاكل في الكبد، في التنفس أو في الكلى: المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو نصف قرص (3.75 ملغ) حالاً قبل النوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

#### فترة العلاج:

فترة العلاج الموصى بها هي يومين حتى 3 أسابيع.

#### شكل الإعطاء:

● يجب بلع الدواء مع الماء.  
● لا يجوز تقطيع أو مضغ الأقراص.

● بالإمكان شطر القرص إذا تطلب الأمر مقداراً دوائياً منخفضاً قدره 3.75 ملغ.

● يجب تناول المقدار الدوائي المطلوب من إيموفان دفعة واحدة ولا يجوز تناول جرعة إضافية بنفس الليلة.

● يجب تناول المستحضر عندما تكون في الفراش، حالاً قبل النوم، والتأكد من أنه يمكنك النوم 7-8 ساعات من دون إنزعاج.

● إذا تناولت مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو للمستشفى وأحضر معك عبلة الدواء.

إن تناول جرعة مفرطة من إيموفان هو خطير جداً. فأنت قد تعاني من الأعراض التالية:

● الشعور بنعاس، إرتباك، نوم عميق لا بل إمكانية حدوث سبات

● إرتشاء العضلات (قلة التوتر)

● الشعور بدوار، بضبابية أو إغماء. هذه الأعراض هي جراء إنخفاض ضغط الدم

● سقوطات أو فقدان التوازن (ترنح)

● تنفس سطحي أو صعوبات في التنفس (تثبيت تنفسي)

#### إذا نسيت تناول الدواء:

يجب تناول إيموفان حالاً قبل النوم فقط.

إذا نسيت تناول الدواء حالاً قبل النوم، فلا يجوز تناول الدواء في أي وقت آخر. وإلا، فأنت قد تشعر بنعاس، دوار وإرتباك خلال اليوم.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعتين سوية عوضاً عن المقدار الدوائي المنسي!

#### إذا توقفت عن تناول الدواء:

يجب مواصلة تناول إيموفان إلى أن يبلغ طبيبك بالتوقف.

لا تتوقف عن تناول إيموفان بشكل مفاجئ، بل إحك لطبيبك إذا كنت ترغب بالتوقف. سيحتاج الطبيب إلى خفض المقدار الدوائي الخاص بك وإيقاف العلاج تدريجياً على مدى فترة من الزمن.

في حال توقفت عن العلاج ب إيموفان بشكل مفاجئ، فإن مشاكل النوم قد تعود لديك، وأنت قد تعاني من "أعراض الفطام".

إذا حدثت هذه الحالة، فأنت قد تعاني من بعض الأعراض المُفضلة لاحقاً. يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض التالية:

● الشعور بقلق، قلة ثبات، عصبية، هياج، إرتباك أو لديك نوبات من القلق

● تعرق

● صداع

● ضربات قلب أسرع أو غير منتظمة (خفقان)

● تدني مستوى اليقظة ومشاكل في القدرة على التركيز أو التركيز

● كوابيس ليلية، رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هلوسة)

● حساسية زائدة عن المعتاد للضوء، للضجيج واللمس

● خلل في إدراك الواقع

● خدر والشعور بوخز في اليدين وفي راحتي القدمين

● آلام عضلية

● مشاكل في البطن

قد تظهر أيضاً في حالات نادرة تشنجات (إختلاجات).

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيموفان قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا:

- كنت تعاني من رد فعل تحسسي لـ إيموفان. العلامات يمكن أن تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية نادرة (rare)، أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000:

- تضرر الذاكرة منذ تناول إيموفان (نسيان). يمكنك تقليل احتمال حدوث هذا العرض، في حال تذكرك من أنه يمكنك النوم 7-8 ساعات بشكل متواصل من دون إزعاج بعد تناول إيموفان.

- رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هلوسة)

- سقوطات، بالأخص لدى المسنين

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد بعد شيوعها):

- أفكار عن أشياء غير حقيقية (أوهام)

- الشعور بإحباط أو حزن (تدني الحالة النفسية)

يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقم أو استمر أي عرض من الأعراض الجانبية التالية لأكثر من عدة أيام:

أعراض جانبية شائعة (common)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- طعم قليل المرارة أو معدني في الفم أو جفاف الفم

- الشعور بنعاس أو الميل للنوم

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- غثيان أو تقيؤ

- الشعور بدوخة أو نعاس

- صداع

- كوابيس

- الشعور بإرهاق جسدي أو نفسي

- عصبية

أعراض جانبية نادرة (rare)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- الشعور بإرتباك

- طفح حاك، درنات (شرى)

- الشعور بعصبية أو عدوانية

- تناقص الرغبة الجنسية

- صعوبة في التنفس أو ضيق نفس

أعراض جانبية ذات شيع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيعها بعد):

- الشعور بقلة راحة أو غضب

- الشعور بدوار أو مشاكل في التنسيق

- ازدواج الرؤية

- حركة غير ثابتة أو متأرجحة

- ضعف العضلات

- إضطراب في الهضم

- تطور تعلق بـ إيموفان

- تباطؤ التنفس (تثبيط تنفسي)

- شعور غير عادي في الجلد مثل خدر، وخز، نخز، إكتواء أو تنمل (paresthesia)

- مشاكل ذهنية مثل تضرر الذاكرة

- صعوبة التركيز

- إضطراب في النطق

قد يؤدي إيموفان إلى السير خلال النوم أو إلى سلوك شاذ آخر (مثل السياقة، تناول الطعام، إجراء مكالمات هاتفية أو ممارسة العلاقات الجنسية وإلى أخرى) حينما لا تكون يقظاً بشكل تام.

- الهذيان (تغير مفاجئ وشديد في الحالة العقلية قد يسبب مزيجاً من الإرتباك، التوهان و/أو إضطراب الإنتباه)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

**شروط التخزين:** يجب التخزين بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية. لا ترمي أي دواء في مياه الصرف الصحي أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد بعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على جودة البيئة.

## 6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

لكتوز (يحتوي كل قرص على 31.575 ملغ لكتوز مونو هيدرات) وآثار من الجلوتين (يحتوي كل قرص على 60 ملغ نشاء حنطة).

Wheat starch; Calcium hydrogen phosphate dihydrate; Lactose monohydrate; Hypromellose; Sodium starch glycollate type A; Titanium dioxide; Macrogol 6000; Magnesium stearate.

## كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص إيموفان هي عبارة عن أقراص مطيئة، بيضاء، بيضوية الشكل، عليها خط للشطر من جانب واحد.

حجم العلبة: 14، 20 قرصاً. من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العلب.

هذه النشرة لا تشمل كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفرت لديك أية أسئلة أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما، الرجاء مراجعة الطبيب.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي إسرائيل م.ض.، مجمع جرينبورك، ص.ب. 47، ياكوم.

تم إعدادها في شباط 2025 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

1011924581.

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

لمعلومات إضافية عن المستحضر ولنشرات طبية حديثة باللغة العبرية، العربية والإنجليزية إمسحوا الرمز التالي:

For further information about the preparation and for updated leaflets in Hebrew, Arabic and English, scan the following code:



بالإمكان التوجه بطلب لشركة سانوفي، صاحب الإمتياز الخاص بالمستحضر من أجل الحصول على نسخة مطبوعة للنشرة الطبية للمستهلك باللغة الإنجليزية

عن طريق التوجه للبريد الإلكتروني [PrintedLeaflet@sanofi.com](mailto:PrintedLeaflet@sanofi.com) أو عبر الهاتف رقم 09-8633081.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder sanofi by email: [PrintedLeaflet@sanofi.com](mailto:PrintedLeaflet@sanofi.com) or by telephone: 09-8633081.