

## حامل هذه البطاقة يتلقى العلاج بـ توفاسيتينيب تارو

اسم متلقي العلاج:

اسم الطبيب:

رقم هاتف الطبيب:

تاريخ بدء العلاج بـ توفاسيتينيب تارو:

تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مهمة حول توفاسيتينيب تارو. إذا لم تكن المعلومات واضحة بالنسبة لك، الرجاء مراجعة الطبيب أو الصيدلي ليشرحاً لك. يجب حفظ البطاقة وتقديمها لأي طبيب أو صيدلي ضالع في علاجك. إذا توقفت عن تناول توفاسيتينيب تارو، احتفظ بالبطاقة لمدة شهرين على الأقل بعد تناول آخر جرعة من توفاسيتينيب تارو. لمزيد من المعلومات، يجب قراءة نشرة المستهلك. يجب استعمال توفاسيتينيب تارو بموجب نشرة المستهلك.

**أخبر الطبيب أو الصيدلي بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية بوصفة طبيب، الأدوية بدون وصفة طبيب، الفيتامينات والمكملات الغذائية النباتية.** قد يؤدي تناول توفاسيتينيب تارو مع بعض الأدوية الأخرى إلى زيادة خطورة حدوث أعراض جانبية وتشبيط جهاز المناعة وحدوث حالات عدوى. قد يزيد العلاج بـ توفاسيتينيب تارو من خطر الإصابة بحالات العدوى والأورام الخبيثة (بما في ذلك سرطان الرئة، سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الجلد غير الميلانوما).

قد يكون متلقي العلاج الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق، معرضين لخطورة أعلى للإصابة بحالات عدوى، نوبة قلبية وأنواع معينة من السرطان. قد يقرر الطبيب أن توفاسيتينيب تارو غير مناسب لك.

راجع الطبيب فوراً إذا:

- أصبت بضيق مفاجئ في التنفس أو صعوبة في التنفس، آلام في الصدر أو الجزء العلوي من الظهر، انتفاخ في الرجل أو في الذراع، ألم أو حساسية في الرجل، أو احمرار أو تغير في لون الرجل أو في الذراع أثناء تناول توفاسيتينيب تارو، لأن هذه قد تكون علامات على وجود خثرة دموية في الرئتين أو الأوردة.
- أصبت بأعراض العدوى مثل الحمى، السعال المتواصل، انخفاض الوزن أو التعب المفرط.
- أصبت بأعراض القوباء المنطقية (الهربس النطاقي)، مثل حويصلات مؤلمة أو طفح مؤلم على الجلد.
- كنت على صلة قريبة مع شخص مصاب بالسل.
- أصبت بالآلام شديدة أو ضغط في الصدر (والتي قد تمتد إلى الذراعين، الفك، العنق، الظهر)، ضيق في التنفس، تعرق بارد، شعور بأنك على وشك الإغماء أو دوام مفاجئ لأن هذه قد تكون علامات نوبة قلبية.
- أصبت بتورم في الغدد الليمفاوية في العنق، الإبط أو الأربية، شعرت بالتعب المتواصل، أصبت بالحمى، تتعرق في الليل، لديك سعال متواصل أو يتفاقم، أصبت بصعوبة في التنفس، بحة في الصوت أو صفير، أو انخفاض غير مبرر في الوزن.
- لاحظت نشوء ورم جديد على الجلد أو أي تغيير في الشامات أو نقاط موجودة.
- أصبت بأعراض مرض الرئة الخلالي (interstitial lung disease) مثل ضيق التنفس.
- أصبت بعلامات وأعراض بطنية مثل آلام في المعدة، آلام في البطن، دم في البراز، أو أي تغيير في عادات التبرز مصحوباً بالحمى.
- أصبت باصفرار في الجلد، حالات الغثيان أو حالات التقيؤ.
- كنت تخطط لتلقي لقاح أيّاً كان. هناك أنواع معينة من اللقاحات يُمنع تلقيها أثناء العلاج بـ توفاسيتينيب تارو.
- حملت أو كنت تخططين للحمل.

يُمنع استعمال توفاسيتينيب تارو أثناء الحمل. يجب على النساء في سن الخصوبة استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج بـ توفاسيتينيب تارو ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد آخر جرعة. يُمنع الإرضاع أثناء العلاج بـ توفاسيتينيب تارو.

### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال البوابة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإمكان أيضا إبلاغ شركة تارو عن الأعراض الجانبية عبر البريد الإلكتروني: [drug.safety@sunpharma.com](mailto:drug.safety@sunpharma.com)

لتبسيط قراءة هذه البطاقة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين. لمعلومات إضافية حول المستحضر وللبطاقات المحدّثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، امسحوا الرمز التالي.



للحصول على نسخة ورقية من البطاقة باللغة الانجليزية يجب التوجّه لشركة تارو:

الهاتف: 04-8475700 البريد الإلكتروني: [info@sunpharma.com](mailto:info@sunpharma.com)

تمت المصادقة على هذه البطاقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة في نيسان 2025.

**بطاقة معلومات السلامة  
لمتلقي العلاج بـ توفاسيتينيب تارو  
(توفاسيتينيب 5 ملغ، 10 ملغ)**