

פורמט עלון זה ניקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

פניקול, טיפות עיניים

הרכב: Chloramphenicol 0.5%

חומרים בלתי פעילים:

Polyethylene Glycol 300, Polyoxyl 40 Stearate, Boric Acid, Sodium Borate, Disodium Edetate, Benzalkonium Chloride, Purified Water.

קבוצה תרפויטית: אנטי בקטריאלי

התוויות: לטיפול בזיהומים שטחיים של הלחמית והקרנית (עיניים)
הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לכלורמפניקול.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתרופה כאשר הינך בהריון שליש ראשון/אחרון או מיניקה.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. אין להשתמש
בתרופה זו כשחל שינוי בצבע התמיסה או שהיא הופכה לעכורה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד: הכבד, מערכת הדם
(כגון אנמיה או בעיות במח העצם).

אזהרות: אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת
בלי להיוועץ ברופא. בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך
לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקוניום
כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר
זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני
השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת
התרופה לעין.

תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת
זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע
סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד, לגבי
תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד קרישת דם ותכשירים לעיניים
המכילים סטרואידים.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה
עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

במקרים של תופעות רגישות יתר כמו אדמומית בעין, צריבה, גירוי בעין
או דיכוי מח העצם ואנמיה אפלסטית המתבטאת באדמומית בעור,

נפיחות מקומית, כאבי גרון, חיוורון, חום, חולשה, דימום חריג (מקרים נדירים), הפסק הטיפול ופנה מיד לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון: לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים, יש לפנות לרופא.

שים לב! לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש: רחץ היטב את ידיך, הטה ראשך לאחור או שכב על המיטה ובעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה ועצום עיניך למשך 1-2 דקות. אל תעפעף. למניעת זיהום התמיסה, הקפד שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האצבע או העין וסגור הבקבוק היטב. אין להשתמש בתרופה יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל־ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלעת מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר(ת) היא עלולה להזיק. אל תתני/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסון: שמור במקרר (2-8°C). גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רישום התרופה: 02-28584-15-126

יצרן: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.



ויטאמד

מק"ט: 05-610359