

صودقت هذه النشرة وفحص محتواها من قبل وزارة الصحة.
نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيدالة (مستحضرات) ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ النشرة بامعان حتى النهاية قبل البدء باستعمال الدواء.

فنيكول، نقاط للعينين

Chloramphenicol 0.5%

التركيب:

المواد الغير فعالة:

Polyethylene Glycol 300, Polyoxyl 40 Stearate, Boric Acid, Sodium Borate, Disodium Edetate, Benzalkonium Chloride, Purified Water.

المجموعة العلاجية: مضاد بكتيري.

الاستطباب: لعلاج التلوثات السطحية للملحمة والقرنية (العينين) الناجمة عن الجراثيم الحساسة لكلورمفنيكول.

متى يُمنع استعمال الدواء؟

يُمنع استعمال الدواء اذا كنت حاملاً في الثلث الاول/الاخير او مرضعة. يُمنع استعمال الدواء إذا كانت هناك حساسية لأحد مركباته. يُمنع استعمال هذا الدواء اذا كان هناك تغير في لون المحلول او اذا اصبح عكرًا.

يُمنع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج اذا كنت تعاني/ين او عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: الكبد، الجهاز الدموي (مثل انيميا او مشاكل في مخ العظام).

تحذيرات: يمنع استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة او لمدة طويلة بدون استشارة الطبيب. يجب اجراء فحوصات دم في فترة العلاج بهذا الدواء. إذا كانت لديك حساسية لنوع من الغذاء أو الدواء فعليك استشارة الطبيب قبل تناول الدواء. يحتوي المستحضر على المادة المحافظة كلوريد البنزلكونيوم الذي قد يُمتص من قبل عدسات لاصقة رقيقة. يُمنع استعمال المستحضر اذا كنت تستعمل عدسات لاصقة رقيقة. يجب ازالة العدسات قبل استعمال المستحضر، ويمكن اعادتها بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من ادخال الدواء للعين.

تفاعلات بين العقاقير:

اذا كنت تتعاطى/ين دواء آخر او انتهيت مؤخرًا من تعاطي دواء آخر، فعليك ابلاغ الطبيب المعالج لتفادي الاخطار او عدم نجاعة الدواء الناجمة عن تفاعلات بين العقاقير، خصوصًا الادوية من الفصائل الآتية: أدوية ضد تخثر الدم وادوية للعينين المحتوية على ستيروئيدات.

أعراض جانبية: بالإضافة للفعالية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء استعماله أعراض جانبية.

أعراض تلزم الإنتباه الخاص: في حالات ظهور حساسية مفرطة مثل احمرار

العينين، الشعور بالكي، تهيج في العين او اعياء مخ العظام وانيميا لا تكوينية وعلامات احمرار في الجلد، انتفاخ موضعي، آلام في الحلق، شحوب، حمى، ضعف، ادماء شان (حالات نادرة)، توقف / ي عن العلاج وتوجه / ي فوراً الى الطبيب. في كل حال تشعر / ين بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة أو إذا حدث تغير في شعورك العام، فعليك إستشارة الطبيب فوراً.

أعراض جانبية وتفاعلات بين العقاقير لدى الأطفال والرضع: يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب عن كل عرض جانبي يظهر لدى الطفل وعن كل دواء آخر يتناوله. أنظر / ي الأعراض الجانبية التي ذكرت أعلاه.

الجرعة: الجرعة حسب تعليمات الطبيب فقط. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. اذا لم يحدث تحسن في حالتك الصحية خلال عدة ايام، فعليك التوجه الى الطبيب. **إنقبه / ي:** ليس للابتلاع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

طريقة الاستعمال: اغسل يديك جيداً، احن رأسك الى الخلف، او استلق على السرير وبمساعدة الاصبع ابعد قليلا الجفن الاسفل عن العين، نقط الدواء الى داخل الفراغ المتكون واغلق العينين لمدة ١-٢ دقيقة. لا تغمز. لمنع التلوث المحلول حافظ / ي على ان لا تتلامس فتحة القنينة مع اي جسم آخر، بما في ذلك الاصبع او العين، اغلق القنينة جيداً. يُمنع استعمال الدواء اكثر من شهر بعد فتح القنينة لأول مرة.

كيف تساعد / ي في إنجاح العلاج؟

يجب اتمام العلاج الذي اوصى به الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج حتى اذا تحسنت حالتك الا بعد استشارة الطبيب.

تجنب / ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي أطفال و / او رضع وذلك لتفادي التسمم. إذا تناولت جرعة زائدة او اذا ابتلعت سهواً من الدواء، فعليك التوجه فوراً لغرفة طوارئ المستشفى ومعك عبوة الدواء. يمنع تسبب النقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب! وصف هذا الدواء لعلاج حالتك، فقد يكون ضارا لمريض آخر، لذلك لا تعط الدواء لأقربائك، جيرانك او معارفك. يمنع تناول أدوية في الظلام! افحص / ي طابع الدواء والجرعة في كل مرة تتناول / ين الدواء. استعمل / ي النظارات الطبية إذا لزم الامر.

التخزين: يحفظ في الثلاجة (2-8°C). حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة / التخزين الموصى بها، فالأدوية تبقى صالحة لفترة محدودة. الرجاء الانتباه لتاريخ انقضاء صلاحية الدواء! في حالة الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء. يُمنع خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم تسجيل الدواء: 126-15-28584-02

المنتج: فيتامين لصناعة الادوية م.ض.

العنوان: ص. ب. 114، بنيامينا 3055002، اسرائيل.