

פורמט עלון זה ניקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו ניבדק ואושר על ידו.
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא.
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

פנימיקסין, תמיסה

הרכב:

Chloramphenicol 0.2%, Polymixin B Sulphate 2500 u/ml.

חומרים בלתי פעילים:

PEG 300, Polyoxyl 40 Stearate, Boric Acid, Sodium Borate, Disodium Edetate, Benzalkonium Chloride, Purified Water.

קבוצה תרפויטית: חומרים אנטיביוטיים.

פעילות רפואית: לטיפול בזיהומים חיידקיים של העין הרגישים לתכשיר.
מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מיניקה.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד: הכבד, מערכת הדם
(כגון אנמיה, בעיות במח העצם).

אזהרות: בתקופת הטיפול בתרופה זו, יש לערוך בדיקות דם.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך
לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקוניום
כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר
זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני
השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת
התרופה לעין.

תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת
זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע
סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי
תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד קרישת דם, תכשירים אחרים
לשימוש בעיניים במיוחד המכילים סטרואידים.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש
עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: במקרה של תופעות מקומיות
של רגישות יתר כגון: גירוי, צריבה, אדמומיות או נפיחות (שלא היו
קיימות לפני השימוש בתכשיר), או דיכוי מח העצם, אנמיה אפלסטית
אשר מסממניהם חום, כאב גרון, חוורון, דימום חריג, חולשה (נדיר),
הפסק הטיפול ופנה לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות
לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך

להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות: על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים, יש לפנות לרופא שנית. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

שים לב! לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש: רחץ היטב את ידיך, הטה ראשך לאחור, או שכב על מיטה ובעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה ועצום עיניך למשך 1-2 דקות. אל תעפעף. למניעת זיהום התמיסה, הקפד שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האצבע או העין וסגור הבקבוק היטב. אין להשתמש בתרופה זו יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אל תתן תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכבי משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: שמור במקרר (2-8°C).

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רישום התרופה: 1004628582



יוטאמ

יצרן: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.

מק"ט: 07-610360