

تم تحديد هذه النشرة في وزارة الصحة ومحتواها فُحص وصدق.
نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦
هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب.
اقرأ النشرة بامعان حتى النهاية قبل البدء باستعمال الدواء.

فنيكسين، محلول

التركيب:

Chloramphenicol 0.2%, Polymixin B Sulphate 2500 u/ml.

المواد الغير فعالة:

PEG 300, Polyoxyl 40 Stearate, Boric Acid, Sodium Borate, Disodium Edetate, Benzalkonium Chloride, Purified Water.

المجموعة العلاجية: مضادات حيوية.

الفعالية الطبية: لمعالجة التلوثات الجرثومية للعين الحساسة للمستحضر.

متى يُمنع استعمال الدواء؟

يُمنع استعمال الدواء اذا كنت حاملاً او مرضعة.

يُمنع استعمال الدواء إذا كانت هناك حساسية لأحد مركباته.

يُمنع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج

إذا كنت تعاني/ين او عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: الكبد، الجهاز الدموي (مثل فقر الدم، مشاكل في مخ العظام).

تحذيرات: يجب اجراء فحوص دم في فترة العلاج بهذا الدواء.

إذا كانت لديك حساسية لنوع من الغذاء أو الدواء فعليك استشارة الطبيب قبل تناول الدواء. يحتوي المستحضر على المادة المحافظة كلوريد البنزلكونيوم الذي قد يُمتص من قبل عدسات لاصقة رقيقة. يُمنع استعمال المستحضر اذا كنت تستعمل عدسات لاصقة رقيقة. يجب ازالة العدسات قبل استعمال المستحضر، ويمكن اعادتها بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من ادخال الدواء للعين.

تفاعلات بين العقاقير: إذا كنت تتناول/ين أو انتهيت من تناول دواء آخر، فعليك ابلاغ الطبيب المعالج وذلك لتفادي المخاطر او عدم نجاعة الدواء الناجمة عن تفاعلات بين العقاقير، خصوصاً الأدوية من الفصائل الآتية: ادوية ضد تخثر الدم، مستحضرات اخرى لمعالجة العينين خصوصاً المحتوية على الستيروئيدات. أعراض جانبية: بالاضافة للفعالية المرغوبة للدواء، قد تظهر اثناء استعماله اعراض جانبية.

أعراض تلزم الانتباه الخاص: في حالات وجود فعالية موضعية الناجمة عن حساسية زائدة مثل: حكة، حرق، احمرار او انتفاخ (لم تكن موجودة قبل استعمال المستحضر)، او هبوط مخ العظام، انيميا لا تكوينية حيث اعراضها: حمى، الم الحلق، شحوب، نزيف حاد، وهن (نادرة)، توقف/ي عن العلاج وتوجه/ي للطبيب. في

كل حال تشعر/ين باعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، او اذا طرأ تغير في شعورك العام، فعليك استشارة الطبيب فوراً.

أعراض جانبية وتفاعلات بين العقاقير لدى الاطفال والرضع:

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي يظهر لدى الطفل/ة وعن كل دواء آخر يتناوله/تتناوله. انظر/ي الاعراض الجانبية والتفاعلات بين العقاقير المفصلة اعلاه.

الجرعة: الجرعة حسب تعليمات الطبيب فقط. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. اذا لم يحدث تحسن في حالتك الصحية خلال عدة ايام، فيجب التوجه للطبيب ثانية. يجب استعمال هذا الدواء في فترات محددة كما حُددت من قبل الطبيب المعالج.

إنقبه /ي: ليس للابتلاع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.
طريقة الاستعمال: اغسل يديك جيداً، احن رأسك الى الخلف، او استلق على السرير وبمساعدة الاصبع ابعد قليلا الجفن الاسفل عن العين، نقط الدواء الى داخل الفراغ المتكون واغلق العينين لمدة ١-٢ دقيقة. لا تغمض. لمنع التلوث المحلول حافظ /ي على ان لا تتلامس فتحة القنينة مع اي جسم آخر، بما في ذلك الاصبع او العين، اغلق القنينة جيداً. يُمنع استعمال الدواء اكثر من شهر بعد فتح القنينة لاول مرة.

كيف بإمكانك المساعدة في انجاح العلاج؟

يجب استيفاء العلاج الموصوف من قبل الطبيب. حتى اذا طرأ تحسن في حالتك الصحية، ممنوع التوقف عن تناول الدواء بدون استشارة الطبيب.

تجنب /ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي اطفال و/ او رضع وذلك لتفادي التسمم. إذا تناولت جرعة زائدة او اذا ابتلع ولد سهواً من الدواء، فعليك التوجه فوراً لغرفة طوارئ المستشفى ومعك عبوة الدواء. يُمنع تسبب التقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب! هذا الدواء وصف لمعالجة مرضك وقد يضر مريضاً آخر، لذلك يُمنع إعطاء الدواء لأقاربك، جيرانك أو معارفك. يُمنع تناول أدوية في الظلام! افحص /ي طابع الدواء والجرعة في كل مرة تتناول/ين الدواء. استعمل /ي النظارات الطبية إذا لزم الامر.

التخزين: يحفظ في الثلاجة (2-8°C).

حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة/التخزين الموصى بها، فالأدوية تبقى صالحة لفترة محدودة. الرجاء الانتباه لتاريخ انقضاء صلاحية الدواء! في حالة الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء. يُمنع خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم تسجيل الدواء: ١٠٠٤٦٢٨٥٨٢

المنتج:

فيتاميد لصناعة الادوية م.ض. ص. ب. ١١٤، بنيامينا ٣٠٥٥٠٠٢، اسرائيل.