

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) 1986
يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

أبيكسابان تيفع

2.5 ملغ

أقرص مطلية

التريكية

يحتوي كل قرص مطلي

على:

أبيكسابان 2.5 ملغ

Apixaban 2.5 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الأرجية في المستحضرة انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".
أفرا النشرة **بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**، تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا تورفت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
يُوصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعمله لأخرين، فهو قد يضرهم حتى لو بد أنك أن مرضهم مشابه لمرضك.
هذا الدواء غير مخصص لعلاج الأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عامًا.

بطاقة معلومات وقائية لمثقتي العلاج:

تحتوي هذه البطاقة على معلومات **وقائية هامة**، يجب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج بـ**أبيكسابان تيفع** وخلال فترة العلاج بـ**أبيكسابان تيفع**. تحتوي البطاقة على معلومات مخصصة لمثقتي العلاج وكذلك للطاقم الطبي، وهي تُزود مع العلاج بالإرشاد حول كيفية التقليل إلى الحد الأدنى من خطر حدوث النزيف الدموي الناتج عن العلاج بأي من المستحضرات المماثلة للتخثر.
كذلك، تحتوي البطاقة على التفاصيل الشخصية لمثقتي العلاج وعلى معلومات عن المستحضر **أبيكسابان تيفع**. اعرض هذه البطاقة على كل من يشارك في علاجك من أفراد الطاقم الطبي.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

أبيكسابان تيفع 2.5 ملغ

لمنع أحداث الخثار الوريدي لدى المرضى البالغين بعد الخضوع لجراحة اختيارية لاستبدال مفصل الورك أو الركبة.
لمنع السكتة الدماغية والانصمامات لدى المرضى البالغين الذين يعانون من رجفان أذيني (غير منسوب إلى صمامات القلب) ولديهم عامل خطر واحد على الأقل، مثل سكتة دماغية أو حدث إقفاري عابر سابق، عمر 75 عامًا فما فوق، فرط ضغط الدم، سكري، قصور القلب المصحوب بأعراض.
لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (خثار الأوردة الدموية العميقة) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (الانصمام الرئوي).
ولمنع معاودة الخثرات الدموية في هذه الأوعية الدموية.

أبيكسابان تيفع 5 ملغ

لمنع السكتة الدماغية والانصمامات لدى المرضى البالغين الذين يعانون من رجفان أذيني (غير منسوب إلى صمامات القلب) ولديهم عامل خطر واحد على الأقل، مثل سكتة دماغية أو حدث إقفاري عابر سابق، عمر 75 عامًا فما فوق، فرط ضغط الدم، سكري، قصور القلب المصحوب بأعراض.
لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (خثار الأوردة الدموية العميقة) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (الانصمام الرئوي).

الفصلية العلاجية

مضاد للتخثر

2. قَبْلِ استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من نزيف دموي نشط وملحوظ.
- كنت تعاني من مرض في الكبد يؤدي إلى اضطراب في التخثر وإلى خطر نشوء حالات نزيف دموي.

كنت تعاني من إصابة أو من وضع طبي فيه خطر متزايد لنشوء نزيف دموي، مثل قرحة نشطة في المعدة أو الأوعية أو أنها حدثت مؤخرًا، ورم خبيث مع خطر متزايد لنشوء نزيف دموي، إصابة دماغية أو إصابة في العمود الفقري حديثًا مؤخرًا، نزيف داخل الجمجمة حدث مؤخرًا، دولالي (توسع الأوردة) في المريء أو شك بوجودها، عيب شرياني-وريدي، أم الدم (النيوريزم) أو خثار ملحوظ في الأوعية الدموية في الدماغ أو في العمود الفقري.

خضعت مؤخرًا لجراحة في الدماغ، جراحة في العمود الفقري أو جراحة في العنقين.

كنت تستعمل مستحضرات أخرى من مضادات التخثر، مثلًا مضادات التخثر التي تعطى عن طريق الفم (مثل وارفارين، وريفاوروكسابان، دابيجاتران، هيبيرارين، هيبيرارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض (مثل إبيكسابان، دوالي (توسع الأوردة) في المريء أو شك فونديارينيوكس)، باستثناء حالات الانتقال من العلاج أو إلى العلاج بـ**أبيكسابان تيفع** أو إذا تم تركيب أنبوب قسطرة داخل الوريد أو داخل الشريان وهناك حاجة إلى إعطاء هيبيرارين من خلاله من أجل إبقائه مفتوحًا.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قد يسبب هذا الدواء تغيرات في فحوص الدم.

قبل العلاج بأبيكسابان تيفع أخبر الطبيب إذا:

كنت مصرا.

كنت تعاني من مرض خطير في الكليتين أو كنت تخضع للعلاج بالتدلي (غسيل الكلى).

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد.

في وظائف الكبد، حيث تؤدي غاية الحذر لدى المرضى الذين لديهم تغيرات في وظيفة الكبد.

كنت تعاني من وضع طبي من شأنه أن يزيد من خطر نشوء نزيف دموي، مثل اضطراب زففي يشمل الانخفاض في فعالية صفائح الدم، فرط ضغط الدم الخطير غير الخاضع للسيطرة بواسطة العلاج الدوائي.

كنت تبلغ أكثر من 75 عامًا من العمر، إذا كان وزنك 60 كجم أو أقل من ذلك.

أشدك لك أنبوب (أنبوب قسطرة) أو أنك تلقيت حقنة داخل العمود الفقري (إجراء تخدير أو لتسكين الآلام) قريبًا من موعد إعطاء الدواء.

سيرشدك الطبيب إلى تناول الدواء بعد إخراج أنبوب القسطرة بـ 5 ساعات أو أكثر.

وجد لديك صمام قلب غير اصطناعي.

قرر طبيبك أن ضغط دمك غير مستقر أو أنه قد خُطط لك علاج آخر أو إجراء جراحي لاستئصال الخثرة الدموية من الرئتين.

كنت حساسًا لغذاء ما أو لدواء ما.

كنت تعاني من مشكلة خلقية (منذ الولادة) من عدم تحمّل الجالاكتوز، نقص في لابي-لاكتاز أو سوء امتصاص

جوكوز-جالاكتوز.

كان من المقرر أن تخضع لجراحة أو لعلاج قد يسببان نزيفًا دمويًا. يجب عليك، يُحتمل أن يطلب منك الطبيب إيقاف العلاج بالدواء لفترة قصيرة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان العلاج قد يسبب النزيف، فيجب استشارة الطبيب.

كنت تعاني من متلازمة أضداد هيبوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي يزيد من خطر نشوء خثرات دموية). يُحتمل أن يقرر طبيبك إجراء تغيير في العلاج.

الفحوص والمراقبة

قبل البدء باستعمال الدواء سيجليك طبيبك الفحص وظائف الكبد.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أن أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، ف**أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة بذلك**. خاصةً يجب إعلام الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تستعمل:

• قد تزيد الأدوية التالية من تأثير **أبيكسابان تيفع** وتزيد من احتمال نشوء نزيف غير مرغوب به:

- أدوية معينة ستُستعمل لعلاج التلوث الفطري (مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، فيتوكونازول).
- أدوية HIV (مثل إينديز (مثل نيتونايفر).
- أدوية ستُستعمل لعلاج فرط ضغط الدم أو مشاكل القلب (مثل ديلتيازيم).

• أدوية إضافية ستُستعمل لتقليل تَكُون الخثرات الدموية (مثل إيوكسابارين).

- أدوية مضادة للتهاب أو مسكّنة للألم، مثل نابروكسين أو الأيبوبريفن. بالخاص إذا كنت تبلغ أكثر من 75 عامًا من العمر وتستخدم الأيبوبريفن فانت أكثر عرضة لخطر نشوء نزيف دموي.

- أدوية مضادة للاكتئاب من فصيلة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقالية (SSRI) أو من فصيلة مثبطات استرداد السيروتونين-التوربيبيبتيرين (SNRI).

• قد تقلل الأدوية التالية تركيز **أبيكسابان تيفع** في الدم ولذلك قد تقلل من فعالية: أدوية لعلاج السلس أو ثلوثات أخرى

(مثل فينيتوين، فينوباربیتال وكاربامازيبين)،

العرن (St. John's wort)، شمية طبية ستُستعمل لعلاج الاكتئاب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج بأي دواء إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو كان هناك شك بوجود حمل أو كنت تحظطين حملًا.

تأثيرات **أبيكسابان تيفع** على الحمل أو على الجنين غير معروفة. لا يجوز استعمال **أبيكسابان تيفع** إذا كنت حاملاً. إذا حدث لديك حمل خلال فترة استعمال الدواء، ف**تصلي بطبيبك بشكل فوري**.

إذا كنت مرضعاً فيجب استشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال **أبيكسابان تيفع**. ليس معلوماً ما إذا كان المرضعة سيوصي بنتقل إلى طبي الأم.

توصي الطاقم الطبي بما يليق بالإيقاف الإرضاع أو إيقاف/عدم البدء بالعلاج بـ**أبيكسابان تيفع**.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي **أبيكسابان تيفع** على اللاكتوز (نوع من السكريات). إذا أخيرك طبيبك بأن لديك عدم تحمّل (حساسية) لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل أن تستعمل هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في القرص ولذلك يعتبر خاليًا من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية

يجب إعطاء الجرعة العلاج سيدجدهما الطبيب فقط.

- يجب ابتلاع الدواء مع الماء.
- لا يجوز شطر الأقرص عند عدم وجود خط للشرط.

إذا استصعبت بلع القرص بأكمله، فتحدّث مع طبيبك عن طرق إضافية ممكنة لتناول **أبيكسابان تيفع**. قبل تناولها، يمكن هرس القرص وخلطه مع الماء، مع 5% جوكوز بـالماء، مع عصير التفاح أو مع هريس التفاح.

إرشادات الهريس:

- اهرس القرص بواسطة الهاون والمدقة.

- أقل كل المسحوق بجزر إلى داخل وعاء مناسب واخلط مع القليل من السائل، ما يقارب 30 ملل (ملعقتين كبيرتين)

- من الماء أو من أحد السوائل الأخرى المذكورة أعلاه.

- ابلع الخليط.

- اشطف الهاون والمدقة اللذين استعنت بهما لهرس القرص بالقليل من الماء أو بأحد السوائل الأخرى (30 ملل) داخل الوعاء الذي حوى الخليط وابلع سائل الشطف.

عند الحاجة يستطيع طبيبك أن يعطيك **أبيكسابان تيفع** بواسطة أنوب أفقي-معدّي.

العلاج لغرض منع أحداث الخثار الوريدي لدى المرضى البالغين بعد الخضوع لجراحة اختيارية لاستبدال مفصل الورك أو الورك:

الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد من **أبيكسابان تيفع 2.5 ملغ** مرتين في اليوم، مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص واحد في المساء، حاول أن تتناول الدواء في أوقات محددة كل يوم، من أجل الحصول على التأثير الأفضل للعلاج. يجب البدء باستعمال الدواء بعد ما يقارب 12-24 ساعة من الجراحة. لا يجوز التوقف عن استعمال

الدواء إلا إذا أخيرك الطبيب بذلك.

مدة العلاج المتبعة هي 32-38 يوماً بعد جراحة في الورك، أو 14-10 يوماً بعد جراحة في الركبة.

العلاج لمنع السكتة الدماغية والانصمامات لدى المرضى البالغين الذين يعانون من رجفان أذيني (غير منسوب إلى صمامات القلب) ولديهم عامل خطر واحد على الأقل، مثل سكتة دماغية أو حدث إقفاري عابر سابق، عمر 75 عامًا
سكتة دماغية أو حدث إقفاري عابر سابق، عمر 75 عامًا
فيما فوق؛ فرط ضغط الدم، سكري، قصور القلب المصحوب
بأعراض:

الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد من **أبيكسابان تيفع 5 ملغ** مرتين في اليوم.

سيتم تقليل الجرعة الدوائية الموصى بها إلى **2.5 ملغ** مرتين في اليوم إذا:

- كنت تعاني من انخفاض خطير في وظيفة الكليتين.

- تحقّق أثنان على الأقل من بين المعايير التالية:

- أشارت فحوص الدم إلى تنن في الوظيفة الكلوية (قيمة الكرياتينين في مصل الدم \leq 1.5 ملغ/ديسيلتر).

- عمرك 80 عامًا أو متقدم أكثر في السن.

- وزنك 60 كجم أو أقل من ذلك.

الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد مرتين في اليوم، مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص إضافي في المساء، حاول أن تتناول الدواء في أوقات محددة كل يوم، من أجل الحصول على التأثير الأفضل للعلاج.

سيقرر طبيبك المدة الزمنية التي يتعين عليك مواصلة العلاج طولها.

علاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين وفي الأوعية الدموية الرئوية:

الجرعة الدوائية الموصى بها هي **قرصان** من **أبيكسابان تيفع 5 ملغ** مرتين في اليوم طوال الأيام الـ 7 الأولى، مثلاً، قرصان في الصباح وقرصان في المساء.

بعد الأيام العلاجية الـ 7 الأولى، الجرعة الدوائية الموصى بها هي **قرص واحد من أبيكسابان تيفع 5 ملغ** مرتين في اليوم، مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص إضافي في المساء. حاول أن تتناول الدواء في أوقات محددة كل يوم، من أجل الحصول على التأثير الأفضل للعلاج.

منع معاودة الخثرات الدموية بعد اتمام 6 أشهر علاجية:

الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد من **أبيكسابان تيفع 2.5 ملغ** مرتين في اليوم، مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص إضافي في المساء. حاول أن تتناول الدواء في أوقات محددة كل يوم، من أجل الحصول على التأثير

سيقرر طبيبك المدة الزمنية التي يتعين عليك مواصلة العلاج طولها.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

قد يمار طبيبك أجزاء التغييرات التالية على العلاج المضاد للتخثر الذي تتلقاه:

الانتقال من العلاج بـ**أبيكسابان تيفع** إلى العلاج بمستحضرات أخرى مضادة للتخثر:

• إذا أردت إيقاف استعمال **أبيكسابان تيفع** والبدء بالعلاج بمستحضر آخر مضاد للتخثر (مثل هيبيرارين) في الموعد الذي كنت ستتناول فيه الجرعة القادمة من **أبيكسابان تيفع**.

الانتقال من العلاج بمستحضر آخر مضاد للتخثر إلى العلاج بـ**أبيكسابان تيفع**.

يجب إيقاف العلاج بالمستحضر المضاد للتخثر والبدء بالعلاج بـ**أبيكسابان تيفع** في الموعد الذي كنت ستتناول فيه الجرعة القادمة من المستحضر المضاد للتخثر. بعد ذلك، يجب الاستمرار وفقاً للجرعة الدوائية الموصى بها.

- الانتقال من العلاج بمستحضرات مضادات فيتامين K (مثل وارفارين) إلى العلاج بـ**أبيكسابان تيفع**.

يجب إيقاف فحوصات بمضادات فيتامين K. يتعين على الطبيب إجراء فحوصات الدم وأخذ يرشدك بخصوص موعد البدء بالعلاج بـ**أبيكسابان تيفع**.

الانتقال من العلاج بـ**أبيكسابان تيفع** إلى العلاج بمستحضرات مضادات فيتامين K (مثل وارفارين):

إذا أردت طبيبك إلى البدء بالعلاج بمستحضرات مضادات فيتامين K، فيجب الاستمرار في استعمال **أبيكسابان تيفع** لما لا يقل عن يومين إضافيين بعد تناول الجرعة الأولى من مضاد فيتامين K. يتعين على الطبيب أن يجري فحوصات الدم وأن يرشدك بخصوص موعد انتهاء العلاج بـ**أبيكسابان تيفع**.

متلقو العلاج الذين يخضعون لتقويم النظم القلبي كهربائياً

إذا تعيّن إرجاع دقات القلب غير المنتظمة لديك إلى الوضع المنظم بواسطة إجراء طبي يسمى تقويم نظم القلب الكهربائي (Cardioversion)، فاستمعل **أبيكسابان تيفع** في الأوقات التي يرشدك طبيبك إليها، من أجل منع الخثرات الدموية في الأوعية الدموية في الدماغ وفي أوعية دموية أخرى في جسمك.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو في غرفة الطوارئ في المستشفى

وأحضر معك عبوة الدواء. فرط الدواء الدوائية قد يسبب نزيفًا دمويًا، في حالة نشوء نزيف دموي قد تحدثا إلى نقل الدم أو إلى عملية جراحية.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تذكرك وتناول القرص القادمة في الوقت الاعيادي.

بعد ذلك، يجب الاستمرار وفقاً للجرعة الدوائية الموصى بها بشكل روتيني. إذا لم تكن راقفاً من كيفية التصرف أو إذا نسيت أكثر من جرعة واحدة، فعليك استشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى لو طرا تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

لا توقفت عن استعمال الدواء أبكر من اللازم، فقد تعاني من تطور خثرات دموية.

لا يجوز تناول الأدوية في العمدةٔ راجع الملصق وتأكد من إذا كنت في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا تورفت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **أبيكسابان تيفع** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض مستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعاني من أي واحد منها. قد تتفاوت الأعراض الجانبية ومدى شوعها عند تفاوتواي الاستعمال المختلفة، وهي مفصلة لإعاًك داعي استعمال المستحضر الجانبي الأكثر شوعاً لـ **أبيكسابان تيفع** هو النزيف الدموي، الذي قد يشكل خطراً على الحياة ولذلك يتوجب التوجّه الفوري إلى الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تميز إعطاء أبيكسابان تيفع عند الخضوع لجراحة اختيارية لاستبدال مفصل الورك أو الورك:

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 10 أشخاص):

فقر الدم الذي قد يسبب التعب أو الشحوب

نزيف دموي يشتمل على كدمات وتورّم

غثيان (شعور بالمرض)

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 100 شخص):

انخفاض في عدد الصفائح في الدم (قد يؤثر على تخثر الدم)

نزيف دموي، بما في ذلك: نزيف دموي في أعقاب عملية جراحية ويشمل كدمات وتورّمًا، إفراز الدم أو السوائل من الشق (الجراحي) أو من موضع الحقن؛ نزيف دموي في المعدة، في الإرعاء أو دم أحمر/فاتح في البراز، دم في البول، نزيف دموي من الأنف (رعاف)، نزيف دموي من المهبل

انخفاض في ضغط الدم مما قد يسبب إحساسًا بالإغماء أو نبضًا متسارعًا

تغيرات في فحوص الدم قد تظهر: نتائج شاذة لوظائف الكبد، ارتفاعًا في إنزيمات الكبد، ارتفاعًا في البيليروبين (نتائج تحلّل خلايا الدم الحمراء الذي يتمثل باصفرار الجلد والعينين)

حكة

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 1.000 شخص):

رد فعل تحسسي (فرط الحساسية) قد يسبب انتفاخًا في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان و/أو الحلق وصعوبات في التنفس. **يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك أحد هذه الأعراض.**

نزيف دموي في داخل العضلة، نزيف دموي في العين، نزيف دموي من اللثة وسعال دموي، نزيف دموي من فتحة الشرج

• تساقط الشعر

أعراض جانبية مدى شوعها غير معروف (لا يمكن تقدير مدى شوعها من المعلومات المتوفرة):

• نزيف دموي بما في ذلك: نزيف دموي دماغي، نزيف دموي في العمود الفقري، نزيف دموي في الرئتين أو في الحلق، نزيف دموي في الفم، نزيف دموي في تجويف البطن أو نزيف دموي إلى داخل الحيز الموجود خلف تجويف البطن، نزيف دموي من البواسير، فحوص يشاهد فيها دم في البراز أو في البول

• طفح جلدي قد يكوّن حويصلات ويبدو كأهداف صغيرة (بقعة مركزية غامقة محاطة بمساحة شاحبة، مع حلقة غامقة حول الحواف) (حماىي متعددة الأشكال - *erythema multiforme*)

• التهاب في الأوعية الدموية (فاسكوإليرتيس - التهاب وعائي) قد يسبب طفحًا جلديًا أو بقعًا محددة، مسطحة، حمراء ومستديرة تحت سطح الجلد، أو كدمات

الأعراض الجانبية التي تميز إعطاء أبيكسابان تيفع عند العلاج لمنع السكتة الدماغية والانصمامات لدى المرضى البالغين الذين يعانون من رجفان أذيني (غير منسوب إلى صمامات القلب) ولديهم عامل خطر واحد إضافي على الأقل:

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 10 أشخاص):

• نزيف دموي بما في ذلك: نزيف دموي في العينين، نزيف دموي في المعدة أو في الأمعاء، نزيف دموي في فتحة الشرج، دم في البول، نزيف دموي من الأنف (رعاف)، نزيف دموي من اللثة، كدمات وتورّم

فقر الدم الذي قد يسبب التعب أو الشحوب

ضغط دم منخفض قد يسبب إحساسًا بالإغماء أو نبضًا متسارعًا

غثيان (شعور بالمرض)

فحوص دم قد تُظهر ارتفاعًا في جاما-جلوتاميل-ترانسفيراز (GGT)

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 100 شخص):

• نزيف دموي، بما في ذلك: نزيف دموي دماغي، نزيف دموي في العمود الفقري، نزيف دموي من الفم أو سعال دموي، نزيف دموي إلى داخل تجويف البطن، نزيف دموي في أعقاب المهبل، دم أحمر/فاتح في البراز، نزيف دموي في أعقاب عملية جراحية ويشمل كدمات وتورّمًا، إفراز الدم أو السوائل من الشق (الجراحي) أو من موضع الحقن؛ نزيف دموي من البواسير، فحوص يشاهد فيها دم في البراز أو في البول

• انخفاض في عدد الصفائح في الدم (قد يؤثر على تخثر الدم)

تغيرات في فحوص الدم قد تظهر: نتائج شاذة لوظائف الكبد، ارتفاعًا في إنزيمات الكبد، ارتفاعًا في البيليروبين (نتائج تحلّل خلايا الدم الحمراء الذي يتمثل باصفرار الجلد والعينين)

طفح جلدي

حكة

• تساقط الشعر

• رد فعل تحسسي (فرط الحساسية) قد يسبب انتفاخًا في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان و/أو الحلق وصعوبات في التنفس. **يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك أحد هذه الأعراض.**

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 1.000 شخص):

• نزيف دموي في الرئتين أو في الحلق، نزيف دموي إلى داخل الحيز الموجود خلف تجويف البطن، نزيف دموي إلى داخل العضلة

أعراض جانبية نادرة جدًا (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 10.000 شخص):

• طفح جلدي قد يكوّن حويصلات ويبدو كأهداف صغيرة (بقعة مركزية غامقة محاطة بمساحة شاحبة، مع حلقة غامقة حول الحواف) (حماىي متعددة الأشكال - *erythema multiforme*)

• التهاب في الأوعية الدموية (فاسكوإليرتيس - التهاب وعائي) قد يسبب طفحًا جلديًا أو بقعًا محددة، مسطحة، حمراء ومستديرة تحت سطح الجلد، أو كدمات

الأعراض الجانبية التالية مطومة إذا كنت تستعمل أبيكسابان تيفع لعلاج لمنع معاودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين أو في الأوعية الدموية في الرئتين:

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحد أقصى من بين 100 شخص):

• نزيف دموي بما في ذلك: نزيف دموي من الأنف (رعاف)، نزيف دموي من اللثة، دم في البول، كدمات وتورّم، نزيف دموي في البطن، نزيف دموي في الأمعاء ونزيف دموي في فتحة الشرج، نزيف دموي في الفم، نزيف دموي من السوائل من الشق (الجراحي) أو من موضع الحقن؛ نزيف دموي من البواسير، فحوص يشاهد فيها دم في البراز أو في البول

• انخفاض في عدد الصفائح في الدم (قد يؤثر على تخثر الدم)

تغيرات في فحوص الدم قد تظهر: نتائج شاذة لوظائف الكبد، ارتفاعًا في إنزيمات الكبد، ارتفاعًا في البيليروبين (نتائج تحلّل خلايا الدم الحمراء الذي يتمثل باصفرار الجلد والعينين)

طفح جلدي

حكة

• تساقط الشعر

• رد فعل تحسسي (فرط الحساسية) قد يسبب انتفاخًا في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان و/أو الحلق وصعوبات في التنفس. **يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا نش**