

نشرة معلومات المستهلك وفقًا للوائح الصيدلة (المستحضرات) - 1986

لا يصرف هذا الدواء إلا بوصفة من الطبيب.

فوكزوجو 0.4 مجم

فوكزوجو 0.56 مجم

فوكزوجو 1.2 مجم

مسحوق ومذيب لمحلول الحقن

المادة الفعالة ومقدارها:

- فوكزوجو 0.4 مجم:**

تحتوي كل قنينة مسحوق على 0.4 ملليجرام من فوسوريتيد، 0.4 mg vosoritide

- فوكزوجو 0.56 مجم:**

تحتوي كل قنينة مسحوق على 0.56 ملليجرام من فوسوريتيد، 0.56 mg vosoritide

- فوكزوجو 1.2 مجم:**

تحتوي كل قنينة مسحوق على 1.2 ملليجرام من فوسوريتيد، 1.2 mg vosoritide

المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية - انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن هذا الدواء. إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

تم وصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطه للآخرين. فقد يضرهم حتى وإن بدا لك أن حالتهم الصحية مشابهة لчалتك.

1. ما هي دواعي استخدام هذا الدواء؟

لا يوصى باستخدام هذا المنتج المعتمد إلا في حالة الودانة الناجمة عن طفرات في الجين FGFR3، حسبما يتأكد من الاختبارات الجينية.

يحتوي فوكزوجو على المادة الفعالة فوسوريتيد وهو مشابه لبروتين في الجسم يُعرف بالببتيد المدر للصوديوم من النوع C type natriuretic peptide. يُصنع فوسوريتيد باستخدام تكنولوجيا مؤتلفة تتضمن بكتيريا جرى تعديلها لتنضمن جيئًا لإنتاج البروتين.

يستخدم هذا الدواء لعلاج الودانة في المرضى الأطفال الذين لا تزال عظامهم تنمو. الودانة حالة وراثية تؤثر على نمو كافة العظم في الجسم تقريبًا، بما في ذلك الجمجمة والعمود الفقري والذراعين والساقين، مما يؤدي إلى قصر القامة بشدة مع مظهر مميز.

تعمل المادة الفعالة في فوكزوجو مباشرةً على نقاط النمو في العظام لتعزيز نمو عظم جديد.

المجموعة العلاجية:

أدوية لعلاج أمراض العظام، وأدوية أخرى تؤثر على بنية العظام وتمعدنها.

2. قبل استخدام هذا الدواء

X لا تستخدم هذا الدواء إذا:

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالمساسية (ألرجي) للمادة الفعالة (فوسوريتيد) أو لأي من المكونات الأخرى التي يحتويها هذا الدواء (أنظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة بشأن استخدام هذا الدواء.

ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام فوكزوجو إذا:

- كنت أنت أو طفلك مصابين بمرض قلبي خطير أو بمشكلات في ضغط الدم
- كنت أنت أو طفلك تتناولن أو تناولتما مؤخرًا أدوية تخفف ضغط الدم
إن كان أي من ذلك ينطبق عليك أو على طفلك، أو إن لم تكن متأكدًا، فاستشر الطبيب قبل استخدام فوكزوجو.

التأثيرات على ضغط الدم

يمكن لفوكزوجو أن يخفف ضغط الدم. ونتيجة لذلك، قد تشعر بالدوخة أو الغثيان أو التعب. عادةً ما يعود ضغط الدم إلى طبيعته خلال 90 دقيقة من حقن فوكزوجو. إن حدثت تلك التأثيرات وكانت شديدة، فأبلغ طبيبك.

يمكن أن يؤدي الإكتار من شرب السوائل قبل وقت الحقن إلى تقليل احتمالية تلك التأثيرات. يوصى بتناول المرضى لوجبة خفيفة وشرب ما يكفي من سوائل (كالماء أو الحليب أو العصير) قبل حوالي 30 دقيقة من الحقن، انظر القسم 3 "كيفية استخدام هذا الدواء".

الأطفال والمراهقون

لا توجد معلومات كافية عن استخدام هذا الدواء للأطفال دون سن 4 أشهر، وبالتالي لا يمكن تقديم توصية بشأن الجرعات.

الفحوصات والمراقبة

ينبغي مراقبتك وتقييمك بانتظام كل 3-6 أشهر للتحقق من وزن جسمك ونموك وتطورك البدني.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تباع دون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر طبيبك أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع الطبيعي

يرجى استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء إذا كانت المريضة الحامل أو المرضعة تعتقد بأنها حامل أو تخطط لإنجاب طفل.

يوصى بعدم استخدام هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

القيادة واستخدام الآلات

قد يسبب هذا الدواء شعورًا بالدوار أو الدوخة الخفيفة أو التعب أو ربما تشعر بالغثيان بعد فترة وجيزة من الحقن. إذا ظهر عليك أي أثر جانبي، فينبغي عليك تجنب القيادة، أو ركوب الدراجات، أو القيام بالأنشطة البدنية، أو استخدام الآلات، لمدة حوالي ساعة بعد الحقن أو حتى تشعر بتحسن.

يحتوي فوكزوجو على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مللي مول من الصوديوم (23 ملليجرام) لكل جرعة، أي أنه يكاد يكون "خالئًا من الصوديوم".

3. كيفية استخدام هذا الدواء؟

ينبغي أن يقوم مقدم الرعاية بحقن فوكزوجو. لا تحقن طفلك بفوكزوجو حتى حصولك على التدريب اللازم من اختصاصي الرعاية الصحية.

ينبغي استخدام هذا الدواء دومًا حسب إرشادات الطبيب تمامًا. تحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا راودك الشك.

الجرعة المعتادة هي:

يجب أن تُحدد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط.

ويعتمد تحديد الجرعة على وزن طفلك.

سيقبرك الطبيب بكمية محلول الحقن التي يجب حقنها. إن لم تكن متأكدًا، فاسأل الطبيب أو الصيدلي.

يُنصح المريض بتناول وجبة خفيفة وشُرَب كمية كافية من السوائل (مثل الماء، أو الحليب، أو العصير) قبل حوالي 30 دقيقة من الحقن. يمكن أن يقلل ذلك من الآثار الجانبية، مثل الدوخة أو التعب أو الغثيان (الميل للتقيؤ).

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستخدام

احقن فوكزوجو ببطء تحت الجلد (الحقن تحت الجلد).

ينبغي الحقن في نفس الساعة تقريبًا من كل يوم.

يوصى أن تقوم بالحقن في موضع مختلف كل يوم ولا تحقن في نفس الموضع في يومين متعاقبين.

لا تحقن هذا الدواء في الوحمات أو الندوب أو علامات الولادة أو في المناطق التي يكون فيها الجلد مؤلمًا عند لمسه، أو مرضوضًا، أو أحمر، أو متصلبًا.

يوضع الجدول 1 الجرعة التي ستحتاج أنت أو طفلك إلى حقنها يوميًا بناءً على وزن الجسم. قد يتم تقديم الكمية التي يجب حقنها بأحجام مختلفة بناءً على نوع المحقنة المضمنة في العبوة (مليلتر (مل) أو وحدات (U)). في هذه المجموعة، يتم قياس المحقنة المضمنة بالوحدات (U). يُرجى التأكد من أن لديك الجرعة الصحيحة للحقنة التي تستخدمها.

الجدول 1: أحجام الجرعة الفردية حسب وزن الجسم بالمليلتر ووحدات الحجم (U)

وزن الجسم (كجم)	الجرعة (مجم)	فوسوريتيد (مجم)	فوسوريتيد المذيب (ما، للحقن): (مل)	فوسوريتيد المذيب (ما، للحقن): (مل)
4	0.12 مجم	0.15 ملل	15 وحدة	1.2 مجم
5	0.16 مجم	0.20 ملل	20 وحدة	0.6 ملل
7-6	0.20 مجم	0.25 ملل	25 وحدة	0.7 ملل
11-8	0.24 مجم	0.30 ملل	30 وحدة	0.8 مجم/ملل
16-12	0.28 مجم	0.35 ملل	35 وحدة	
21-17	0.32 مجم	0.40 ملل	40 وحدة	
32-22	0.40 مجم	0.50 ملل	50 وحدة	
43-33	0.50 مجم	0.25 ملل	25 وحدة	
59-44	0.60 مجم	0.30 ملل	30 وحدة	
89-60	0.70 مجم	0.35 ملل	35 وحدة	
90 ≤	0.80 مجم	0.40 ملل	40 وحدة	

وزن الجسم (كجم)	الجرعة (مجم)	الحجم اليومي للحقن	ملل	الوحدات	ملل	الوحدات
4	0.12 مجم	0.15 ملل	15 وحدة			
5	0.16 مجم	0.20 ملل	20 وحدة			
7-6	0.20 مجم	0.25 ملل	25 وحدة			
11-8	0.24 مجم	0.30 ملل	30 وحدة			
16-12	0.28 مجم	0.35 ملل	35 وحدة			
21-17	0.32 مجم	0.40 ملل	40 وحدة			
32-22	0.40 مجم	0.50 ملل	50 وحدة			
43-33	0.50 مجم	0.25 ملل	25 وحدة			
59-44	0.60 مجم	0.30 ملل	30 وحدة			
89-60	0.70 مجم	0.35 ملل	35 وحدة			
90 ≤	0.80 مجم	0.40 ملل	40 وحدة			

إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ
اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت قد حققت جرعة زائدة من الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إن فاتت طفلك إحدى الجرعات، فسيظل من الممكن القيام بالحقن حتى إن مرت 12 ساعة على الوقت الممحدد. إلى أن تمر 12 ساعة منذ الوقت المحدد للحقن، فلا تحقن الجرعة الفائتة. انتظر لليوم التالي، واستمر في جرعاتك المعتادة في الأوقات المعتادة.

إذا أوقفت تناول الدواء

لا تتوقف عن أخذ الدواء بدون استشارة الطبيب أولًا.

استشر دومًا طبيب طفلك قبل أن تقرر وقف علاج طفلك.

لا تتناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصلق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. قم بارتداء نظارتك إذا كنت تحتاج إليها.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية

كما هو الحال مع كل الأدوية الأخرى، قد يتسبب استخدام هذا الدواء في حدوث آثار جانبية لدى بعض مستخدميه. لا داعي للقلق بشأن قائمة الآثار الجانبية التالية، فقد لا تظهر عليك أي منها.

قد تحدث الآثار الجانبية بالتواتر التالي:

الآثار الجانبية الشائعة للغاية (قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص)

- انخفاض ضغط الدم (تأثيرات عابرة تتضمن الدوخة أو الشعور بالتعب أو الغثيان بعد فترة وجيزة من الحقن) والقيء
- تفاعلات في موضع الحقن: الاحمرار أو الحكة أو التهاب أو التورم أو الكدمات أو الطفح الجلدي أو الشرى أو الألم. عادةً ما يكون التفاعل في موضع الحقن خفيفًا ويزول وحده دون علاج خلال بضع ساعات (انظر القسم 3 "كيفية استخدام هذا الدواء").
- مستويات مرتفعة من الفوسفاتيز القلوي في الدم (تظهر في تحاليل الدم)

الآثار الجانبية الشائعة (قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص)

- الشعور بالغثيان أو عدم الإرتزان أو الدوخة/والغثيان
- الدوخة
- الغثيان
- التعب

آثار جانبية غير شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 100 أشخاص)

- نمو غير طبيعي للشعر في أي مكان من الجسم سواء عند الذكور أو الإناث (فرط الشعر)

يرجى استشارة الطبيب في حالة ظهور أي أثر جانبي، أو تفاقم أحد الآثار الجانبية، أو في حالة معاناتك من أثر جانبي لم يرد ذكره في النشرة.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يمكنك إبلاغ وزارة الصحة عن الآثار الجانبية من خلال النقر على رابط "الإبلاغ عن الآثار الجانبية للعلاج بالأدوية" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوصلك إلى نموذج إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية. يمكنك أيضًا استخدام هذا الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. طريقة حفظ الدواء

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي أدوية أخرى في مكان مغلق بعيدًا عن متناول ورؤية الأطفال و/أو الرضع من أجل منع حدوث التسمم. لا تسبب التقيوّ دون تعليمات محددة من الطبيب.

- لا تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر المحدد.

- ظروف التخزين:** يجب أن يتم تخزينه في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 2°C -8°C. لا تُجمد الدواء.

يُخزَن في عبوته الأصلية لوقايته من الضوء.

يمكن تخزين فوكزوجو في درجة حرارة الغرفة (أقل من 30 درجة مئوية) لمدة تصل إلى 90 يومًا، ولكن لا ينبغي تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.

يجب ألا تعيد فوكزوجو إلى الثلاجة بعد التخزين في درجة حرارة الغرفة.

اكتب على العبوة الكرتونية تاريخ إخراج فوكزوجو من الثلاجة لحفظه في درجة حرارة الغرفة.

يجب استخدام فوكزوجو فورًا بعد التحضير. يجب إعطاؤه خلال 3 ساعات من تحضيره ويمكن تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية. لا تستخدم الدواء إذا كان محلول الحقن عكزًا أو يحتوي على أي جزيئات.

لا تتخلص من الأدوية عبر الصرف الصحي أو النفايات الدوخة. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مستخدمة. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Powder
Trehalose dihydrate
D-Mannitol
Sodium Citrate Dihydrate
L-Methionine
Citric Acid Monohydrate
Polysorbate 80
Solvent
Sterile water for injection

شكل الدواء ومحتويات العبوة:

يتوفر فوكزوجو في شكل:

- مسحوق يتراوح لونه بين الأبيض والأصفر لمحلول الحقن في قنينة زجاجية.
- مذيب شفاف عديم اللون (حقنة ماء جاهزة للاستعمال) لإذابة المسحوق.

بعد إذابة المسحوق في المذيب، يكون المحلول شفافًا ويتراوح بين سائل عديم اللون وأصفر اللون.

تحتوي كل عبوة كرتونية على ما يلي:

- 10 قنينات من فوكزوجو
- 10 محقنات مسيقة الملء بالماء للحقن
- 10 إبر فردية أمادية الاستخدام
- 10 محقنات فردية أمادية الاستخدام

اسم الشركة المسجلة وعنوانها:

ماديسون فارما، م.ض.، شارع هشيلاوح 10، ص.ب. 7090، بيتاح تكفا.

اسم الشركة المصنعة وعنوانها:

BioMarin International Limited
Shanbally, Ringaskiddy
County Cork
Ireland
تم التحديث في تشرين الثاني 2024
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الوطني بوزارة الصحة:
فوكزوجو 0.4 مجم: 00-175-72-37698
فوكزوجو 0.56 مجم: 00-175-73-37699
فوكزوجو 1.2 مجم: 00-175-74-37700
من أجل البساطة وسهولة القراءة، تمت كتابة هذه النشرة بصيغة المذكّر. ومع ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات الاستخدام

تعليمات استخدام المحقنة مدرجة بالوحدات (U) تم وضع علامة "وحدات" (U) على الإبر والمحاقن المذبية المتوفرة في هذه العبوة لقياس الجرعة الموصى بها. سيخبرك طبيبك بالجرعة الموصى بها بناءً على نطاق وزنك.


العناصر المرفقة لحقن فوكزوجو (انظر الشكل أ)

الشكل أ


قارورة

إبرة المذيب

حقنة المذيب (يحتوي على ماء للحقن لإعادة التكوين)



محقنة الحقن



يمكن توصيل الجرعة الخاصة بك باستخدام حقنة الحقن الموضحة في الشكل (أ). القياسات لهذه الحقنة تعادل mL على النحو التالي: 0.1 ملل = 10 وحدات.

يُرجى التحدث إلى طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت غير متأكد من الجرعة الموصى بها أو كيفية استخدام إبرة المذيب ومحقنة الحقن.

عناصر مطلوبة لكنها لا تتوفر ضمن العبوة (انظر الشكل ب)

إن لم تتوفر لك تلك العناصر، فاسأل الصيدلي.

الشكل ب

مسحات كحولية

حاوية الأدوات الحادة

شاش أو ضمادات



الإعداد للحقن

قبل البدء، تأكد من أن لديك سطح عمل نظيف وأنك غسلت يديك.

الخطوة 1: على السطح النظيف، انزع غطاء القنينة وامسح قممتها بمسحة كحولية.

الخطوة 2: اثن غطاء محقنة المذيب برفق لنزعه عنها.

الخطوة 3: لف إبرة المذيب حتى لا تعود تستطيع لفها.

الخطوة 4: انزع غطاء الإبرة وأدخل الإبرة في القنينة عبر منتصف سدادة القنينة. ادفع المكبس بالتدرج إلى أسفل لحقن السائل بالكامل.

الخطوة 5: انزع الإبرة من القنينة. تخلص من الإبرة والمحقنة في حاوية الأدوات الحادة.

انظر الخطوة 18 و"كيفية التخلص من فوكزوجو (بعد الاستعمال)".

لا تستخدم محقنة المذيب للقيام بالحقن.

انتبه: احذر أن تلامس طرف الإبرة.

الخطوة 6: لف القنينة برفق حتى يكتمل ذوبان المسحوق ويصير المحلول صافياً.

لا ينبغي رجها. تأكد أن الدواء يتراوح بين الشفافية واللون الأصفر، وأنه ليس عكراً، ويخلو من الشوائب.

الخطوة 7: انزع غطاء الإبرة من محقنة الحقن وأدخل الإبرة في القنينة عبر منتصف سدادة القنينة مباشرة.

احذر أن تثني الإبرة.

انتبه: لا تعيد وضع الغطاء على الإبرة.

الخطوة 8: أمسك القنينة والمحقنة بحذر واقلب القنينة رأساً على عقب بينما لا تزال الإبرة داخلها. ينبغي أن تكون القنينة في الأعلى.

احذر أن تثني الإبرة.

الخطوة 9: احتفظ بطرف الإبرة في الدواء واسحب المكبس ببطء مرة أخرى لسحب الجرعة الموصوفة إلى المحقنة.

تحقق من ملصق الوصفة بشأن الكمية التي ينبغي سحبها.

انتبه: تحقق من الإبرة الموجودة في العبوة واسحب الجرعة التي حددت من قبل الطبيب.

الخطوة 10: اطرد فقاعات الهواء الكبيرة من المحقنة عن طريق النقر الخفيف على المحقنة. وبعدها ادفع الفقاعات ببطء ثانية للقنينة.

الخطوة 11: كرر الخطوات، 9 و10، حتى تصل للجرعة الصحيحة الموصوفة في المحقنة، دون فقاعات كبيرة.

تأكد من أن الجرعة الموجودة في المحقنة تماثل الجرعة الموصوفة. قس بدءاً من قاعدة المكبس حسب المعرض.

انتبه: اطرد أي فقاعات كبيرة. لا بأس من وجود فقاعة أو فقاعتين صغيرتين.

الخطوة 12: تأكد من أن لديك الجرعة الموصوفة في المحقنة، ثم انزع القنينة واستعد لإعطاء الجرعة.

انتبه: تأكد من أن الكمية تماثل الجرعة الموصوفة قبل إزالة القنينة.

اختيار موضع الحقن وإعداده

يوصى بالمواقع التالية للحقن:

ظهر الجزء العلوي من الذراعين أو

الفخذين أو

البطن (على مسافة 5 سنتيمترات من السرة)

الردفين

لا تحقق عبر الملابس.

لا تحقق في نفس الموضع مرتين متعاقبتين.

لا تحقق في الجلد المتقرح أو المتكدم أو الأحمى أو المتصلب أو المنتدب.

لا تحقق في

موضع الحقن بمسحة كحولية ودعه يجف في الهواء.

لا تلمس المنطقة مرة أخرى قبل الحقن.

الخطوة 13: ينبغي حقن فوكزوجو في الطبقة الدهنية تحت الجلد فقط.

الخطوة 14: امسح موضع الحقن بمسحة كحولية ودعه يجف في الهواء.

الخطوة 15: بعد مسح الموضع بمسحة كحولية، اقرص الجلد إلى أعلى حول موضع الحقن المختار.

الخطوة 16: أدخل الإبرة سريعاً كلها في الجلد بزواوية 45 درجة.

الخطوة 17: أرخ الجلد المقروص وادفع المكبس ببطء، طيلة المسافة. احقن الجرعة كاملة.

الخطوة 18: تخلص من القنينة والمحقنات والإبر المستعملة في حاوية الأدوات الحادة. طالع "كيفية التخلص من فوكزوجو" لمزيد من المعلومات.

بعد حقن فوكزوجو

تحقق من موضع الحقن. إن كانت هناك كمية صغيرة من الدم في موضع الحقن، فاضغط مستخدماً حشوة شاش برفق عليها لبضع ثوانٍ أو ضع عليها ضمادة.

لا تدلك موضع الحقن.

انتبه لعلامات انخفاض ضغط الدم، مثل الدوخة أو التعب أو الغثيان (الشعور بالمرض). إن أصبت بتلك الأعراض، فاتصل بالطبيب أو بمقدم الرعاية الصحية، ثم استلق على ظهرك وضع وسادة تحت ساقيك لرفعهما.

كيفية التخلص من فوكزوجو (بعد الاستعمال).

ضع القنينات والإبر والمحقنات المستعملة أو منتهية الصلاحية في حاوية الأدوات الحادة فور استخدامها.

إن لم تكن لديك حاوية للأدوات الحادة، فيمكنك استخدام حاوية منزلية تتسم بما يلي:

مصنوعة من البلاستيك المتين

يمكن إغلاقها بإحكام، بغطاء مقاوم للوخز، دون إمكانية خروج الأدوات الحادة منها

في وضعية قائمة ومستقرة أثناء الاستخدام

مقاومة للتسريب

عليها ملصق تحذيري كذلك يشير إلى وجود فضلات خطرة داخل الحاوية

عندما تقترب حاوية الأدوات الحادة من الامتلاء، فستحتاج إلى إفراغها وفقاً لتعليمات طبيبك.

لا تتخلص من أي أدوية، أو قنينات، أو إبر سائبة، أو محقنات في الفضلات المنزلية. اسأل الصيدلي عن طريقة التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها.

ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.