

מאי 2025

רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ת

חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ מבקשת להודיע על עדכונים בעלון לצרכן של התכשירים שבנדון:

Pemetrexed Taro 100 mg	פמטרקסד תרו 100 מ"ג
Pemetrexed Taro 500 mg	פמטרקסד תרו 500 מ"ג
Pemetrexed Taro 1000 mg	פמטרקסד תרו 1000 מ"ג

התוויה מאושרת:

1. Pemetrexed Taro in combination with cisplatin is indicated for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma whose disease is unresectable or who are otherwise not candidates for curative surgery.
2. Pemetrexed Taro in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.
3. Pemetrexed Taro is indicated as monotherapy for the second line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.
4. Pemetrexed Taro is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy.

מרכיבים פעילים:

Each vial contains 100 mg / 500 mg / 1000 mg of pemetrexed

צורת המתן של התכשיר:

Powder for Concentrate for Solution for Infusion

שינויים בעלונים המהווים החמרה מודגשים ברקע צהוב, תוספות מסומנות בצבע אדום והשמטות מסומנות בקו אופקי. כמו כן, בעלונים בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה.

העלון מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: <https://israel drugs.health.gov.il>

ניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום: חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761, טל. 04-8475700.

להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן:

[...]

2. לפני השימוש בתרופה

אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח בית החולים. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופה כלשהי לטיפול בכאב או בדלקת (נפיחות), כגון תרופות המכונות תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDs), לרבות תרופות הנרכשות ללא מרשם רופא (כגון איבופרופן). קיימים סוגים רבים של NSAIDs השונים זה מזה במשך הפעולה. בהסתמך על המועד המתוכנן לעירוי פמטרקסד תרו ו/או על מצב תפקוד הכליות, הרופא יצטרך ליעץ לך לגבי התרופות המותרות עבורך ומועדי הנטילה המותרים עבורך. אם אינך בטוח, התייעץ עם הרופא או הרוקח אם חלק מהתרופות שאתה נוטל הן NSAIDs.

יש ליידע את הרופא אם אתה לוקח תרופות המכונות מעכבי משאבת המימן (PPI) (אומפראזול, אסומפראזול, לנסופראזול, פנטופראזול וראבפראזול), המשמשות לטיפול בצרבת וברגורגיטציה חומצית (עליית מיצי הקיבה חזרה לתוך הפה)