



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986 يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

دوپلكس	دوپلكس	دوپلكس
5/80	5/160	10/160
أقراص مطلية	أقراص مطلية	أقراص مطلية

التركيب:	التركيب:	التركيب:
يحتوي كل قرص على:	يحتوي كل قرص على:	يحتوي كل قرص على:
Amlodipine (as besilate) 5 mg	Amlodipine (as besilate) 5 mg	Amlodipine (as besilate) 10 mg
Valsartan 80 mg	Valsartan 160 mg	Valsartan 160 mg
أملوديبيين ك بيسيلات 5 ملغ	أملوديبيين ك بيسيلات 5 ملغ	ك بيسيلات 10 ملغ
فالسارتان 80 ملغ	فالسارتان 160 ملغ	فالسارتان 160 ملغ

المواد غير الفعّالة: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي عرض مخصص الدواء؟

لعلاج فرط ضغط الدم الأولي.

دوپلكس مخصص لمتعالجين ضغط الدم لديهم غير متوازن كما ينبغي بواسطة علاج منفرد.

الفصيلة العلاجية:

أملوديبيين – من حاجبات قنوات الكالسيوم.
فالسارتان – من مضادات المستقبل أنجيوتنسين II.

تحتوي أقراص **دوپلكس** على مركبين إثنين يسيمان أملوديبين و- فالسارتان. إن هاتين المادتين مخصصتان لعلاج فرط ضغط الدم لدى الكبار وذلك عندما لا يؤدي العلاج بكل مركب بشكل منفرد إلى نتائج كافية.
ينتمي أملوديبين إلى مجموعة المواد المسماة "حاجبات قنوات الكالسيوم". يوقف أملوديبين دخول الكالسيوم إلى جدران الأوعية الدموية، الأمر الذي يمنع تضيق الأوعية الدموية.

ينتمي فالسارتان إلى مجموعة المواد المسماة "مضادات المستقبل أنجيوتنسين II". أنجيوتنسين II عبارة عن مادة

يُنتجها الجسم وتؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وبالتالي إلى إرتفاع ضغط الدم. يعمل فالسارتان على حجب تأثير أنجيوتنسين II.

كلتا المادتين تتساممان في منع تضيق الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، ترتخي الأوعية الدموية وينخفض ضغط الدم.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ أملوديبين أو لكل واحد من حاجبات قنوات الكالسيوم الأخرى. من شأن ذلك أن يتجلى بحكة، إحمرار الجلد أو صعوبات في التنفس.
- كنت حساساً (أليرجي) لـ فالسارتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6 "معلومات إضافية"). إذا كنت تعتقد بأنه من شأنك أن تكون حساساً، راجع الطبيب قبل تناول **دوپلكس**.

- وجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد أو مشاكل في الطرق الصفراوية مثل تشمع الصفراء أو إندساد في جريان الصفراء داخل الكبد.
- كنت حاملاً ما بعد الشهر الثالث (يُفضل الإمتناع عن **دوپلكس** في بداية الحمل أيضاً، أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

• وجد لديك ضغط دم منخفض بشكل خطير (hypotension).

• وجد لديك تضيق في صمام الشريان الأبهـر (aortic stenosis) أو صدمة قلبية (cardiogenic shock

– حالة يكون فيها غير قادر على تزويد ما يكفي من الدم للجسم).

- كنت تعاني من قصور في القلب بعد نوبة قلبية.
- وجد لديك سكري أو خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وكنت تتعالج بدواء لخفض ضغط الدم الحاوي على الأيسكربين.

إذا إنطبق عليك أي واحد من تلك البنود، بلغ طبيبك من دون أن تتناول دوپلكس.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ دوپلكس أخبر الطبيب إذا:

- كنت مريضاً (تقيؤات أو إسهال).
- وجدت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلية.
- إجترت زراعة كلية أو شخص لديك بآك تعاني من تضيق في شرايين الكلية.
- وجدت لديك مشكلة تؤثر على وظيفة الغدة الكظرية المسماة فرط الادلوسيترونية الأولي (primary hyperaldosteronism).
- وجد لديك قصور في القلب أو إجترت في السابق نوبة قلبية. يجب متابعة تعليمات الطبيب بحذر بما يتعلق بالقدار الدوائي الإبتدائي. من شأن الطبيب أن يفحص أيضاً الأداء الوظيفي لكليتك.
- شخص طبيب بأنك تعاني من تضيق في صمامات القلب (aortic or mitral stenosis)، أو من سماكة غير سليمة لعضلة القلب (obstructive hypertrophic cardiomyopathy).

- نيتروجليسيرين ومركبات النيترات الأخرى، أو الأدوية أثناء تناول أدوية أخرى (بما في ذلك مثبطات ACE). إذا إنطبقت عليك تلك الأعراض، **توقف عن تناول دوپلكس وراجع طبيبك فوراً، في هذه الحالة، لا يجوز أبداً معاودة تناول دوپلكس.**
- كنت تقاسي من ألم في البطن، غثيان، تقيؤات أو إسهالات بعد تناول دوپلكس. سوف يقرر طبيبك بخصوص مواصلة العلاج. لا تتوقف عن تناول دوپلكس من تلقاء نفسك.
- كنت تتناول واحداً من الأدوية المستعملة لمعالجة إرتفاع ضغط الدم:
 - مثبطات ACE (مثلاً: إينالابريل، ليزينوپريل، رامبيريل)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ذات الصلة بالسكري.
 - الأيسكربين.

○ مثبطات ACE (مثلاً: إينالابريل، ليزينوپريل، رامبيريل)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ذات الصلة بالسكري.

- الأسفلات والمراهقون
- لا يوصى بإستعمال دوپلكس لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

من الجائز أن يقوم طبيبك بفحص الأداء الوظيفي لكليتك، ضغط الدم، وكمية الشوارد الكهربائية في الدم (البوتاسيوم مثلاً) بشكل دائم.

أنظر معلومات إضافية في فقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا". **إذا إنطبق عليك واحداً من البنود، بلغ الطبيب قبل تناول دوپلكس.**

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

من الجائز أن يحدثا طبيبك إلى تغيير المقدار الدوائي أو إتخاذ وسائل حذر أخرى، وفي حالات معينة من الجائز أن تضطر إلى التوقف عن تناول واحداً من الأدوية.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تستعمل أدوية من المجموعات التالية:

- مثبطات ACE أو الأيسكربين (أنظر المعلومات في الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" و- "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").
- المدرات البولية (نوع من دواء يزيد من التبول).
- ليثيوم، دواء يستعمل لمعالجة أنواع معينة من الإكتئاب.
- المدرات البولية الحافظة لليوتاسيوم، إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح الحاوية على بوتاسيوم، أو مواد أخرى التي قد ترفع من نسب البوتاسيوم.

أنواع معينة من مسكنات الألم المسماة مضادات الإلتهاب الـاستيروئيدية (NSAIDs) أو مثبطات سيكو أوكسيجيناز 2 الإنتقائية (Cox-2 inhibitors). من شأن الطبيب أيضاً أن يفحص الأداء الوظيفي لكليتك.

- أدوية لمعالجة الإختلاجات (مثل مستحضرات كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيوتوين، فوسفينيتوئين، بيريميدين).
- الخلاصة النباتية للتهلثة – هيبيريكوم بيرفورناتوم (St. John's wort).

هذا الأمر يساعد في الحصول على النتائج المثلى وتقليل خطورة حدوث أعراض جانبية.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو قرص مطلي واحد في اليوم:

- يُفضل تناول الدواء بنفس الساعة من كل يوم.
- دوپلكس** مخصص للإعطاء عن طريق الفم فقط.
- يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.
- بالإمكان تناول دوپلكس مع أو بدون طعام. لا يجوز تناول دوپلكس مع الجريب فروت أو مع عصير الجريب فروت.
- إذا دعت الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري. لا تتوقف عن معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.
- من شأن الطبيب أن يقترح مقداراً دوائياً أكبر أو أصغر، وذلك بحسب إستجابتك للعلاج.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

دوپلكس لدى المسنين (من عمر 65 سنة وما فوق)

يقوم طبيبك بالتصرف بحذر أثناء رفع المقدار الدوائي. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو أصغر،

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

قد يتراكم فائض من السوائل في ربتك (وذمة رئوية) الذي يؤدي إلى ضيق في التنفس حيث قد يتطور حتى 24-48 ساعة بعد التناول.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول مقدار دوائي حال تذكرك. بعد ذلك، يجب تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي. لكن، إذا حان تقريباً موعد الثلاثة الأولى للمحل، ولا يجوز إستعماله إذا كنت بعد الشهر الثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً شديداً للجنين في حال إستعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

بلغي طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين البدء في الإرضاع.

تنتقل كميات ضئيلة من أملوديبين إلى حليب الأم. لا يوصى بتناول دوپلكس أثناء الإرضاع ومن الجائز أن يوصيك طبيبك بعلاج آخر إذا كنت ترغبين في الإرضاع، خاصة إذا كان الرضيع حديث الولادة أو ولد قبل الأوان.

عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي دواء.

السياقة وإستعمال الماكنت

هذا الدواء قد يسبب الدوار وقد يؤثر على قدرة تركيزك. لذلك، إذا كنت لا تعرف كيف سيؤثر الدواء عليك، لا تقم بالسياقة، لا تستعمل الماكنتات ولا تقم بإجراء النشاطات الأخرى التي تتطلب التركيز.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

هناك أعراض جانبية خطيرة تتطلب علاجاً طبياً فورياً؛ لقد قاسى قليل من المتعالجين من تلك الأعراض الجانبية الخطيرة.

في حال حدوث أيأ من الأعراض التالية فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب:

- أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:** رد فعل تحسسي مع أعراض مثل طفح، حكة، إنفخاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان، صعوبات في التنفس، ضغط دم منخفض (الشعور بإغماء، الشعور بدوخة).

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) – أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000: وذمة وعائية في الأمعاء؛ إنفخاخ في الأمعاء الذي يظهر مع أعراض مثل ألم في البطن، غثيان، تقيؤات وإسهال.

أعراض جانبية إضافية من الجائز أن تحصل عند إستعمال دوپلكس:

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

إنفلوإنزا؛ إحتقان في الأنف، ألم في الحنجرة وإنزعاج أثناء البلع؛ صداع؛ إنفخاخ الذراعين، راحتي اليدين، الرجلين، الكاحلين و راحتي القدمين؛ إرهاق؛ ضعف؛ إحمرار والشعور بسخونة في الوجه و/أو في العنق.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

دوار؛ غثيان وآلم في البطن؛ جفاف الفم؛نعاس؛ وخز أو خدر في راحتي اليدين أو القدمين؛ فيرتوجو؛ تسرع نظم القلب بسبب ذلك خفقان القلب؛ دوار عند الوقوف؛ سعال؛ إسهال؛ إسهال؛ طفح جلدي؛ إحمرار الجلد؛ إنفخاخ في المفاصل، ألم في الظهر؛ ألم في المفاصل.

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

قلق؛ طنين في الأذنين؛ إغماء؛ التبول أكثر من المعتاد أو الشعور بزيادة الإلحاح على التبول؛ عدم القدرة على تحقيق أو المحافظة على إنتصاب القضيب التناسلي؛ الشعور بقلق؛ إنخفاض ضغط الدم مع أعراض مثل دوار، الشعور بدوار خفيف؛ تعرق زائد؛ طفح جلدي في كافة الجسم؛ حكة؛ تقلصات عضلية.

إذا أثرت عليك الأعراض المذكورة أعلاه بصورة شديدة، راجع طبيبك.

أعراض جانبية إضافية يُبلّغ عنها أثناء إستعمال أملوديبين أو فالسارتان المستعملان بشكل منفرد، والتي لا تظهر عند إستعمال دوپلكس أو تظهر بوتيرة أكبر مما هو عليه مع دوپلكس:

أملوديبين

راجع الطبيب بشكل فوري إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية النادرة جداً والخطيرة التالية بعد تناول الدواء:

- صغير مفاجئ أثناء التنفس، ألم في الصدر، ضيق تنفس أو صعوبات في التنفس.
- إنفخاخ في الجفنين، الوجه أو الشفتين.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال دوپلكس قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا ندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أيأ منها.

- إنفخاخ اللسان والحنجرة التي تسبب صعوبة كبيرة في التنفس.

- أعراض جلدية خطيرة تشمل طفح جلدي شديد، شرى، إحمرار الجلد بكامل الجسم، حكة شديدة، حويصلات، تقشر وإنفخاخ الجلد، إلتهاب في التسبيح المخاطي (Stevens-johnson syndrome)، نخر البشرة (السمي)، أو ردود فعل تحسسية أخرى.
- إحتشاء عضلة القلب، نظم قلب غير منظم.

- إلتهاب البنكرياس الذي قد يسبب آلاماً شديدة في البطن والظهر التي تترافق بشعور عام غير جيد.

بُلبّغ عن الأعراض الجانبية التالية. إذا سببت لك الأعراض التالية مشاكل أو إذا إستمرت لأكثر من أسبوع، راجع طبيبك:

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100: دوار، نعاس، خفقان القلب (الإحساس بضربات القلب)، تورد، إنفخاخ الكاحلين (وذمة)، ألم في البطن، غثيان.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000: تغيرات في الحالة المزاجية، قلق، إكتئاب، أرق، رجفة، تغيرات في حاسة مذاق، إغماء، فقدان الإحساس بالألم، إضطرابات في الرؤية، خلل في الرؤية، طنين في الأذنين، إنخفاض ضغط الدم، عطاس/رشح في الأنف التي تنجم عن إلتهاب في نسيج الأنف (إلتهاب الأنف)، مشاكل في الهضم، تقيؤات، فقدان الشعر، تعرق زائد، حكة في الجلد، تغير لون الجلد، إضطراب في التبول، زيادة الحاجة للتبول في الليل، زيادة وتيرة التبول، عدم القدرة على تحقيق إنتصاب للقضيب التناسلي، إنزعاج أو تضخم الشفتين لدى الرجال، ألم، الشعور بوعدة، آلام في العضلات، تقلصات عضلية، زيادة أو تناقص الوزن.

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000: إرتباك.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) – أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000: تناقص عدد خلايا الدم البيضاء، تناقص عدد الصفيحات الدموية، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث كدمات شادة أو نزف بسهولة (تضرر كريات الدم الحمراء)، زيادة السكر في الدم (فرط سكر الدم)، إنفخاخ اللثة، إنفخاخ بطني (إلتهاب المعدة)، آداء وظيفي كبدي شاذ، إلتهاب الكبد، إصفرار الجلد (يرقان)، إرتفاع إنزيمات الكبد – الأمر الذي قد يؤثر على بعض الفحوص الطبية، زيادة توتر العضلات، إلتهاب في الأوعية الدموية الذي يترافق أحياناً بطفح جلدي، حساسية للضوء، إضطرابات تتضمن تصلب، رجفان و/أو صعوبات في الحركة.

فالسارتان

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000: تناقص عدد خلايا الدم البيضاء، تناقص عدد الصفيحات الدموية، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث كدمات شادة أو نزف بسهولة (تضرر كريات الدم الحمراء)، زيادة السكر في الدم (فرط سكر الدم)، إنفخاخ اللثة، إنفخاخ بطني (إلتهاب المعدة)، آداء وظيفي كبدي شاذ، إلتهاب الكبد، إصفرار الجلد (يرقان)، إرتفاع إنزيمات الكبد – الأمر الذي قد يؤثر على بعض الفحوص الطبية، زيادة توتر العضلات، إلتهاب في الأوعية الدموية الذي يترافق أحياناً بطفح جلدي، حساسية للضوء، إضطرابات تتضمن تصلب، رجفان و/أو صعوبات في الحركة.

فالسارتان

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000: تناقص عدد خلايا الدم البيضاء، تناقص عدد الصفيحات الدموية، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث كدمات شادة أو نزف بسهولة (تضرر كريات الدم الحمراء)، زيادة السكر في الدم (فرط سكر الدم)، إنفخاخ اللثة، إنفخاخ بطني (إلتهاب المعدة)، آداء وظيفي كبدي شاذ، إلتهاب الكبد، إصفرار الجلد (يرقان)، إرتفاع إنزيمات الكبد – الأمر الذي قد يؤثر على بعض الفحوص الطبية، زيادة توتر العضلات، إلتهاب في الأوعية الدموية الذي يترافق أحياناً بطفح جلدي، حساسية للضوء، إضطرابات تتضمن تصلب، رجفان و/أو صعوبات في الحركة.

فالسارتان

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض لم يحدد شيوعتها بعد): تناقص كريات الدم الحمراء، سخونة، ألم في الحنجرة أو تقرحات في الفم ناتجة عن التلوثات؛ نزف أو كدمات عفوية؛ إرتفاع نسب البوتاسيوم في الدم؛ عدم سلامة نتائج فحوص الكبد؛ تناقص في الأداء الوظيفي الكلوي أو تناقص شديد في الأداء الوظيفي الكلوي؛ إنفخاخ خاصة في الوجه والحنجرة؛ آلام عضلية؛ طفح؛ بقع بنفسجية – حمراء، سخونة، حكة؛ ردود فعل تحسسية؛ حويصلات في الجلد (متلازمة لحالة تسمى Dermatitis bullous).

إذا كنت تشعر بتلك الأعراض، توجه إلى طبيبك فوراً!
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط: https://sideeffects.health.gov.il/

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة "يونيفارم م.ض."

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً من متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضوع، وذلك لتفادي إصاباتهم بالسم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على طهر العلبة. يشير تاريخ إنتقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعّالة أيضاً على:

Silicified microcrystalline cellulose, Crospovidone, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, White coating blend (HPMC 2910/hypromellose, Titanium dioxide, Macroglol/PEG), Brown coating blend (Hypromellose, Talc, Macroglol/PEG, Iron oxide yellow, Titanium dioxide, Iron oxide red, Iron oxide black).

تتوفر علب تحتوي على 5، 10، 14، 15، 20، 28، 30 أو 56 قرصاً. من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العلب.

كيف يبيد الدواء وما هو محتوى العلبة:

دوپلكس 5/80 هي أقراص مطلية دائرية الشكل، محدية من كلا الجانبين، بلون بني - وردي، مع خط للشرط من جانب واحد.

دوپلكس 5/160 هي أقراص مطلية دائرية الشكل، محدية من كلا الجانبين، بلون وردي فاتح، مع خط للشرط من جانب واحد.

دوپلكس 10/160 هي أقراص مطلية دائرية الشكل، محدية من كلا الجانبين، بلون بني - وردي، مع خط للشرط من جانب واحد.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض، ص.ب.16545، تل أبيب، 6116401.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، پارك الصناعة "ماقو كرمل". تم إعدادهما في آذار 2025.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: **دوپلكس 5/80:** 153 59 34303 01
دوپلكس 5/160: 152 73 34093 01
دوپلكس 10/160: 153 26 34298 01

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

لمزيد من المعلومات حول المستحضر والنشرات المحدّثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، قوموا بمسح الكود التالي:

For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:

دوپلكس Duplex 5/80



دوپلكس Duplex 5/160



دوپلكس Duplex 10/160



بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني: info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: info@unipharm.co.il or by telephone: 03-6135050.

unipharm **יוניפארם** **אוניفارم**

