

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

چينودون™ 20 ملغ كبسولات

چينودون™ 40 ملغ كبسولات

چينودون™ 60 ملغ كبسولات

چينودون™ 80 ملغ كبسولات

تحتوي كل كبسولة على:

زيبراسيدون (على شكل هيدروكلوريد مونوهيدرات) 20 ملغ، 40 ملغ، 60 ملغ، 80 ملغ

Ziprasidone (as hydrochloride monohydrate) 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg

المواد غير الفعالة ومسببات الأرجية في الدواء: انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

أقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

معلومات هامة يجب أن تعرفها:

چينودون غير مخصص لعلاج المتعالمجن المصابين بذهان مرتبط بالخرف المسنون المصابون بذهان مرتبط بالخرف، الذين يتلقون العلاج بأدوية مضادة للذهان، معرضون لخطر عالٍ للموت.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

دواء مضاد للذهان لعلاج الضمام (نيزوفرينيا) لدى البالغين، لعلاج حالات الهوس كجزء من الاضطراب الثنائي القطب (bipolar mania) لدى البالغين وكذلك للعلاج المداوم للمرض الثنائي القطب بالدمج مع الليثيوم أو فالپروال لدى البالغين.

الفصيلة العلاجية:

أدوية مضادة للذهان غير نمطية – مناهضات مستقبلات الڍيامين من النوع D2 ومستقبلات السيروتونين من النوع 5HT2A في الدماغ.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (زيبراسيدون) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كنت تعاني الآن أو عانيت مؤخرًا من خلل شديد في وظيفة القلب، مثل متلازمة أسطوانة المقطع QT، نوبة قلبية حدثت مؤخرًا، قصور قلبي شديد أو اضطرابات معينة في نظم القلب (تحدث إلى الطبيب بشأن ذلك).
- كنت تستعمل أدوية يُمنع استعمالها بالدمج مع **چينودون** وتطول المقطع QT، مثل دوفيتيليد، سوتالول، كينيدين وأدوية أخرى مضادة لاضطرابات النظم لعلاج اضطرابات نظم القلب (من الفصيلة Ia أو III)، ميزوريدين، ثيوريدازين، كلوربرومازين، دروبيريدول، بيموزيد، سبارفلوكساسين، جاتيفلوكساسين، موكسيفلوكساسين، هالوفانترين، ميفلوكوين، بينتاميدين، ثالث أوكسيد الزرنيخ، ليفوميثايل أسيتات، دولاسيترون ميزيلات، بروبوكل أو تاكروليموس.
- لا يجوز استعمال الدواء لدى المسنين الذين يعانون من ذهان مرتبط بالخرف (ديمنتسيا).
- كنت تستعمل منبث الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOI)، بما في ذلك لينيزوليد وميثيلين بلو بالإطءاء داخل الوريد) أو توقفت عن استعمال منبث MAO في الأيام الـ 14 الأخيرة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بچينودون، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من مشكلة في طريقة نبض قلبك أو من خلل في وظيفة القلب.
- علم بوجود سيرة مرضية عائلية من أمراض القلب، بما في ذلك نوبة قلبية حدثت مؤخرًا.
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من إغماء أو دوار.
- كنت تستعمل الآن أو استعملت في الماضي أدوية ملزمة بوصفة طبيب.
- كنت تستعمل أدوية غير ملزمة بوصفة طبيب أو مكملات غذائية.
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد.
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من مستويات غير متوازنة للكهارل في الدم، مثل المستويات المنخفضة لليوتاسيوم أو المغنيزيوم (يجب موازنة مستويات هذه الكهارل قبل البدء بالعلاج).
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من السكري (أو وُجدت سيرة مرضية عائلية من السكري).
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من فرط السمنة، الاختلاجات، سرطان الثدي، التعداد المنخفض لخلايا الدم البيضاء.
- كنت تعاني الآن من مرض يتمثل بالإسهال، التقيؤات أو أي مرض يحدث فيه فقدان للسوائل.
- كنت حاملًا أو تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل.
- كنت مرضعًا أو تخططين للإرضاع.
- وُجدت لديك حساسية لأدوية معينة.

تحذيرات إضافية بخصوص استعمال الدواء:

- قد يسبب استعمال الدواء أعراضًا جانبية في جهاز الأوعية الدموية والقلب، تشمل السكته الدماغية لدى المتعالمجن المسنين الذين يعانون من ذهان مرتبط بالخرف.

كما هو الحال مع استعمال الأدوية الأخرى المضادة للذهان، فإن استعمال الدواء قد يسبب المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان (NMS)، التي تشمل أعراضها على: حرارة مرتفعة جدًا، تصلب العضلات، ارتجافات، ارتباك، تعرق أو ارتفاع في وتيرة القلب وضغط الدم. هذه المتلازمة نادرة لكنها خطيرة وقد تكون فتاكة. لذلك، يجب إبلاغ الطبيب إذا لاحظت هذه الأعراض.

- خلال فترة استعمال **چينودون** قد يظهر رد فعل متأخر على الدواء، يسمى رد الفعل الدوائي المحصور بكترة اليوزينيات والأعراض الجهازية (DRESS). قد تشمل علامات رد الفعل هذا (DRESS) على: طفح جلدي، حمى وغدغد ليمفاوية متضخمة. قد تظهر ردود فعل جلدية خطيرة أخرى خلال فترة العلاج ب**چينودون**، مثل متلازمة ستيفنسن-جونسون التي قد تشمل أعراضها على: طفح جلدي مع حويصلات، قروح في الفم، تقشر الجلد، حمى وظهور نقاط شبيهة بالهدف على الجلد. قد تشكل ردود الفعل هذه خطرًا على الحياة في بعض الأحيان، لذلك يجب إعلام الطبيب فورًا إذا لاحظت وجود هذه الأعراض.
- كانت هناك عدة بلاغات عن مستويات مرتفعة للسكر في الدم (فرط السكر في الدم) أو السكري لدى المتعالمجن الذين استعملوا **چينودون**. ليس معلومًا ما إذا كان **چينودون** مرتبطًا بهذه الأعراض. يجب الخضوع للمتابعة ولمراقبة علامات فرط السكر في الدم خلال فترة العلاج بالأدوية المضادة للذهان غير النمطية.
- قد يسبب استعمال **چينودون** دوارًا بسبب هبوط ضغط الدم، خاصةً في بداية استعمال الدواء أو بعد رفع الجرعة الدوائية. لذلك يجب أن تتوخى الحذر وألا تنهض بشكل أسرع من اللازم وأن تُبلغ طبيبك عن هذا العرض.
- استعمال الدواء قد يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم الحرارة، لذلك يُستحسن الامتناع عن التعرض للحرارة المرتفعة أو الرطوبة.
- ارتبطت الأدوية المضادة للذهان غير النمطية بتغيرات استقلابية تشمل مستويات مرتفعة للسكر في الدم (فرط سكر الدم)، مستويات مرتفعة للدهنيات في الدم (عسر شحميات الدم) وارتفاع وزن الجسم.
- قد يؤدي **چينودون** إلى نشوء متلازمة السيروتونين، وهي حالة قد تشكل خطرًا على الحياة (انظر في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا"، "التفاعلات بين الأدوية" والبند 4 "الأعراض الجانبية").

الأولاد والمراهقون

لا تتوفر معلومات كافية بخصوص السلامة والفعالية عند استعمال **چينودون** لدى الأولاد والمراهقين.

هذا الدواء غير مخصص لعلاج الأولاد والمراهقين الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا.

الفحوص والمتابعة

يجب تتبّع مستويات اليوتاسيوم والمغنيزيوم.

يجب تتبّع علامات ارتفاع مستويات السكر (فرط السكر في الدم) خلال فترة العلاج بالأدوية المضادة للذهان غير النمطية.

إذا كنت تعاني من مرض يتمثل بالإسهال أو التقيؤات أو أي حالة يُخشى فيها فقدان السوائل، فقد يحيلك الطبيب إلى إجراء فحص دم من أجل تتبّع مستويات الأملاح في الدم.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

خاصةً إذا كنت تستعمل:

- أدوية تطيل المقطع QT، مثل دوفيتيليد، سوتالول، كينيدين وأدوية أخرى مضادة لاضطرابات النظم لعلاج اضطرابات نظم القلب (من الفصيلة Ia أو III)، ميزوريدين، ثيوريدازين، كلوربرومازين، دروبيريدول، بيموزيد، سبارفلوكساسين، جاتيفلوكساسين، موكسيفلوكساسين، هالوفانترين، ميفلوكوين، بينتاميدين، ثالث أوكسيد الزرنيخ، ليفوميثايل أسيتات، دولاسيترون ميزيلات، بروبوكل أو تاكروليموس (انظر في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
- أدوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل أدوية للتهدئة، للنوم، لعلاج الباركنسون والصرع).
- أدوية لحفض ضغط الدم.
- كينوكازول، دواء مضاد للفطريات.
- يمكن أن تحدث متلازمة السيروتونين في فترة العلاج ب**چينودون**، خاصةً عند الاستعمال المتزامن للأدوية التالية:
 - أدوية لعلاج الاكتئاب، مثلًا: مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثبّطات استرداد السيروتونين والنورابينيفرين (SNRIs)، مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات أو الأدوية التي تحتوي على الليثيوم
 - تريبتانات (لعلاج الميجرينا)
 - أدوية تحتوي على الأفيونات مثلًا: فينتانيل، ميبيريدين (تسكين الالام الشديدة)
 - أدوية تحتوي على ميتادون (لعلاج الإدمان على الأفيونات أو لعلاج الألم الشديد)
 - أدوية تحتوي على ترامادول (مسكن للألام)
 - أدوية تحتوي على تريبتوفان (لمشاكل النوم والاكتئاب)
 - بوسبيرون (لعلاج الفلق)
 - أدوية تحتوي على أمفيتامينات (لعلاج اضطراب نقص الانتباه والتركيز – ADHD، التحفيق وفرط النشاط)
 - أدوية تحتوي على St. John’s Wort (المسمى أيضًا بالعرن المثقوب، وهو خلاصة نباتية تُستعمل لعلاج الاكتئاب الطفيف)
 - مثبّطات MAO (لعلاج الاكتئاب، الثلوثات أو المستويات المرتفعة لمنهيموجلوبين في الدم. انظر في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام من أجل تحقيق الفعالية المثلى للدواء.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يوصى بالامتناع عن استهلاك الكحول في فترة استعمال **چينودون**.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملًا أو تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل.

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب إذا كنت مرضعًا أو تخططين للإرضاع. يمكن أن ينقل **چينودون** إلى حليب الأم.

السياقة واستعمال الماكينات

استعمال **چينودون** قد يسبب ميلًا إلى النوم، ولذلك يستوجب الحذر عند السياقة وتشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي **چينودون** على اللاكوز. إذا أخبرك الطبيب في الماضي أن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم من الصوديوم (23 ملغ) في كل كبسولة، يعني أنه عمليًا "خالٍ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع الكبسولة بأكملها. يُمنع فتح الكبسولة ونثر محتواها، لأنه لم يتم فحص تأثير هذا الشكل من الإعطاء.

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.

يجب تناول الدواء يوميًا في نفس الساعة.

قد يظهر التأثير النافع للدواء بعد بضعة أسابيع علاجية.

إذا تناولت خطأ جرعة دوابية أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تنذكرك، إلا إذا كان موعد جرعتك التالية. في هذه الحالة، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **چينودون** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فورًا إلى الطبيب في حالة:

- الإغماء أو فقدان الوعي
- الإحساس بتغيّر سرعة دقات القلب (خفقان القلب).

يجب أن تراجع طبيبك في حالة ظهور علامات وأعراض متلازمة السيروتونين التالية: هياج (عدم الهدوء)، هلوسات، غيبوبة أو تغيرات أخرى في الوضع النفسي؛ وتيرة قلب سريعة، ضغط الدم مرتفع أو منخفض؛ مشاكل في التناسق الحركي أو تقلص العضلات، غثيان، تقيؤ أو إسهال؛ تعرق أو حمى؛ تصلب العضلات، ارتجاف، اختلاجات.

أعراض جانبية تظهر في أحيان متقاربة ويجب إعلام الطبيب في حالة ظهورها:

- شعور بهزاق شاذ أو ميل إلى النوم
- غثيان أو اضطرابات في الجهاز الهضمي
- إمساك
- دوار
- هياج (عدم الهدوء)
- حركات عضلية شاذة، بما في ذلك: ارتجاف، جر الرجلين وحركات لا إرادية غير خاضعة للسيطرة
- إسهال
- طفح جلدي
- سعال متزايد وسيلان الأنف

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-100 مستعملين من بين 100):

آلم في البطن، أعراض شبيهة بإنفلونزا، حمى، سقوط، وذمة في منطقة الوجه، قشعريرة، تحسّس ضوئي (حساسية للضوء)، آلم جانبي، انخفاض حرارة الجسم (هيبوثيرميا)، نبض قلبي سريع، فرط ضغط الدم، نقص ضغط الدم عند الوقوف، قيم (أنزوكيسيا)، تقيؤات، آلام العضلات، هياج (عدم الهدوء)، ارتجاف، اضطرابات في حركات العضلات، عداينة، تشنجات، تتميل، ارتباك، دوار (فيريوجو)، اضطراب في المشي، أزمة تنوير المقلّة، انخفاض في الحس أو الملمس، اضطراب في النطق، فقدان الذاكرة، تصلب العضلات، تؤثر عضلي منخفض أو مرتفع، هذيان، ازدواجية الرؤية، انعدام التناسق الحركي، اعتلال عصبي، صعوبات في التنفس، التهاب جلدي فطري.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 10-100 مستعملين من بين 1,000):

نفض بطني، ذبحة صدرية، رجفان أنيني، نزيف دموي من فتحة الشرج، صعوبات في البلع، انتفاخ في اللسان، فقر الدم، بقعة نزيف دموي تحت الجلد، تغيرات في العد الدموي (ارتفاع أو انخفاض في خلايا الدم البيضاء)، تضخّم الغدد الليمفاوية، عطش، وذمة محيطيّة، فرط سكر الدم (مستوى مرتفع للسكر في الدم)، ارتفاع في إنزيمات الكبد، ارتفاع في مستوى كرياتين فوسفوكيناز، ارتفاع في مستوى الكالابن فوسفاتاز، ارتفاع في مستوى لاكتات ديهيدروجيناز، ارتفاع في مستوى الكوليسترول، تجفاف، اليوميون في البول، مستوى منخفض لليوتاسيوم في الدم، التهاب في غلاف الوتر، شلل، التهاب الرئتين، نزيف دموي من الأنف (رعاف)، ردود فعل جلدية مثل طفح جلدي، شرى، إيكزيما، التهاب الجلد (ديرماتيتيس)، تساقط الشعر، جفاف العينين، التهاب ملتحمة العين، التهاب الأجزاء، ساد (كتاراكت)، عدم تحمّل الضوء، طنين في الأذنين، ضعف جنسي، مشاكل في القذف، مشاكل في الإداء الوظيفي الجنسي لدى الرجال، صعوبة في بلوغ الإشباع الجنسي، سكر في البول، دم في البول، احتباس البول، فرط التبول، انقطاع الحيض (أمينوريا)، نزيف دموي مفرط أثناء الحيض، نزيف دموي بين حيض وحيض، إفراز الحليب من الحلمة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 10-100 مستعملين من بين 10,000):
إحصار في منظومة التوصيل في القلب، التهاب الأوردة، انصمام رئوي، تضخّم القلب، سكّته دماغية أو احتشاء دماغي، خثار وريدي، التهاب عضلة القلب، نزيف دموي من اللثة، يرقان، انحشار البراز، ارتفاع مستوى جاما-جلوبولين ترانسبيبتيداز، تقيؤ دموي، ركود صفراوي، التهاب الكبد (هيباتيتيس)، تضخّم الكبد، مرض في الغشاء المخاطي في الفم (طولان)، كبد دهني، براز أسود اللون، نقص/فرط نشاط الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية، تغيرات في العد الدموي، قلة الصفائح (ثرومبوسيتوبينيا) أو مستوى مرتفع للصفائح (ثرومبوسيتيميا)، وذمة ليمفاوية، ارتفاع في مستوى البولة والكرياتينين في الدم، ارتفاع الدهونات، انخفاض الكوليسترول، تغيرات في مستويات الأملاح الحيوية في الجسم (ارتفاع مستوى اليوتاسيوم، ارتفاع/انخفاض مستوى الكلوريد، انخفاض مستوى الصوديوم، انخفاض مستوى الكالسيوم، انخفاض مستوى المغنيزيوم)، انخفاض مستوى اليروتين في الدم، ارتفاع حمض اليوريك في الدم، انخفاض في تحمّل الجلوكوز، نقص سكر الدم، نقرس، كيتوزية، قلاء تنفسي، اعتلال عصلي، تزايد المنعكسات، رآرة العينين، انفثال الرقية (صعر - تورتيكوليس)، تتميل في محيط الفم، تشنج الظهر، انغلاق الفكين (ضزز)، بصق الدم، تقلص عضلات الحلق، نزيف دموي في العين، اضطراب في مجال الرؤية، التهاب القرنية، التهاب ملتحمة العين والقرنية، تضخّم الثدي لدى الرجال (تدثّي الرجل)، نزيف دموي من المهبل، تبؤل لبني، قلة البول، نزيف دموي رحمي، خلل في الأداء الوظيفي الجنسي لدى النساء.

أعراض جانبية إضافية تم الإبلاغ عنها بعد التسويق:

نبض قلبي سريع، اضطرابات النظم القلبي (من نوع Torsade de pointes) في وجود عوامل خطر عديدة، انتفاخ اللسان، ثلر الحليب (جالانكوريا) - إنتاج الحليب في الثدي دون ارتباط بالولادة أو بالإرضاع، انتصاب مطول (فُساج)، ترهّل الوجه، متلازمة السيروتونين (مع أو بدون نمج الدواء مع أدوية منبّطة لاسترداد السيروتونين)، المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان، خلل الحركة المتأخر، أرق، هوس/هوس خفيف، السير اللومى (المشى أثناء النوم)، رد فعل تحسسي (التهاب الجلد التحسسي، انتفاخ الوجه، الفم، اللسان، الحلق، الديدن أو القدمين، صعوبة في البلع أو في التنفّس، شرى، وذمة في الوجه وفي الفم)، طفح جلدي، رد فعل على الدواء، مصحوب بكترة اليوزينيات والأعراض الجهازية (DRESS)، انظر الأعراض في البند 2 "تحذيرات إضافية بخصوص استعمال الدواء"، سلس البول اللبلي، سلس البول، نقص ضغط الدم عند الوقوف، إغماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فقلبك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دعونا عل توفيق لرواي عقب تسول ترفوتن" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وأل الأطفال الصرع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات مبروعة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- ظروف التخزين:** يجب التخزين في درجة حرارة دون 30°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose monohydrate, gelatin, pregelatinized maize starch, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), sodium dodecyl sulfate, black ink (shellac, black iron oxide (E172), propylene glycol, ammonium hydroxide, potassium hydroxide).

چينودون 20، 40، 80 ملغ كبسولات تحتوي أيضًا على indigotin (E132).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

چينودون 20 ملغ كبسولات: كبسولة لونها أزرق/أبيض ومطبوع عليها بالأسود "VTRS" و-"ZDX 20".

چينودون 40 ملغ كبسولات: كبسولة زرقاء اللون ومطبوع عليها بالأسود "VTRS" و-"ZDX 40".

چينودون 60 ملغ كبسولات: كبسولة بيضاء اللون ومطبوع عليها بالأسود "VTRS" و-"ZDX 60".

چينودون 80 ملغ كبسولات: كبسولة لونها أزرق/أبيض ومطبوع عليها بالأسود "VTRS" و-"ZDX 80".

أحجام العبوات المصادق عليها: 14، 20، 30، 50، 56، 60، 100 كبسولة. قد لا تتسوّق جميع أحجام العبوات.

تم تحرير النشرة في آذار/مارس 2025 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

چينودون 20 ملغ كبسولات: 124-82-30181

چينودون 40 ملغ كبسولات: 124-79-30182

چينودون 60 ملغ كبسولات: 124-80-30183

چينودون 80 ملغ كبسولات: 124-81-30184

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المصنّع وصاحب التسجيل: دكسل م.م.ض.

شارع دكسل 1، أور عاكيفًا 3060000، إسرائيل