



نشرة طبية للمستهلكة بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986 يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

فيمينيت, أقراص

كل قرص يحوي: ديسوجيستريل (Desogestrel) 0.15 ملغ و ايتينيل-استراديول (Ethinylestradiol) 0.02 ملغ. مواد غير فعالة ومستأرجة (مسببات الحساسية) في الدواء: أنظري بند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

أشياء من المهم معرفتها بخصوص وسائل منع الحمل الهرمونية المُدمجة (CHCs):

- باستخدام صحيح, وسائل منع الحمل الهرمونية المُدمجة تعتبر واحدة من الطرق العكوسة (قابلة للعكس) الأكثر موثوقية لمنع الحمل
- إنها تزيد قليلاً من الإختطار لجلطات دموية في الأوردة والشرابين, خصوصاً في السنة الأولى أو عند تجديد العلاج بوسائل منع حمل هرمونية مدمجة بعد انقطاع دام 4 أسابيع أو أكثر
- عليك أن تكوني متيقظة والتوجه لطبيبك إذا كنت تعتقدين أن لديك أعراض جلطة دموية (لتفاصيل أعراض جلطة دموية أنظري للبند 4 "أعراض جانبية")

- نساء مُعينات لا يجب أن يتناولن القرص عقب مشاكل طبية حالية أو أمراض. يُرجى أن تقرئي هذه النشرة من أجل التأكد أن فيمينيت ملائم لك.
- لمنع الحمل, من المهم تناول فيمينيت حسب التعليمات والبدء بكل عبوة في الوقت. يُرجى أن تتأكدي من أنك تدركين ما يجب فعله إذا نسيت قرصاً أو إذا كنت تعتقدين أنك حامل.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعملي الدواء لأنها قد تحتوي على معلومات مهمة لأجلك.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات مُلخصة عن الدواء. إذا كان لديك أسئلة إضافية, اسألي الطبيب أو الصيدلي.
- وُصِف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يسبب لهم الضرر حتى وإن بدا لك أن وضعهم الصحي مشابه لوضعك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- فيمينيت هو قرص مُدمج لمنع الحمل المُتناول عن طريق الفم ("القرص"). وسيلة منع الحمل هذه بجرعة منخفضة, تحتوي نوعين من هورمونات الجنس الأنثوية, أستروجين وپروجستوجين. تمنع هذه الهرمونات تسريح بويضة من المبايض خاصتك, هكذا لا يمكنك الحمل. يُحوّل أيضاً فيمينيت السائل (المُخاط) في عنق رحمك ليصبح لزجاً أكثر, الأمر الذي يُصعب على المنى الدخول إلى الرحم.
- الفصيلة العلاجية: وسيلة منع حمل التي تدمج استروجين-پروجستوجين.
- لا يحميك فيمينيت من التلوثات المنقولة بالإتصال الجنسي, مثل المتدثرة أو HIV (إيدز). فقط الواقيات الذكرية (كوندوم) تستطيع المساعدة على فعل ذلك.
- يجب تناول فيمينيت حسب التعليمات من أجل منع الحمل.

2. قبل استعمال الدواء

ملاحظات عامة

- قبل البدء بتناول فيمينيت عليك قراءة المعلومات عن الجلطات الدموية الظاهرة في بند 2. من المهم بشكل خاص قراءة الأعراض لجلطات الدم – أنظري بند 4 "أعراض جانبية".
- من المهم أن تفهمي الحسّنات والإختطارات بتناول القرص قبل أن تبدئي بتناوله, أو عندما تقررين فيما إذا كنت ستستمرين في تناوله. بالرغم من أن القرص ملائم لمعظم النساء المُعافيات, إلا أنه لا يلائمهن جميعاً.
- أخبري طبيبك إذا كان لديك أحد الأمراض أو عوامل الإختطار المذكورة في هذه النشرة.
- قبل البدء بتناول القرص
- سيسألك طبيبك بخصوص المشاكل الطبية لديك ولدى عائلتك وسيفحص ضغط الدم لديك. من الممكن أن تحتاجي أيضاً فحوصات أخرى, مثل فحص الثدي.

أثناء تناولك القرص

- ستحتاجين لفحوصات مُنتظمة لدى طبيبك, غالباً عندما تحتاجين وصفة طبية إضافية للقرص.
- ستحتاجين للذهاب لفحوصات مُنتظمة للطاخة عنق الرحم.
- افحصي ثدييك والحلمات كل شهر للعثور على تغييرات – أخبري طبيبك إذا كنت ترين أو تشعرين بأي شيء غريب, مثل كُتل أو ترصع (غمّازة) في الجلد.

- إذا كنت بحاجة لإجراء فحوصات دم, أخبري طبيبك أنك تتناولين قرص لمنع الحمل, لأنه من الممكن أن يؤثر القرص على نتائج جزء من الفحوصات.
- إذا كنت بصدد إجراء عملية جراحية, تأكدي بأن طبيبك على علم بذلك. قد تحتاجين إلى التوقف عن تناول القرص ما يقارب 4-6 أسابيع قبل الجراحة. وذلك من أجل التقليل من الاختطار لديك لجلطة دم (أنظري بند 2, "متى لا يجوز استعمال فيمينيت"). سيخبرك طبيبك متى يمكنك البدء بتناول القرص مجددًا.

متى لا يجوز استعمال فيمينيت

لا يجوز استعمال فيمينيت إذا كان لديك أحد الحالات الغفصلة أدناه. سيتحدث طبيبك معك بخصوص وسيلة منع حمل أخرى التي ستكون ملائمة أكثر. أنظري أيضًا بند 2, "تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء".

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كان يوجد لديك (أو كان لديك بالماضي) جلطة دموية في أوعية دموية في الرجلين (خثار الأوردة العميقة, DVT), في الرئتين (انصمام رئوي, PE) أو في أعضاء أخرى;
 - كان معلوم لك أنه لديك اضطراب الذي يؤثر على تخثر دمك - مثلًا, نقص في بروتين C, نقص في بروتين S, نقص في مضاد الثرومبين III, عامل 5 ليدين أو أجسام مضادة ضد مضادات الفوسفوليبيدات;
 - كنت بحاجة لجراحة أو أنك غير قادرة على الوقوف على رجلبك لفترة زمنية متواصلة (أنظري بند 2 "جلطات دموية");
 - كان لديك في الماضي نوبة قلبية أو سكتة دماغية;
 - كان يوجد لديك (أو كانت لديك في الماضي) ذبحة صدرية (وضع الذي يؤدي لألم حاد في الصدر وقد يكون علامة أولية لنوبة قلبية) أو نوبة إقفارية عابرة (TIA - أعراض مؤقتة لسكتة دماغية);
 - كان يوجد لديك أحد الأمراض التالية التي قد تعزز من الاختطار لديك لجلطة دموية في الشرايين:
 - سكري وخيم مصحوب بضرر في الأوعية الدموية
 - ضغط دم مرتفع جدًا
 - مستوى مرتفع جدًا من الدهون في الدم (كوليسترول أو دهون ثلاثية)
 - وضع المعروف بفرط - الهوموسيستين
 - كان يوجد لديك (أو كان لديك في الماضي) نوع من الصداع النصفي المُسمى "صداع نصفي مع هالة-أورة";
 - كان يوجد لديك أو كان لديك في الماضي مرض كبد وخيم;
 - كان لديك في الماضي ورم في الكبد;
 - كان يوجد لديك أو كان في الماضي التهاب في البنكرياس المرتبط بمستويات مرتفعة من الدهون في دمك;
 - كان يوجد لديك سرطان المتأثر بهرمونات الجنس, مثل سرطان ثدي مُعين, بطانة الرحم, أو المبيض;
 - كان يوجد لديك نزيف مهبلي الذي لم يُفسر من قبل طبيبك;
 - كان يوجد لديك نمو غير سليم لمُخاط الرحم (Endometrial hyperplasia);
 - كنت حساسة (أرجية) للمواد الفعالة أو لأي واحد من المواد الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظري بند 6);
 - كان يوجد لديك التهاب كبد فيروسي من نوع C وتتناولين مستحضرات طبية التي تحتوي أوميبتاسفير/ پاريتايفير/ ريتونايفير وداسابوفير أو چليكيرفير/ فيرنتسفير (أنظري أيضًا بند "تفاعلات بين الأدوية");
 - كنت حامل أو تشكين بأنك قد تكونين حامل (أنظري بند "حمل, إرضاع وخصوبة").
- إذا كنت تعانين أيًا من هذه, أو أنها حدثت للمرة الأولى أثناء تناولك فيمينيت, اتصلي بطبيبك بأقرب وقت ممكن. لا تتناولي فيمينيت.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

متى يجب عليك التوجه إلى طبيبك؟

توجهي لمساعدة طبية طارئة

- إذا كنت تلاحظين أعراض محتملة لتجلط دموي, التي قد يكون معناها أنك تعانين من جلطة دموية في الرجل (أي, خثار الأوردة العميقة), جلطة دموية في الرئتين (أي, انصمام رئوي), نوبة قلبية أو سكتة دماغية (أنظري وصف الأعراض في بند 4 "أعراض جانبية").
- إذا كنت تختبرين أعراض وذمة وعائية مثل انتفاخ في الوجه, في اللسان و/أو في الحلق و/أو صعوبات في البلع أو شرى, التي قد تظهر مع صعوبات في التنفس (أنظري البند أدناه "قبل استعمال فيمينيت, أخبري طبيبك إذا كان أحد الأوضاع التالية ينطبق عليك").

قبل استعمال فيمينيت, أخبري طبيبك إذا كان أحد الأوضاع التالية ينطبق عليك;

إذا تطور الوضع أو تفاقم أثناء استعمال فيمينيت, عليك إخبار طبيبك بذلك:

● كان لديك ذات مرة مشاكل في القلب, الدورة الدموية أو تجلط الدم

● يوجد لديك سكري

● كان لديك ذات مرة مشاكل في الكلية أو الكبد

- كان لديك ذات مرة **اكتئاب وخيم**
- كان لديك ذات مرة **صداع نصفي**
- كانت لديك **مشاكل أثناء الحمل أو أثناء استعمال القرص**, مثل: حكة بكل الجسم, يرقان غير ناجم عن تلوث, أحجار في المرارة, ذئبة احمرارية مجموعية (SLE), طفح شبيهه بالحويصلات (herpes gestationis), مشاكل سمع (تصلب الأذن الوسطى) حالات نادرة أخرى التي تُدعى البرفيرية (porphyria), وذمة وعائية وراثية ومكتسبة (عليك رؤية طبيبك على الفور إذا كنت تخبرين اعراض وذمة وعائية مثل انتفاخ في الوجه, في اللسان و/أو في الحلق و/أو صعوبات في البلع أو شرى, التي قد تظهر مع صعوبات في التنفس. قد تسبب المستحضرات التي تحتوي على أستروجين أعراض وذمة وعائية وراثية ومكتسبة أو قد تفاقمها).
- يوجد لديك **بقع بنية على الوجه أو الجسم (كأف)**. إذا كان ذلك, امتنعي عن التعرض المُفرط للشمس أو الأشعة فوق بنفسجية.
- يوجد لديك مرض كرون أو التهاب تقرحي في المعى الغليظ.
- يوجد لديك ذئبة احمرارية مجموعية.
- يوجد لديك متلازمة انحلال الدم اليوريمي (اضطراب في تخثر الدم الذي يؤدي لفشل كلوي).
- يوجد لديك فقر دم منجلي (مرض وراثي بخلايا الدم الحمراء).
- يوجد لديك مستويات مرتفعة من الدهون في الدم (فرط ثلاثي الغليسريد) أو تاريخ عائلي إيجابي بخصوص هذا الوضع. فرط ثلاثي الغليسريد مرتبط باختطار مرتفع لتطور التهاب البنكرياس.
- كنت بحاجة لجراحة أو أنك غير قادرة على الوقوف على رجليك لفترة زمنية متواصلة (أنظري بند 2 "جلطات دموية").
- إذا كنت قد أنجبت للتو, فأنت باخطار مرتفع لجلطات دموية. عليك سؤال طبيبك, ما هو أبكر موعد بعد الولادة حيث يمكنك البدء فيه باستعمال **فيمينيت** (أنظري بند "القرص والخثرة").
- لديك التهاب في الأوردة تحت الجلد.
- لديك دوالي.

القرص والخثرة

جلطات دموية

- استعمال وسائل منع هرمونية مدمجة مثل **فيمينيت**, يزيد من الاخطار لديك لتطور جلطة دموية بالمقارنة مع عدم استعماله. في حالات نادرة, قد تسد الجلطة الدموية وعاء دموي وتسبب مشاكل جدية. يمكن أن تتطور جلطات دموية
- في الأوردة (يدعى "خثار وريدي" أو VTE)
 - في الشرايين (يدعى "خثار شرياني" أو ATE)
- التعافي من جلطات دموية لا يكون دائماً كاملاً. في حالات نادرة من الممكن ان تكون تأثيرات وخيمة متواصلة, أو, في حالات نادرة جداً, قد تكون مميتة.
- من المهم التذكّر أن **الاخطار العام لجلطة دموية ضارة بسبب استعمال فيمينيت يعتبر منخفضاً.**

كيفية تمييز جلطة دموية

العلامات لجلطة دموية مفصلة في بند 4 "أعراض جانبية". إذا كنت تلاحظين واحدة من العلامات لجلطة دموية, توجهي لعلاج طبي طارئ.

جلطة دموية في الوريد

ما الذي يمكن حصوله إذا تكوّنت جلطة دموية في الوريد؟

- تم ربط استعمال وسائل منع هرمونية مُدمجة بارتفاع الاخطار لجلطات دموية في الأوردة. بالرغم من ذلك, هذه الأعراض الجانبية نادرة.
- إذا تكوّنت جلطة دموية في الوريد في الرجل أو كف الرجل قد تتسبب بخثار في وريد عميق (DVT).
- إذا انتقلت جلطة دموية من الرجل واستقرت في الرئة قد تتسبب في انصمام رئوي.
- في حالات نادرة جداً قد تتشكل جلطة في الوريد في عضو آخر, مثل العين.

متى يكون الاخطار الأعلى لتطور جلطة دموية في الوريد؟

الاخطار الأعلى لتطور جلطة دموية في الوريد يكون خلال السنة الأولى من تناول وسائل المنع الهرمونية المُدمجة في المرة الأولى. قد يكون الاخطار أعلى أيضاً إذا قمت بتجديد تناول وسيلة المنع الهرمونية المُدمجة (نفس المستحضر أو مستحضر مختلف) بعد التوقف لـ 4 أسابيع أو أكثر.

ينخفض الاخطار بعد السنة الأولى, لكنه يبقى دائماً أعلى بقليل من إذا لم تكوني تستعملين وسيلة منع هرمونية مُدمجة. بعد التوقف عن تناول **فيمينيت**, الاخطار لديك لجلطة دموية يعود لسابق عهده خلال عدة أسابيع.

ما هو الاخطار لتطور جلطة دموية؟

الاخطار متعلق بالاخطار الطبيعي لديك لخثار وريدي وينوع وسيلة المنع الهرمونية المُدمجة التي تتناولينها. الاخطار الاجمالي لجلطة دموية في الرجل أو الرئتين مع **فيمينيت** هو منخفض.

- من بين 10,000 امرأة اللواتي لا تستعملن أي وسيلة منع هرمونية مُدمجة وغير حوامل, ما يقارب 2 يطوّرن جلطة دموية خلال سنة.
- من بين 10,000 امرأة اللواتي يستعملن وسيلة منع هرمونية مُدمجة التي تحتوي ليفونورجستريل, نورتيسترون أو نورجيسثيمات, ما يقارب 5-7 يطوّرن جلطة دموية خلال سنة.
- من بين 10,000 امرأة اللواتي يستعملن وسيلة منع هرمونية مُدمجة التي تحتوي ديسوجيستريل مثل **فيمينيت**, ما يقارب 9-12 امرأة يطوّرن جلطة دموية خلال سنة.
- يختلف الاختطار لجلطة دموية وفق التاريخ الطبي الشخصي الخاص بك (أنظري "**عوامل التي تزيد الاختطار لجلطة دموية لديك**" فيما يلي).

عوامل التي تزيد الاختطار لجلطة دموية في الوريد لديك

- الاختطار لجلطة دموية مع **فيمينيت** هو منخفض, لكن هناك عدة حالات التي ترفع من هذا الاختطار. الاختطار لديك أعلى:
- إذا كنت ذات وزن زائد جداً (BMI فوق 30 كغم/متر مربع);
- إذا كان لدى شخص من عائلتك القريبة جلطة دموية في الرجل, في الرئتين أو في عضو آخر في سن مبكرة (مثلاً, تحت جيل 50 سنة). في هذه الحالة قد يكون لديك اضطراب وراثي في تجلّط الدم;
- إذا كنت مضطرة للخضوع لعملية جراحية, أو في حالات لا تكوني قادرة على الوقوف على رجليك لفترة زمنية متواصلة بسبب إصابة أو مرض, أو أن رجلك مثبتة بالجبس. قد تكون حاجة لإيقاف استعمال **فيمينيت** عدة أسابيع قبل الجراحة أو عندما نقل حركتك. إذا اضطرت لإيقاف استعمال **فيمينيت**, إسأل طبيبك متى يمكنك البدء باستعماله مجدداً;
- مع التقدم في الجيل (خاصةً فوق سن 35 سنة);
- إذا كنت قد أنجبت قبل أقل من عدة أسابيع.
- الاختطار لتطور جلطة دموية يرتفع كلما كان لديك عوامل أكثر.
- رحلات جوية (أكثر من 4 ساعات) قد ترفع بشكل مؤقت الاختطار لديك لجلطة دموية, خصوصاً إذا كان لديك جزء من العوامل الأخرى في القائمة.
- من المهم اخبار الطبيب إذا كانت أحد هذه الحالات تنطبق عليك, كذلك إذا لم تكوني متأكدة. قد يُقرر طبيبك إيقاف استعمال **فيمينيت**. إذا تغيرت إحدى الحالات المذكورة أعلاه اثناء استعمال **فيمينيت**, مثلاً إذا عانى أحد الأقرباء من انصمام دون سبب معلوم, أو إذا ارتفعت كثيراً بالوزن, أخبرني طبيبك.

جلطات دموية في الشريان

ماذا الذي يمكن حدوثه إذا تشكلت جلطة دموية في الشريان؟

على غرار الجلطة الدموية في الوريد, قد تسبب جلطة في الشريان مشاكل وخيمة, مثلاً, قد تُسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عوامل التي تزيد الاختطار لديك لجلطة دموية في الشريان

- من المهم ذكر أن الاختطار لنوبة قلبية أو سكتة دماغية نتيجة استعمال **فيمينيت** منخفض جداً لكن قد يرتفع:
- مع التقدم في الجيل (فوق سن 35 سنة);
- إذا كنت **مُخنئة**. خلال استعمال وسيلة منع هرمونية مُدمجة مثل **فيمينيت** يوصى بالتوقف عن التدخين. إذا لم تنجح بالتوقف عن التدخين وكنت فوق جيل 35 سنة قد ينصحك الطبيب باستعمال نوع آخر من وسائل المنع;
- إذا كنت ذات وزن زائد;
- إذا كان لديك ضغط دم مرتفع;
- إذا كان لدى شخص من عائلتك القريبة نوبة قلبية أو سكتة دماغية في سن مبكرة (تحت جيل 50 سنة). في هذه الحالة قد يكون لديك اختطار أعلى للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية;
- إذا كان لديك, أو لشخص من عائلتك القريبة مستوى مرتفع من الدهون في الدم (كوليسترول أو دهون ثلاثية);
- إذا كان لديك صداع نصفي, خصوصاً صداع نصفي مع هالة-أورة;
- إذا كان لديك مشكلة في القلب (اضطراب في الصمام, اضطراب في نظم القلب المُسمى رجفان أذيني);
- إذا كان لديك سكري.
- إذا كان لديك أكثر من واحدة من هذه الحالات, أو أيًا منها كانت وخيمة بشكل خاص, الاختطار لتطور جلطة دموية قد يرتفع أكثر حتى.
- إذا تغيرت إحدى الحالات المذكورة أعلاه اثناء استعمال **فيمينيت**, مثلاً, إذا بدأت بالتدخين, عانى أحد الأقرباء من انصمام دون سبب معلوم أو إذا ارتفعت جداً بالوزن, أخبرني طبيبك.

القرص والسرطان

يُقلل القرص الاختطار لديك لسرطان المبيض والرحم, إذا تم أخذه لمدة طويلة. بالرغم من ذلك, على ما يبدو يرفع كذلك الاختطار بعض الشيء لديك **سرطان عنق الرحم**, رغم أن ذلك قد ينبع من القيام بعلاقات جنسية دون واقى ذكري (كوندوم) وليس من القرص نفسه. يتوجب على كل النساء القيام بفحوصات دورية **لسطح عنق الرحم**. إذا كان لديك **سرطان ثدي**, أو كان لديك في الماضي, لا يسمح لك بتناول القرص. يرفع القرص الاختطار بعض الشيء لسرطان الثدي. يرتفع هذا الاختطار كلما تناولت القرص لفترة أطول, لكنه يعود للمستوى الطبيعي تقريباً بعد 10 سنوات من إيقافه. لأن

سرطان الثدي نادر لدى النساء تحت جيل 40 سنة، العدد الإضافي لحالات سرطان الثدي بين المستخدمين الحاليات أو اللواتي تناولن القرص مؤخرًا صغير. مثلًا:

- من بين 10,000 امرأة اللواتي لم تتناولن القرص أبدًا، ما يقارب 16 امرأة سيَطَوَّرن سرطان الثدي حتى جيل 35.
- من بين 10,000 امرأة اللواتي تناولن القرص لمدة 5 سنوات في سنوات العشرين المبكرة لديهن، ما يقارب 17-18 امرأة سيَطَوَّرن سرطان الثدي حتى جيل 35.
- من بين 10,000 امرأة اللواتي لم يتناولن القرص، ما يقارب 100 امرأة سيَطَوَّرن سرطان الثدي حتى جيل 45.
- من بين 10,000 امرأة اللواتي تناولن القرص لمدة 5 سنوات في سنوات الثلاثين المبكرة لديهن، ما يقارب 110 امرأة سيَطَوَّرن سرطان الثدي حتى جيل 45.

الاختطار لسرطان الثدي لديك مرتفع، إذا كان لديك:

- قريبة عائلة (أم، أخت أو جدة) التي كان لديها بالماضي سرطان ثدي;
- وزن زائد وخيم.
- توجهي فورًا إلى الطبيب إذا لاحظت تغيرات أيًا كانت في ثدييك، مثل ترصع (غمارة) في الجلد، تغيرات في الحلمة أو أي كتلة تريتها أو تشعيرين بها.

تناول القرص مرتبط أيضًا بأمراض الكبد، مثل اليرقان وأورام غير سرطانية في الكبد، لكن هذا نادر. في حالات نادرة جدًا، يرتبط القرص أيضًا بحالات معينة من سرطان الكبد في النساء اللواتي تناولنه لفترة طويلة. توجهي فورًا إلى الطبيب إذا كنت تعاني من ألم وخيم في بطنك، أو من اصفرار الجلد أو العينين (يرقان). قد تضطرين إلى التوقف عن تناول فيمينيت.

اضطرابات نفسية

نساء معينات اللواتي يستعملن وسائل منع حمل هرمونية، يشمل فيمينيت، قمن بالتبليغ عن اكتئاب أو حالة مزاجية مكتئبة. قد يكون الاكتئاب جدي وقد يؤدي أحيانًا لأفكار انتحارية. إذا كنت تعاني من تغيرات في الحالة المزاجية وعوارض الاكتئاب توجهي لطبيبك لتلقي استشارة طبية إضافية بأقرب وقت ممكن.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناولين أو تناولت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب، مستحضرات نباتية وإضافات تغذية، أخبري الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالإضافة لذلك، يجب إعلام كل طبيب أو طبيب أسنان الذي يصف لك دواء آخر (أو الصيدلي) أنك تستعملين فيمينيت. سبب ذلك هو أن فيمينيت قد يؤثر على نجاعة فاعلية أدوية أخرى وقد يسبب ارتفاع في التأثير (مثلًا سيكلوسبورين) أو انخفاض في التأثير (مثلًا لاموتريجين). ذكرى طبيبك إذا كنت تتناولين هذه الادوية، في حالة وجب ملائمة علاجك.

كذلك، افحصي النشرات المرفقة بكل الأدوية الخاصة بك لكي ترين إذا كان يمكن تناولها مع وسائل منع هرمونية.

جزء من الأدوية قد تؤدي إلى تضرر نجاعة فيمينيت. هذه تشمل أدوية المستعملة لعلاج:

- الصرع (بريميديون، فينيتوين، فينوباربيتال، كارپامازين، أوكسكارپازين، توبريمات، فلبامات، مودفينيل);
 - السل (ريفامبيسين);
 - تلوث بفيروس الـ HIV (ريتونافير، نيلفينافير، نيفيرابين، إفايرينز);
 - تلوث بفيروس الكبد من نوع C (مثلًا، بوسفير، تلافير);
 - أمراض تلوثة أخرى (مثلًا جريسوفولفين);
 - ضغط دم مرتفع في أوعية الدم في الرئتين (بوسانتان);
 - حالات مزاجية مكتئبة (دواء أو مستحضر يحتوي على نبات الهيبيريكوم (العرن المثقوب) – St. John's Wort)
- إذا كنت تتناولين أدوية أو مستحضرات نباتية التي قد تقلل من نجاعة فيمينيت، بالإضافة يجب استعمال وسيلة منع حاجبة. لأن تأثير دواء آخر على فيمينيت قد يستمر حتى 28 يوم بعد التوقف عن تناول الدواء، يجب مواصلة استعمال وسيلة المنع الحاجبة طوال هذه الفترة الزمنية.

لا يجوز تناول فيمينيت إذا كان يوجد لديك التهاب كبد فيروسي من نوع C وكنت تتناولين مستحضرات طبية التي تحتوي أومبيتايفير/ پاريتايفير/ ريتونافير وداسابوفير أو جليكبرفير/ فيبرنتسفير، لأن ذلك قد يؤدي لارتفاع في نتائج فحوصات الدم لوظائف الكبد (ارتفاع بإنزيم الكبد من نوع ALT).

سيصف طبيبك نوع آخر من وسائل منع الحمل قبل أن تبدئي العلاج بهذه المستحضرات الطبية. يمكن البدء من جديد بتناول فيمينيت بعد أسبوعين تقريبًا من إتمام هذا العلاج. أنظري "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

فحوصات ومتابعة

إذا كنت بحاجة للقيام بفحوصات دم، أبلغني طبيبك أنك تتناولين القرص لأن القرص قد يؤثر على نتائج فحوصات دم معينة.

استعمال الدواء والغذاء

لا توجد تعليمات خاصة بخصوص الطعام والشراب أثناء تناول **فيمينيت**.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تستعملي **فيمينيت** إذا كنت حاملاً. إذا كنت تظنين أنك قد تكونين حامل، قومي بإجراء فحص حمل من أجل المصادقة بأنك حامل قبل أن تتوقفي عن تناول **فيمينيت**. لا يوصى باستعمال **فيمينيت** أثناء الإرضاع. اسألي طبيبك بخصوص وسائل منع بديلة. من الممكن ألا يمنعك الإرضاع من الحمل.

السياقة واستعمال الآلات

لا يوجد ل**فيمينيت** تأثير معروف على القدرة على السياقة أو على تشغيل الآلات.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على لاكتوز. إذا قيل لك في الماضي من قبل الطبيب أنه يوجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة، استشيرى الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

الاستعمال لدى المراهقات

لا توجد معلومات سريرية عن النجاعة والسلامة لدى المراهقات تحت جيل 18 سنة.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني متأكدة بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

كيفية تناول فيمينيت

من أجل منع الحمل، يجب دائماً أخذ **فيمينيت** تماماً كما هو موصوف في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي.

خذي فيمينيت كل يوم لمدة 21 يوم

يأتي **فيمينيت** بلوحية من 21 قرص، حيث أن كل واحد معلّم في اللوحية باسم اليوم من الأسبوع.

- خذي القرص الخاص بك كل يوم في نفس الساعة.
- ابدئي عن طريق تناول القرص المعلّم باليوم الصحيح من الأسبوع.
- تابعي باتجاه الأسهم على ظهر اللوحية. خذي قرصاً واحداً في كل يوم حتى تنهين كل الـ 21 قرصاً.
- ابلعي كل قرص كاملاً مع الماء إذا دعت الحاجة.
- يُمنع سحق/شطر/مضغ القرص لأن هذه العمليات قد تشوش امتصاص المادة الفعالة في القرص وبذلك تضر بنجاعته.

بعد ذلك خذي استراحة من 7 أيام بدون القرص.

بعد أن أخذت كل الـ 21 قرصاً في اللوحية، يوجد لديك 7 أيام خلالها لا تأخذين أقراصاً. لذلك، إذا تناولت القرص الأخير من عبوة واحدة في يوم الجمعة، خذي القرص الأول من العبوة التالية يوم السبت من الأسبوع التالي.

خلال عدة أيام من تناول القرص الأخير من اللوحية، من المفترض أن يظهر لديك نزيف مثل الطمث. من الممكن أن لا ينتهي النزيف عندما يحين وقت البدء باللوحية التالية من الأقراص.

لست بحاجة لاستعمال وسائل منع إضافية أثناء الأيام السبعة بدون القرص، ما دمت أخذت أقراصك بصورة صحيحة وكنت ستبدئين اللوحية التالية من الأقراص في الوقت.

بعد ذلك ابدئي اللوحية التالية

ابدئي أخذ اللوحية التالية من **فيمينيت** بعد السبعة أيام بدون القرص، سواء توقفت النزيف أو لا. ابدئي دائماً اللوحية الجديدة في الوقت.

ما دمت تتناولين **فيمينيت** بصورة صحيحة، دائماً ستبدئين اللوحية الجديدة في نفس اليوم من الأسبوع.

بدء فيمينيت

كمستخدمة جديدة أو عندما تبدئين أخذ القرص مرة أخرى بعد استراحة

إما أن تأخذي قرص **فيمينيت** الأول في اليوم الأول من دورتك الشهرية التالية. عندما تبدئين بهذه الطريقة، ستكون لديك حماية ضد الحمل من القرص الأول.

أو إذا بدأت دورتك الشهرية، ابدئي بتناول **فيمينيت** في اليوم الخامس (حيث تعدين اليوم الأول من دورتك الشهرية كاليوم رقم 1)، سواء توقفت النزيف لديك أو لا. عليك كذلك استعمال وسيلة منع إضافية مثل الواقي الذكري (كوندوم)، حتى تأخذين السبع أقراص الأولى بصورة صحيحة.

الانتقال ل**فيمينيت** من قرص آخر لمنع الحمل

• إذا كنت تأخذين قرص المتناول 21 يوماً: ابدئي بأخذ **فيمينيت** في اليوم التالي من انتهاء اللوحية السابقة. سيكون لديك حماية ضد الحمل من القرص الأول، لكن لن يكون لديك نزيف حتى تنتهي من اللوحية الأولى من **فيمينيت**.

- إذا كنت تأخذين قرص المتناول 28 يوماً: ابدي بأخذ فمِينيت يوم بعد القرص الفعّال الأخير. ستكون لديك حماية ضد الحمل من القرص الأول. لن يكون لديك نزيف حتى تنتهي من اللويحة الأولى من فمِينيت.
- أو إذا كنت تأخذين قرص من بروجستوجين فقط ("قرص-ميني" أو POP): ابدي فمِينيت في اليوم الأول للنزيف، حتى إذا كنت قد أخذت قرص-الميني لنفس اليوم. ستكون لديك حماية فورية ضد الحمل. إذا لم يكن لديك عادةً نزيف عندما كنت تأخذين قرص بروجستوجين فقط، تستطيعين التوقف عن أخذه في كل يوم والبدء بتناول فمِينيت في اليوم التالي. سيتوجب عليك استعمال وسيلة منع إضافية، مثل الواقي الذكري (كوندوم)، لمدة 7 أيام.

الإنتقال لفمِينيت من حقنة بروجستوجين فقط، غرسة أو أداة داخل الرحم التي تسرح بروجستوجين (IUD)

ابدي بأخذ فمِينيت عندما يكون من المفترض بك تلقي الحقنة التالية أو في يوم إزالة الغرسة أو الجهاز داخل-الرحم لديك. تأكدي من أنك تستعملين أيضاً وسيلة منع حمل إضافية، مثل واقي ذكري (كوندوم)، لمدة الـ 7 أيام الأولى من تناول فمِينيت.

البدء بفمِينيت بعد إجهاض طبيعي أو اصطناعي

إذا كان لديك إجهاض طبيعي أو اصطناعي، قد يقول لك طبيبك أن تبدي بأخذ فمِينيت فوراً. ما يعني أنه ستكون لديك حماية ضد الحمل فوراً من القرص الأول.

منع الحمل بعد الولادة

إذا أنجبت للثو، استشيري طبيبك بخصوص منع الحمل.

إذا لم تكوني ترضعين:

- يمكنك البدء بأخذ فمِينيت بعد ثلاثة أسابيع من الولادة، أو،
- يمكنك البدء بتناول فمِينيت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الولادة، لكن سيتوجب عليك استعمال وسيلة منع إضافية، مثل واقي ذكري (كوندوم)، حتى تأخذي السبعة أقرص الأولى بصورة صحيحة.
- إذا أقيمت علاقة جنسية منذ الولادة، هنالك احتمال بأن تكوني حامل، لذلك عليك استعمال وسيلة أخرى لمنع الحمل، مثل واقي ذكري (كوندوم). في هذه الحالة، خذي القرص الأول من فمِينيت في اليوم الأول من دورتك الشهرية القادمة.

قرص الذي تم نسيانه

في حال كان التأخير في تناول قرص واحد أقل من 12 ساعة:

- خذي القرص المنسي فوراً والأقرص التالية كالمعتاد. أي، من الممكن أن تأخذي قرصين في يوم واحد.
- لا تقلقي. من غير المفروض أن تقل حمايتك ضد الحمل.
- إذا كان التأخير بتناول قرص واحد أكثر من 12 ساعة، أو أنك نسيت تناول أكثر من قرص واحد:
- خذي القرص الأخير المنسي فوراً.
- اتركي الأقرص التي نسيته في السابق في اللويحة.
- خذي الأقرص التالية كالمعتاد. أي، من الممكن أن تأخذي قرصين في يوم واحد.
- استعملي وسائل منع إضافية (كوندومات مثلاً) خلال الـ 7 أيام التالية.
- افحصي كم قرصاً تبقى في العبوة بعد القرص الأخير المنسي:

إذا بقيت أقل من 7 أقرص في العبوة:

- لا تنسي استعمال وسائل حماية إضافية خلال الـ 7 أيام التالية.
- عند إنهائك لويحة الأقرص، ابدي لويحة جديدة في اليوم التالي، دون توقف.
- إذا لم تتلقي دورة شهرية بعد انتهاء العبوة الثانية، قومي بإجراء فحص حمل قبل أن تبدي لويحة إضافية.
- إذا نسيت قرصاً واحداً أو أكثر في الأسبوع الأول (أيام 1 حتى 7) وأقيمت علاقات جنسية في هذا الأسبوع، فإنك قد تدخلين في حمل. تواصل مع طبيبك أو الصيدلي للاستشارة في أقرب وقت ممكن.
- إذا بقيت 7 أقرص أو أكثر في العبوة:
- لا تنسي استعمال وسائل حماية إضافية خلال الـ 7 أيام التالية.
- عند إنهائك العبوة، حافظي على استراحة من 7 أيام، قبل أن تبدي بعبوة جديدة.
- إذا نسيت قرصاً واحداً أو أكثر في الأسبوع الأول (أيام 1 حتى 7) وأقيمت علاقات جنسية في هذا الأسبوع، فإنك قد تدخلين في حمل. اتصلي بطبيبك أو الصيدلي للاستشارة في أقرب وقت ممكن. من الممكن أن يوصوا لك باستعمال وسيلة طوارئ لمنع الحمل.

إذا نسيت أية أقرص في اللويحة، ولم يحدث الطمث في الاستراحة الأولى الخالية من الأقرص، من الممكن أنك حامل. اتصلي بطبيبك، أو قومي بنفسك بإجراء فحص للحمل.

إذا بدأت لويحة جديدة من الأقرص بتأخير، أو أجريت "أسبوع استراحة" أطول من سبعة أيام، من الممكن أن لا تكوني محمية من الحمل. إذا أقيمت علاقات جنسية في الأيام السبعة الأخيرة، استشيري طبيبك أو الصيدلي. قد تحتاجين إلى التفكير بوسيلة طوارئ لمنع الحمل. بالإضافة إلى ذلك، عليك استعمال وسائل منع إضافية، مثل واقي ذكري (كوندوم)، لمدة 7 أيام.

قرص مفقود

إذا فقدت قرصًا،
إمّا أن تأخذ القرص الأخير في اللويحة بدلًا عن القرص المفقود. بعد ذلك، خُذِي جميع الأقراص الأخرى في الأيام الملائمة.
دورتك الشهرية ستكون أقصر بيوم واحد من المعتاد، لكن حمايتك ضد الحمل لن تتأثر. بعد الـ 7 أيام دون القرص، سيكون لك يوم
بداية جديد، يوم واحد أبكر من اليوم السابق الذي كان لديك.
أو إذا كنت لا تريدين تغيير اليوم الأول لتناول القرص، خُذِي قرص من لويحة إضافية. بعد ذلك، خُذِي جميع الأقراص الأخرى من
لويحتك الحالية، كالمعتاد.
تستطيعين الاحتفاظ باللويحة الإضافية المفتوحة في حال فقدتي أقراصًا إضافية.

إذا كنت تتقيئين أو تعانين من الإسهال

إذا كنت تتقيئين أو تعانين من إسهال شديد، جسمك لن يتلقى جرعة الهرمونات الاعتيادية من هذا القرص.
إذا كنت تتقيئين خلال 3-4 ساعات بعد تناول القرص، الوضع مماثل لقرص منسي. عليك إتباع النصائح بخصوص الأقراص
المنسية. أنظري بند 3، "قرص الذي تم نسيانه".
إذا يوجد لديك إسهال وخيم لمدة تزيد عن 12 ساعة بعد تناول فِيمِينِيْت، اتبعي التعليمات بخصوص إذا كنت بتأخير أكثر من 12
ساعة أنظري بند 3، "قرص الذي تم نسيانه".
تحدثي مع طبيبك إذا استمر عسر الهضم لديك أو تفاقم. قد يوصي بوسيلة أخرى لمنع الحمل.

دورة شهرية التي تم تفويتها – هل من الممكن بأتك حامل؟

أحيانًا، ستفوتين نزيف خلال أسبوع الاستراحة من الأقراص. قد يبدو هذا كأنك حامل، لكن هذا غير مُرَجَّح بشدة إذا تناولت أقراصك
بالشكل الصحيح. ابدي اللويحة التالية في الوقت المعتاد. إذا كنت تعتقدين بأنه من الممكن أنك وضعت نفسك باختطار للحمل (على
سبيل المثال، عن طريق نسيان أقراص أو تناول أدوية أخرى)، أو إذا لم يأت النزيف الثاني أيضًا، عليك إجراء فحص للحمل. إذا
كنت حاملًا، توقفي عن تناول فِيمِينِيْت وتوجهي إلى طبيبك.

تناول أكثر من قرص واحد ليس من المفروض أن يُسبب ضررًا

من غير المرجح أن تناول أكثر من قرص واحد سيسبب لك أي ضرر، لكن من الممكن أن تشعري بغثيان، تتقيئين أو أن يكون لديك
نزيف مهبطي معين. تحدثي مع طبيبك إذا كان يوجد لديك أحد هذه الأعراض.
إذا بلغ طفلك من القرص، توجهي فورًا إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضري عبوة الدواء معك.

بإستطاعتك تأخير الدورة الشهرية

إذا كنت تريدين تأخير تلقي الدورة الشهرية، قومي بإنهاء لويحة الأقراص التي تتناولينها. ابدي اللويحة التالية في اليوم التالي، دون
توقف. خُذِي هذه اللويحة بالطريقة الاعتيادية. بعد اللويحة الثانية، اتركي 7 أيام دون قرص كالمعتاد، وبعد ذلك ابدي اللويحة التالية
من الأقراص، كالمعتاد. خلال استعمال اللويحة الثانية، من الممكن أن يكون لديك أنزفة غير متوقعة أو تنبُع في أيام تناول القرص،
لكن لا تقلقي.

عندما تريدين الدخول في الحمل

إذا كنت تخططين لحمل، يُفضل استعمال وسيلة أخرى لمنع الحمل بعد إيقاف فِيمِينِيْت، حتى تتلقين دورة شهرية ملائمة. يستند طبيبك
على تاريخ طمئنتك الطبيعي الأخير قبل أن دخلت في الحمل، ليقول لك ما هو تاريخ الولادة المتوقع. بالرغم من ذلك، لن ينتج ضرر
لك أو لطفلك إذا دخلت فورًا في الحمل.

4. أعراض جانبية

ككل أي دواء، قد يسبب استعمال فِيمِينِيْت أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزعي من قراءة قائمة الأعراض الجانبية.
قد لا تصابين بأي واحدة منها.
إذا كان لديك أية أعراض جانبية، خاصة إذا كانت جدية ومتواصلة، أو أن هناك أي تغيير في صحتك الذي تعتقدين بأنه قد يكون نتيجة
لفِيمِينِيْت، الرجاء تحدثي مع طبيبك.
اختطار مرتفع لجلطات دموية في الأوردة والشرابين موجود لدى كل النساء اللواتي يتناولن وسائل منع هرمونية مُدمجة. أنظري بند
2 "قبل استعمال الدواء".

تواصلتي مع طبيب على الفور إذا كنت تختبرين أحد الأعراض التالية لوذمة وعائية: انتفاخ في الوجه، في اللسان و/أو في الحلق
و/أو صعوبات في البلع أو شرى التي قد تظهر مع صعوبات في التنفس (أنظري كذلك بند 2 "قبل استعمال الدواء").

أعراض جانبية وخيمة – توجهي للطبيب فورًا:

علامات لخثار الأوردة العميقة تشمل:

- انتفاخ رجل واحدة أو على امتداد وريد في الرجل أو في كف القدم خاصة عندما يكون مصحوبًا ب:
- ألم أو حساسية في الرجل اللذان قد يكونان محسوسان فقط وقت الوقوف أو المشي؛
- سخونة زائدة في الرجل المصابة؛
- تغيير في لون جلد الرجل، كأن تتحول لشاحبة، حمراء أو زرقاء.

علامات لإتصام رنوي:

- ضيق تنفس مفاجئ غير مُبرر أو أنفاس سريعة;
- سُعال مفاجئ دون سبب واضح, الذي قد يكون دمويًا;
- آلام حادة في الصدر التي قد تتفاقم مع الأنفاس العميقة;
- شعور وخيم بالدوار أو دوخة;
- نظم قلب سريع أو غير منتظم;
- ألم بطن وخيم;

إذا لم تكوني متأكدة, توجهي إلى الطبيب حيث أن جزءًا من هذه الأعراض, مثل سُعال أو ضيق تنفس, قد تُحسب خطأ كوضع مُعتدل أكثر, مثل تلوث في مجاري التنفس (على سبيل المثال رشح).

علامات لُخثار في وريد الشبكية (جلطة دموية في العين):

أعراض التي تظهر غالبًا بعين واحدة: فقدان فوري للبصر أو تشوش رؤية دون آلام, الذي قد يتطور لفقدان الرؤية.

علامات لنوبة قلبية:

- آلام, عدم راحة, ضغط, ثقل في الصدر;
- شعور تشنج أو امتلاء في الصدر, في الذراع أو تحت عظم الصدر;
- امتلاء, مشاكل هضم أو شعور باختناق;
- عدم راحة في القسم العلوي من الجسم الذي يُشع إلى الظهر, الفك, الحلق, الذراع والبطن;
- تعرق, غثيان, تقيؤ أو دوخة;
- ضعف متطرف, قلق, أو ضيق تنفس;
- نظم قلب سريع أو غير منتظم.

علامات لسكتة دماغية:

- ضعف أو قلة شعور مفاجئين في الوجه, الذراع أو الرجل, خاصة في جانب واحد من الجسم;
 - ارتباك مفاجئ, صعوبة في التكلم أو في الفهم;
 - مشكلة مفاجئة بالرؤية في عين واحدة أو في كلتا العينين;
 - صعوبة مفاجئة في المشي, دوخة, فقدان التوازن أو التناسق;
 - ألم رأس مفاجئ, وخيم أو متواصل دون سبب معروف;
 - فقدان وعي أو إغماء مع أو بدون اختلاجات.
- أحيانًا أعراض السكتة قد تكون قصيرة مع تعافي تقريبًا فوري وكامل, لكن عليك التوجه, بالرغم من ذلك, لعلاج طبي طارئ حيث أنك قد تكونين باحتمار لسكتة دماغية إضافية.

علامات لجلطات دموية التي تعيق أو عية دموية أخرى:

- انتفاخ وزرقة خفيفة (تغير في اللون) في أحد الأطراف;
- ألم بطن وخيم (بطن حاد [شديد]).

علامات لرد فعل تحسسي وخيم لفميينيت: انتفاخ الوجه, الشفتين, الفم, اللسان أو الحلق.

علامات لسرطان ثدي تشمل:

- تَرَصُّع (غمَازة) في الجلد;
- تغيرات في الحلمة;
- كل كتلة تستطيعين رؤيتها أو الشعور بها.

علامات لسرطان عنق الرحم تشمل:

- إفراز مهبلي ذو رائحة غير لطيفة ويحتوي على دم;
- نزيف مهبلي غير طبيعي;
- آلام في الحوض;
- ألم عند الجماع الجنسي.

علامات لمشاكل وخيمة في الكبد تشمل:

- ألم وخيم في أعلى البطن;
- اصفرار الجلد أو العينين (يرقان).

إذا كنت تعتقد بأنّه من الممكن أنّه يوجد لديك أي واحد من هذه، توجّهي إلى الطبيب فوراً. قد تحتاجين إلى التوقف عن تناول فيمينيت.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر بـ 1-10 مستخدمات من بين 100)

- صداع;
- زيادة في الوزن;
- مشاكل في الثديين، مثل ألم أو حساسية في الثديين;
- اكتئاب أو تغيرات في المزاج;
- مشاكل في البطن، مثل غثيان؛ ألم بطن؛

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر بـ 1-10 مستخدمات من بين 1,000)

- تضخم الثديين;
- تقبؤ;
- إسهال;
- حصر سوائل (انتفاخ في اليدين، في الكاحلين أو في القدمين – علامة على حصر سوائل);
- انخفاض في الرغبة الجنسية;
- صداع نصفي (توجهي إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كان هذا صداعك النصفي الأول أو أنه أشد من المعتاد أو إذا كان ألم الرأس وخيماً، غير طبيعي أو متواصل لفترة طويلة);
- مشاكل جلد، كالطفح أو الشرى;

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر بـ 1-10 مستخدمات من بين 10,000)

- تغيرات في إفرازات من المهبل – نزيف غير طبيعي من المهبل – أنظري بند 4 "نزيف بين طمثين من غير المفروض أن يستمر لوقت طويل";
- إنتاج سائل حليبي من حلمات الثديين;
- ردود فعل حساسية مفرطة;
- عدم راحة في العينين، إذا كنت تضعين عدسات لاصقة;
- حُمَامَى عَدَّة - (انتفاخ الذي يشبه الكدمة في مقدمة الساقين);
- حُمَامَى عَدِيدَةُ الأشكال - (هذه ظاهرة جلدية);
- انخفاض في الوزن;
- ارتفاع في الرغبة الجنسية;
- جلطات دموية ضارة في الوريد أو في الشريان، على سبيل المثال:
 - في الرجل أو في كف القدم;
 - في الرئة;
 - نوبة قلبية;
 - سكتة دماغية;
 - سكتة دماغية صغيرة أو أعراض مؤقتة تشبه السكتة الدماغية، المعروفة كنوبة إقفارية عابرة
 - جلطات دموية في الكبد، في البطن/في المصراع، في الكلى أو في العين.
- الاختطار بأن يكون لديك جلطة دموية قد يكون أكبر، إذا كان لديك أية أوضاع أخرى التي تزيد هذا الاختطار (أنظري بند 2).

رد فعل أرجي وخيم لفيمينيت

- سرطان ثدي
- سرطان عنق الرحم
- مشاكل كبد وخيمة
- ضغط دم مرتفع
- حجارة في المرارة
- رقص (مشكلة في الجهاز العصبي التي تسبب حركات مفاجئة (تشنجات) خارجة عن السيطرة)
- تفاقم مرض الذئبة الاحمرارية المجموعية
- مشاكل في البطن وفي المصراع مثل التهاب البنكرياس، مرض كرون؛ التهاب تقرحي للأمعاء الغليظة
- تفاقم تصلب الأذن (مشكلة سمع)
- مشاكل مع السكر في الدم
- تفاقم وضع نادر المدعو برفيرية
- تفاقم في مشاكل جلدية، مثل بقع بُنَيَّة على الوجه أو الجسم (كآف) طفح شبيه بالحويصلات (herpes gestationis)

أعراض جانبية شيعها غير معروف (أعراض التي لم يتم تحديد مدى شيعها بعد):
• وذمة وعائية, خصوصاً لدى المتعالجين الذين يوجد لديهم تاريخ (عائلي) من وذمة وعائية.

أخبري طبيبك أو الصيدلي إذا كنت قلقة بخصوص أيّ من الأعراض الجانبية التي تعتقدن بأنها قد تنتج بسبب فيمينيت. كذلك, أخبريهن إذا كانت أوضاع قائمة تتفاقم وقت تناولك فيمينيت.

النزيف بين الدورات الشهرية من غير المفروض أن يستمر لوقت طويل
لدى بعض النساء يوجد نزيف قليل, غير متوقع, أو تبّع خلال تناول فيمينيت, خاصة خلال الأشهر الأولى. بشكل طبيعي, هذا النزيف لا يُشكل سبباً للقلق ويتوقف بعد يوم أو اثنين. استمري في تناول فيمينيت كالمعتاد; من المفروض أن تختفي المشكلة بعد عدد اللويحات الأولى.

من الممكن أن يكون لديك أيضاً نزيف غير متوقع, إذا كنت لا تتناولين الأقراص بشكل ثابت, لذلك حاولي تناول القرص في نفس الوقت في كل يوم. بالإضافة إلى ذلك, نزيف غير متوقع قد ينتج أحياناً بسبب أدوية أخرى.

حددي دوراً لدى طبيبك إذا كان يوجد لديك نزيف أو تبّع الذي:

- يستمر لأكثر من الأشهر الأولى للاستعمال
- يبدأ بعد أن تتناولين فيمينيت لمدة من الزمن
- يستمر أيضاً بعد أن توقفت عن تناول فيمينيت

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية, أو عندما تعانين من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة, عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية, أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنبني التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال ومجال رؤيتهم و/أو الرضع وبذلك يُمنع التسمم. لا تسببي التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر).
- شروط التخزين: يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية, في العبوة الأصلية.
- لا يجوز إلقاء أدوية إلى مصرف المجاري أو إلى سلة النفايات المنزلية. اسألي الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بالاستعمال. هذه الوسائل تساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة, يحتوي فيمينيت أيضاً على:

Lactose monohydrate, potato starch, povidone, silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, macrogol 6000, alpha-tocopherol, magnesium stearate, propylene glycol, quinoline yellow (E104).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص دائري محدب الأطراف بلون أصفر فاتح مع وسم "RG" في جهة واحدة و-"P9" في الجهة الأخرى.
كل عبوة من فيمينيت تحتوي على 1, 3 أو 4 لويحات من 21 قرصاً. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوّقة.

تمت المراجعة في كانون الثاني 2025 حسب تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 128-57-30568-00

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض., شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل